

## アルガトロバン注射液10mg「サワイ」

### 先発品と同一の効能・効果

1. 下記疾患に伴う神経症候(運動麻痺)、日常生活動作(歩行、起立、坐位保持、食事)の改善  
発症後48時間以内の脳血栓症急性期(ラクネを除く)
2. 慢性動脈閉塞症(バージャー病・閉塞性動脈硬化症)における四肢潰瘍、安静時疼痛ならびに冷感の改善
3. 下記患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)  
先天性アンチトロンビンⅢ欠乏患者  
アンチトロンビンⅢ低下を伴う患者  
(アンチトロンビンⅢが正常の70%以下に低下し、かつ、ヘパリンナトリウム、ヘパリンカルシウムの使用では体外循環路内の凝血(残血)が改善しないと判断されたもの)

### 先発品のみが有する効能・効果

3. 下記患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)  
ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型患者
4. ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止
5. ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓症の発症抑制