

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」


| | |
|------|------------------------|
| 採血時点 | 0、0.33、0.67、1、2、3、5 hr |
| 休薬期間 | 7日間 |
| 測定方法 | GC/MS法 |
| 試験製剤 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 |
| 標準製剤 | セロクラール錠10mg |

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」とセロクラール錠10mgを健康成人男子にそれぞれ4錠(イフェンプロジル酒石酸塩として40mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血中イフェンプロジル濃度を測定した。その結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤4錠投与時の薬物動態パラメータ

| | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (hr) | AUC _{0-5hr} (ng・hr/mL) |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 2.02 ± 0.16 | 0.97 ± 0.18 | 4.64 ± 0.36 |
| セロクラール錠10mg | 2.19 ± 0.26 | 1.10 ± 0.25 | 4.97 ± 0.34 |

(Mean ± S.E.)



血中濃度ならびにAUC_t、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。