

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2018(2019年更新版)に準拠して作成

抗てんかん剤

ラモトリギン錠

ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」

ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」

LAMOTRIGINE Tablets for Pediatric [SAWAI]

抗てんかん剤、双極性障害治療薬

ラモトリギン錠

ラモトリギン錠 25mg「サワイ」

ラモトリギン錠 100mg「サワイ」

LAMOTRIGINE Tablets [SAWAI]

剤形	素錠
製剤の規制区分	劇薬、処方箋医薬品 <sup>注)</sup> 注)注意—医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	錠小児用 2 mg : 1 錠中ラモトリギン 2 mg 含有 錠小児用 5 mg : 1 錠中ラモトリギン 5 mg 含有 錠 25 mg : 1 錠中ラモトリギン 25 mg 含有 錠 100 mg : 1 錠中ラモトリギン 100 mg 含有
一般名	和名 : ラモトリギン(JAN) 洋名 : Lamotrigine(JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載年月日 販売開始年月日	製造販売承認年月日 : 2018年 2月 15日 薬価基準収載年月日 : 2018年 6月 15日 販売開始年月日 : 2018年 6月 15日
製造販売(輸入)・提携・ 販売会社名	製造販売元 : 沢井製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	沢井製薬株式会社 医薬品情報センター TEL : 0120-381-999、FAX : 06-7708-8966 医療関係者向け総合情報サイト : <a href="https://med.sawai.co.jp/">https://med.sawai.co.jp/</a>

本IFは2024年3月改訂の電子添文の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

# 医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書(以下、添付文書)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者(以下、MR)等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム(以下、IFと略す)が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬)学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)の医療用医薬品情報検索のページ(<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>)にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせて、IF記載要領2018が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

## 2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

### 3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V. 5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

### 4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020年4月改訂)

# 目次

I. 概要に関する項目	1	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	49
1. 開発の経緯	1	1. 警告内容とその理由	49
2. 製品の治療学的特性	1	2. 禁忌内容とその理由	49
3. 製品の製剤学的特性	1	3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	49
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	49
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	2	5. 重要な基本的注意とその理由	49
6. RMPの概要	2	6. 特定の背景を有する患者に関する注意	50
II. 名称に関する項目	3	7. 相互作用	52
1. 販売名	3	8. 副作用	53
2. 一般名	3	9. 臨床検査結果に及ぼす影響	54
3. 構造式又は示性式	3	10. 過量投与	54
4. 分子式及び分子量	3	11. 適用上の注意	54
5. 化学名(命名法)又は本質	3	12. その他の注意	55
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	4	IX. 非臨床試験に関する項目	56
III. 有効成分に関する項目	5	1. 薬理試験	56
1. 物理化学的性質	5	2. 毒性試験	56
2. 有効成分の各種条件下における安定性	5	X. 管理的事項に関する項目	57
3. 有効成分の確認試験法、定量法	6	1. 規制区分	57
IV. 製剤に関する項目	7	2. 有効期間	57
1. 剤形	7	3. 包装状態での貯法	57
2. 製剤の組成	8	4. 取扱い上の注意	57
3. 添付溶解液の組成及び容量	8	5. 患者向け資材	57
4. 力価	8	6. 同一成分・同効薬	57
5. 混入する可能性のある夾雑物	8	7. 国際誕生年月日	57
6. 製剤の各種条件下における安定性	8	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準 収載年月日、販売開始年月日	57
7. 調製法及び溶解後の安定性	11	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	58
8. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	11	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその 内容	58
9. 溶出性	11	11. 再審査期間	58
10. 容器・包装	16	12. 投薬期間制限に関する情報	58
11. 別途提供される資材類	17	13. 各種コード	58
12. その他	17	14. 保険給付上の注意	58
V. 治療に関する項目	23	XI. 文献	59
1. 効能又は効果	23	1. 引用文献	59
2. 効能又は効果に関連する注意	23	2. その他の参考文献	62
3. 用法及び用量	23	XII. 参考資料	63
4. 用法及び用量に関連する注意	28	1. 主な外国での発売状況	63
5. 臨床成績	28	2. 海外における臨床支援情報	63
VI. 薬効薬理に関する項目	35	XIII. 備考	64
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	35	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあ たっての参考情報	64
2. 薬理作用	35	2. その他の関連資料	66
VII. 薬物動態に関する項目	36		
1. 血中濃度の推移	36		
2. 薬物速度論的パラメータ	45		
3. 母集団(ポピュレーション)解析	46		
4. 吸収	46		
5. 分布	46		
6. 代謝	47		
7. 排泄	47		
8. トランスポーターに関する情報	47		
9. 透析等による除去率	47		
10. 特定の背景を有する患者	47		
11. その他	48		

## I. 概要に関する項目

### 1. 開発の経緯

ラモトリギン錠小児用 2mg/錠小児用 5mg/錠25mg/錠100mg「サワイ」は、ラモトリギンを含有する抗てんかん剤、双極性障害治療薬(錠25mg/錠100mgのみ)である。

本剤は、後発医薬品として下記通知に基づき、製造方法並びに規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、承認を得て上市に至った。

承認申請に際し準拠した通知名	平成26年11月21日 薬食発1121第2号
承認	2018年2月
上市	2018年6月

2020年2月に「定型欠神発作の単剤療法」の「効能又は効果」および「用法及び用量」が追加承認された。(X. -9. 参照)

### 2. 製品の治療学的特性

1) Na<sup>+</sup>チャネルを頻度依存的かつ電位依存的に抑制することによって神経膜を安定化させ、グルタミン酸等の興奮性神経伝達物質の遊離を抑制することにより抗痙攣作用を示すと考えられている。(VI. -2. 参照)<sup>1, 2)</sup>

2) 重大な副作用として、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、薬剤性過敏症症候群、再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、血球貪食症候群、肝炎、肝機能障害及び黄疸、無菌性髄膜炎が報告されている。(VIII. -8. 参照)

### 3. 製品の製剤学的特性

1) カシス様芳香のチュアブル・ディスパーシブル錠である。(IV. -1. 参照)

チュアブル・ディスパーシブル錠とは、水とともに服用、咀嚼して服用、水に懸濁して服用、のいずれの方法でも服用できる錠剤である。(VIII. -11. 参照)

2) PTPシートはスリットで切り離した後もGS 1コードの読み取りが可能である。

3) 個装箱はSカード仕様(1枚の切り取り両面カード)で、使用期限の管理あるいは調剤棚カードとして利用可能である。

### 4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、最適使用ガイドライン等	有無
RMP	有 : I. -6. 参照
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	有 : XIII. -2. 参照
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

(2024年11月1日時点)

I. 概要に関する項目

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

1) 承認条件

<p><b>21. 承認条件</b>                  医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。</p>
--

2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMPの概要

医薬品リスク管理計画書(RMP)の概要

<b>1.1. 安全性検討事項</b>		
<b>【重要な特定されたリスク】</b>	<b>【重要な潜在的リスク】</b>	<b>【重要な不足情報】</b>
中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis)及び皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)	該当なし	該当なし
薬剤性過敏症症候群		
<b>1.2. 有効性に関する検討事項</b>		
該当なし		

↓上記に基づく安全性監視のための活動

<b>2. 医薬品安全性監視計画の概要</b>
<b>通常の医薬品安全性監視活動</b>
副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全性対策の検討(及び実行)
<b>追加の医薬品安全性監視活動</b>
該当なし
<b>3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要</b>
該当なし

↓上記に基づくリスク最小化のための活動

<b>4. リスク最小化計画の概要</b>
<b>通常のリスク最小化活動</b>
電子化された添付文書及び患者向医薬品ガイドによる情報提供
<b>追加のリスク最小化活動</b>
医療従事者向け資材の作成及び配布
患者向け資材の作成と配布

(2024年11月1日時点)

最新の情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「RMP提出品目一覧」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html>

にてご確認ください。

---

## II. 名称に関する項目

---

## 1. 販売名 .....

## 1) 和名

ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」

ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

ラモトリギン錠100mg「サワイ」

## 2) 洋名

LAMOTRIGINE Tablets for Pediatric [SAWAI]

LAMOTRIGINE Tablets [SAWAI]

## 3) 名称の由来

通知「平成17年9月22日 薬食審査発第0922001号」に基づき命名した。

## 2. 一般名 .....

## 1) 和名(命名法)

ラモトリギン(JAN)


## 2) 洋名(命名法)

Lamotrigine(JAN、INN)

## 3) ステム(stem)

-trigine : sodium channel blockers, signal transduction modulators

## 3. 構造式又は示性式 .....



## 4. 分子式及び分子量 .....

分子式 : C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>5</sub>

分子量 : 256.09

## 5. 化学名(命名法)又は本質 .....

3, 5-Diamino-6-(2, 3-dichlorophenyl)-1, 2, 4-triazine

II. 名称に関する項目

6. 慣用名、別名、略号、記号番号 .....  
特になし



Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

1) 外観・性状

白色～微黄白色の粉末である。

2) 溶解性

メタノールにやや溶けにくく、エタノール(99.5)又は酢酸(100)に溶けにくく、水に極めて溶けにくい。

3) 吸湿性

乾燥減量：0.3%以下

4) 融点(分解点)、沸点、凝固点

該当資料なし

5) 酸塩基解離定数

pKa：5.7(25°C、吸光度法)<sup>3)</sup>

6) 分配係数

該当資料なし

7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

原薬の安定性<sup>3)</sup>

水：該当資料なし

液性(pH)：該当資料なし

光：

試験区分	保存条件	保存期間	保存形態	結果
苛酷試験 光	25°C/ 白色蛍光ランプ +近紫外線ランプ	白色蛍光ランプ総照射120万Lux・hr以上を照射後、近紫外蛍光ランプで総近紫外放射エネルギーを200W・hr/m <sup>2</sup> 以上を照射	無包装 (無色透明ガラスシャーレ*)	変化を認めなかった。

試験項目：性状、確認試験4(苛酷試験のみ)、乾燥減量、類縁物質、含量

\*無色透明ガラスシャーレに本剤を入れ、ポリ塩化ビニリデンフィルムで覆ったもの(曝光)。

その他：

試験区分	保存条件	保存期間	保存形態	結果
長期保存試験	30°C/65%RH 暗所	60ヵ月	プラスチック袋 (密閉)、ファイバードラム <sup>†</sup>	変化を認めなかった。

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

試験区分		保存条件	保存期間	保存形態	結果
加速試験		40°C/75%RH 暗所	6 ヶ月	プラスチック袋 (密閉)、ファイ バードラム <sup>†</sup>	変化を認めな かった。
苛 酷 試 験	温度	60°C 暗所	3 ヶ月	褐色ガラス瓶 (開栓)	変化を認めな かった。
	湿度	40°C/75%RH 暗所	6 ヶ月	褐色ガラス瓶 (開栓)	変化を認めな かった。

試験項目：性状、確認試験 4 (苛酷試験のみ)、乾燥減量、類縁物質、含量

†プラスチック袋(ポリエチレン)に入れ、封をしたものをファイバードラム(紙のドラム缶)に入れて保存した。

### 3. 有効成分の確認試験法、定量法

#### <確認試験法>

赤外吸収スペクトル測定法

#### <定量法>

電位差滴定法













## IV. 製剤に関する項目

## 1. 剤形

## 1) 剤形の区別

素錠

## 2) 製剤の外観及び性状

品名	表 (直径mm)	裏 (重量mg)	側面 (厚さmm)	性状
ラモトリギン 錠小児用 2mg「サワイ」	 4.8	 約45	 1.6	白色
ラモトリギン 錠小児用 5mg「サワイ」	 8.0×4.0	 約103	 2.6	白色
ラモトリギン 錠25mg「サワイ」	 5.2×5.2	 約63	 2.0	白色
ラモトリギン 錠100mg「サワイ」	 8.3×8.3	 約253	 3.2	白色

カシス様芳香、添加剤由来の甘みを有する。

## 3) 識別コード

## ●ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」

表示部位：錠剤本体(片面)、PTPシート

表示内容：SW L 2

## ●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」

表示部位：錠剤本体(片面)、PTPシート

表示内容：SW L 5

## ●ラモトリギン錠25mg「サワイ」

表示部位：錠剤本体(両面)、PTPシート

表示内容：SW L 25

## ●ラモトリギン錠100mg「サワイ」

表示部位：錠剤本体(両面)、PTPシート

表示内容：SW L 100

#### IV. 製剤に関する項目

##### 4) 製剤の物性

製剤均一性：日局一般試験法 製剤均一性試験法の項により含量均一性試験を行うとき、規格に適合する。

溶出性：日局一般試験法 溶出試験法(パドル法)の項により試験を行うとき、規格に適合する。

摩損度：日本薬局方 参考情報 錠剤の摩損度試験法により試験を行う。(25rpm、4分間)

0.26% (錠小児用 2mg)、0.35% (錠小児用 5mg)、0.16% (錠25mg)、0.11% (錠100mg)

##### 5) その他

該当しない

#### 2. 製剤の組成

##### 1) 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤

品名	ラモトリギン 錠小児用 2mg 「サワイ」	ラモトリギン 錠小児用 5mg 「サワイ」	ラモトリギン 錠25mg 「サワイ」	ラモトリギン 錠100mg 「サワイ」
有効成分 [1錠中]	ラモトリギン			
	2mg	5mg	25mg	100mg
添加剤	エチルバニリン、ケイ酸Mg/Al、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、炭酸Ca、デンプングリコール酸Na、バニリン、ヒドロキシプロピルセルロース、プロピレングリコール、ポビドン、香料			

##### 2) 電解質等の濃度

該当資料なし

##### 3) 熱量

該当資料なし

#### 3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

#### 4. 力価

該当しない

#### 5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

#### 6. 製剤の各種条件下における安定性

##### ●ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」

##### 1) 加速試験<sup>4)</sup>

本製剤の安定性を確認するため、加速試験を実施した。

その結果、規格に適合した。

PTP： [PTPシート]ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔

IV. 製剤に関する項目

	イニシャル	40°C75%RH・遮光 6 ヵ月
性状	白色の素錠	同左
確認試験	規格に適合	同左
含量均一性試験	規格に適合	同左
溶出試験	規格に適合	同左
定量試験*	98.1	98.6

※：表示量に対する含有率(%)

2) 無包装下の安定性試験<sup>5)</sup>

無包装の本製剤を、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、湿度の条件で硬度低下が観察された。

	イニシャル	温度 (40°C・遮光 3 ヵ月)	湿度 (25°C75%RH・遮光)		光 (総照射量 120万lx・hr)	室温 (25°C60%RH ・遮光 3 ヵ月)
			1 ヵ月	3 ヵ月		
性状	白色の素錠	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
硬度(kg)	1.4	1.6	1.0	0.9	1.4	1.5
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験*	100.0	102.3	102.5	103.5	101.6	102.9

※：イニシャルを 100 としたときの含有率(%)

「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日 日本病院薬剤師会)に準じて試験を実施した。

●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」

1) 加速試験<sup>6)</sup>

本製剤の安定性を確認するため、加速試験を実施した。  
その結果、規格に適合した。

PTP： [PTPシート]ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔

	イニシャル	40°C75%RH・遮光 6 ヵ月
性状	白色の素錠	同左
確認試験	規格に適合	同左
含量均一性試験	規格に適合	同左
溶出試験	規格に適合	同左
定量試験*	99.1	99.8

※：表示量に対する含有率(%)

2) 無包装下の安定性試験<sup>7)</sup>

無包装の本製剤を、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、温度の条件で硬度上昇、湿度の条件で硬度低下が観察された。

IV. 製剤に関する項目

	イニシャル	温度(40°C・遮光)		湿度(25°C75%RH・遮光)	
		1ヵ月	3ヵ月	1ヵ月	3ヵ月
性状	白色の素錠	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
硬度(kg)	2.3	4.1	3.7	1.3	1.3
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験※	100.0	101.0	98.8	101.4	101.7

	イニシャル	光	室温
		(総照射量120万lx・hr)	(25°C60%RH・遮光3ヵ月)
性状	白色の素錠	変化なし	変化なし
硬度(kg)	2.3	2.1	2.1
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験※	100.0	100.9	100.7

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)  
「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日 日本病院薬剤師会)に準じて試験を実施した。

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」

1) 加速試験<sup>8)</sup>

本製剤の安定性を確認するため、加速試験を実施した。

その結果、規格に適合した。

PTP： [PTPシート]ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔

	イニシャル	40°C75%RH・遮光 6ヵ月
性状	白色の素錠	同左
確認試験	規格に適合	同左
含量均一性試験	規格に適合	同左
溶出試験	規格に適合	同左
定量試験※	99.5	99.3

※：表示量に対する含有率(%)

2) 無包装下の安定性試験<sup>9)</sup>

無包装の本製剤を、下記条件で保存し、安定性試験を行った。

その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	温度 (40°C・遮光 3ヵ月)	湿度 (25°C75%RH ・遮光3ヵ月)	光 (総照射量 120万lx・hr)	室温 (25°C60%RH ・遮光3ヵ月)
性状	白色の素錠	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
硬度(kg)	3.6	3.5	2.6	3.5	3.2
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験※	100.0	98.3	98.8	99.3	97.8

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)  
「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日 日本病院薬剤師会)に準じて試験を実施した。

## ●ラモトリギン錠100mg「サワイ」

1) 加速試験<sup>10)</sup>

本製剤の安定性を確認するため、加速試験を実施した。  
その結果、規格に適合した。

PTP： [PTPシート]ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔

	イニシャル	40°C75%RH・遮光 6ヵ月
性状	白色の素錠	同左
確認試験	規格に適合	同左
含量均一性試験	規格に適合	同左
溶出試験	規格に適合	同左
定量試験※	99.9	100.4

※：表示量に対する含有率(%)

2) 無包装下の安定性試験<sup>11)</sup>

無包装の本製剤を、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	温度 (40°C・遮光 3ヵ月)	湿度 (25°C75%RH ・遮光3ヵ月)	光 (総照射量 120万lx・hr)	室温 (25°C60%RH ・遮光3ヵ月)
性状	白色の素錠	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
硬度(kg)	7.1	6.6	5.2	6.7	6.3
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験※	100.0	99.0	99.3	99.8	98.8

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日 日本病院薬剤師会)に準じて試験を実施した。

## 7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

## 8. 他剤との配合変化(物理化学的变化)

該当資料なし

## 9. 溶出性

<溶出挙動における同等性及び類似性>


●ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」<sup>12)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」:平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号	
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、5.0、6.8、水)、100rpm(pH6.8)
試験回数	12ベッセル	
試験製剤	ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」	
標準製剤	ラミクタール錠小児用2mg	


IV. 製剤に関する項目

結果及び考察	<p>&lt;50rpm : pH1. 2&gt; 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm : pH5. 0&gt; 15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;50rpm : pH6. 8&gt; 標準製剤の平均溶出率が 60% (5分) 及び 85% (15分) 付近の 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;50rpm : 水&gt; 標準製剤の平均溶出率が 40% (5分) 及び 85% (60分) 付近の 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;100rpm : pH6. 8&gt; 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p>
--------	---


<50rpm : pH1. 2>




<50rpm : pH5. 0>



<50rpm : pH6. 8>




<50rpm : 水>





<100rpm : pH6. 8>




( I : 判定基準の適合範囲)


●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」<sup>13)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」: 平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号	
試験条件	パドル法	50rpm (pH1.2、5.0、6.8、水)、100rpm (pH6.8)
試験回数	12 ベッセル	
試験製剤	ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」	
標準製剤	ラミクタール錠小児用 5mg	
結果及び考察	<p>&lt;50rpm : pH1.2&gt; 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm : pH5.0&gt; 15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;50rpm : pH6.8&gt; 標準製剤の平均溶出率が 40% (5分) 及び 85% (30分) 付近の 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;50rpm : 水&gt; 標準製剤の平均溶出率が 40% (5分) 及び 85% (180分) 付近の 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p>&lt;100rpm : pH6.8&gt; 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p>	




<50rpm : pH1. 2>



<50rpm : pH5. 0>



IV. 製剤に関する項目




( I : 判定基準の適合範囲)

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>14)</sup>


通知等	「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」：平成24年2月29日 薬食審査発 0229 第10号	
試験条件	パドル法	50rpm (pH1.2、5.0、6.8、水)
試験回数	12 ベッセル	
試験製剤	ラモトリギン錠 25mg「サワイ」	
標準製剤	ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	
結果及び考察	<p>&lt;50rpm : pH1.2&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。 最終比較時点(15分)における試験製剤の個々の溶出率は、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。</p> <p>&lt;50rpm : pH5.0&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。 最終比較時点(15分)における試験製剤の個々の溶出率は、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。</p> <p>&lt;50rpm : pH6.8&gt; 標準製剤の平均溶出率が60%(5分)及び85%(15分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあった。 最終比較時点(15分)における試験製剤の個々の溶出率は、試験製剤の平均溶出率±12%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±20%の範囲を超えるものがなかった。</p>	

結果及び考察	<p>&lt;50rpm：水&gt;                  両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。                  最終比較時点(15 分)における試験製剤の個々の溶出率は、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は同等であると判断した。                  本剤の処方変更水準はA水準であり、両製剤の溶出挙動は同等であったことから、両製剤は生物学的に同等であるとみなした。</p>
--------	---


<50rpm：pH1. 2>




<50rpm：pH5. 0>



<50rpm：pH6. 8>



<50rpm：水>



( I : 判定基準の適合範囲)


●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>15)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」：平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号	
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、3.0、6.8、水)
試験回数	12 ベッセル	
試験製剤	ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	
標準製剤	ラミクタール錠 100mg	
結果及び考察	<p>&lt;50rpm：pH1.2&gt;                      両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。                      &lt;50rpm：pH3.0&gt;                      両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。                      &lt;50rpm：pH6.8&gt;                      15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p>	


IV. 製剤に関する項目

結果及び考察	<p>&lt;50rpm : 水&gt;                  両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。                  以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p>
--------	---


<50rpm : pH1. 2>




<50rpm : pH3. 0>



<50rpm : pH6. 8>



<50rpm : 水>



( [ ] : 判定基準の適合範囲)

10. 容器・包装

1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当資料なし

2) 包装

22. 包装

<ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」>

PTP : 140錠 (14錠×10)

<ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」>

PTP : 140錠 (14錠×10)

<ラモトリギン錠25mg「サワイ」>

PTP : 140錠 (14錠×10)

<ラモトリギン錠100mg「サワイ」>

PTP : 140錠 (14錠×10)

3) 予備容量

該当しない

## 4) 容器の材質

PTP：[PTPシート]ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔  
[ピロー]ポリエチレンフィルム

## 11. 別途提供される資材類

該当しない

## 12. その他

## &lt;自動分包機錠剤落下試験&gt;

●ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」<sup>16)</sup>

湯山製作所製自動分包機による試験

試験機器： I. YS-TR-330FDS II (ユヤマ)  
II. YS-TR-152FDXIII (ユヤマ)

試験方法： 本剤の無包装品について、最上段のカセットから錠剤を落下させ、それぞれ1錠ずつ50包に分包した。

試験結果

	イニシャル	25°C75%RH2週間保存品
試験機器 I	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤のうち、50錠中7錠で欠けが認められた。
試験機器 II	一包化された錠剤のうち、50錠中2錠で欠けが認められた。	一包化された錠剤のうち、50錠中2錠で欠けが認められた。

## &lt;参考：加湿による錠剤サイズの変化&gt;

イニシャル	→	25°C75%RH2週間保存品
厚み (mm)		厚み (mm)
1.57		1.69

●ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」<sup>17)</sup>

湯山製作所製自動分包機による試験

試験機器： I. YS-TR-330FDS II (ユヤマ)  
II. YS-TR-152FDXIII (ユヤマ)

試験方法： 本剤の無包装品について、最上段のカセットから錠剤を落下させ、それぞれ1錠ずつ50包に分包した。

試験結果

	イニシャル	25°C75%RH2週間保存品
試験機器 I	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤のうち、50錠中15錠で欠けが認められた。
試験機器 II	一包化された錠剤のうち、50錠中3錠で欠けが認められた。	一包化された錠剤のうち、50錠中19錠で欠けが認められた。

## &lt;参考：加湿による錠剤サイズの変化&gt;

イニシャル	→	25°C75%RH2週間保存品
厚み (mm)		厚み (mm)
2.61		2.75

IV. 製剤に関する項目

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>18)</sup>

湯山製作所製自動分包機による試験

試験機器： I. YS-TR-330FDS II (ユヤマ)  
II. YS-TR-152FDXIII (ユヤマ)

試験方法： 本剤の無包装品について、最上段のカセットから錠剤を落下させ、それぞれ1錠ずつ50包に分包した。

試験結果

	イニシャル	25°C75%RH2週間保存品
試験機器 I	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。
試験機器 II	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。

<参考：加湿による錠剤サイズの変化>

イニシャル	→	25°C75%RH2週間保存品
厚み (mm)		厚み (mm)
2.00		2.05

●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>19)</sup>

湯山製作所製自動分包機による試験

試験機器： I. YS-TR-330FDS II (ユヤマ)  
II. YS-TR-152FDXIII (ユヤマ)

試験方法： 本剤の無包装品について、最上段のカセットから錠剤を落下させ、それぞれ1錠ずつ50包に分包した。

試験結果

	イニシャル	25°C75%RH2週間保存品
試験機器 I	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤のうち、50錠中1錠で欠けが認められた。
試験機器 II	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。	一包化された錠剤に割れ、欠けは認められなかった。

<参考：加湿による錠剤サイズの変化>

イニシャル	→	25°C75%RH2週間保存品
厚み (mm)		厚み (mm)
3.20		3.27

## &lt;分散性&gt;

●ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」<sup>20)</sup>

## 目的

本製剤の水に対する分散性を確認するため試験を実施する。

## 方法

本製剤を1錠とり、水50mLを加えた比色管に静かに投入する。そのまま静置し、0分、1分、2分後の様子を観察する。その後、転倒混和を1回行い、その時点を開始時点として、0分、5分、10分、20分後の様子を観察する。

## ロット番号及び試験回数


ロット番号	739T3S6205
試験回数	1回

## 結果

静置0分後	静置1分後	静置2分後
錠剤はただちに膨潤した	更に膨潤し、管底に広がるように崩壊した	1分時点とほとんど変化はみられなかった

転倒混和0分後	転倒混和5分後	転倒混和10分後	転倒混和20分後
白色の懸濁液となった	沈殿が生じ、0分時点と比較して、上層部はやや澄明で、中、下層部は白濁したままであった	5分後と比較し、上層部がより澄明になった	10分後と比較し、上層部がより澄明になった

※試験検体3本中1本を掲載



#### IV. 製剤に関する項目

##### ●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」<sup>21)</sup>

##### 目的

本製剤の水に対する分散性を確認するため試験を実施する。

##### 方法

本製剤を1錠とり、水50mLを加えた比色管に静かに投入する。そのまま静置し、0分、1分、2分後の様子を観察する。その後、転倒混和を1回行い、その時点を開始時点として、0分、5分、10分、20分後の様子を観察する。

##### ロット番号及び試験回数


ロット番号	739T4S1407
試験回数	1回

##### 結果

静置 0分後	静置 1分後	静置 2分後
錠剤はただちに膨潤した	更に膨潤し、管底に広がるように崩壊した	1分時点と比べ、更に崩壊が進んだ

転倒混和 0分後	転倒混和 5分後	転倒混和 10分後	転倒混和 20分後
白色の懸濁液となった	沈殿が生じ、0分時点と比較して、上層部はやや澄明で、中、下層部は白濁したままであった	5分後とほとんど変化は見られなかった	10分後と比較し、上層部がより澄明になった

※試験検体3本中1本を掲載





●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>22)</sup>

## 目的

本製剤の水に対する分散性を確認するため試験を実施する。

## 方法

本製剤を1錠とり、水50mLを加えた比色管に静かに投入する。そのまま静置し、0分、1分、2分後の様子を観察する。その後、転倒混和を1回行い、その時点を開始時点として、0分、5分、10分、20分後の様子を観察する。

## ロット番号及び試験回数


ロット番号	739T1S6505
試験回数	1回

## 結果

静置0分後	静置1分後	静置2分後
錠剤はただちに膨潤した	更に膨潤し、崩れるように崩壊した	1分時点とほとんど変化は見られなかった

転倒混和0分後	転倒混和5分後	転倒混和10分後	転倒混和20分後
白色の懸濁液となった	沈殿が生じ、0分時点と比較して、上層部はやや澄明で、中、下層部は白濁したままであった	5分後と比較し、上層部がより澄明となった	上層部及び中層部が澄明となったが、下層部はやや白濁したままであった

※試験検体3本中1本を掲載



#### IV. 製剤に関する項目

##### ●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>23)</sup>

##### 目的

本製剤の水に対する分散性を確認するため試験を実施する。

##### 方法

本製剤を1錠とり、水50mLを加えた比色管に静かに投入する。そのまま静置し、0分、1分、2分後の様子を観察する。その後、転倒混和を1回行い、その時点を開始時点として、0分、5分、10分、20分後の様子を観察する。

##### ロット番号及び試験回数


ロット番号	739T2S6517
試験回数	1回

##### 結果

静置0分後	静置1分後	静置2分後
錠剤はただちに膨潤した	更に膨潤し、嵩高くなり、固形物は角から崩れるように崩壊した	1分時点よりもさらに崩壊が進み、完全に崩壊した

転倒混和0分後	転倒混和5分後	転倒混和10分後	転倒混和20分後
白色の懸濁液となった	沈殿が生じ、0分時点と比較して、上層部はやや澄明で、中、下層部は白濁したままであった	5分後と比較し、ほとんど変化が見られなかった	上層部がより澄明となったが、中層部及び下層部は白濁したままであった

※試験検体3本中1本を掲載



## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

#### 4. 効能又は効果

- てんかん患者の下記発作に対する単剤療法  
部分発作(二次性全般化発作を含む)  
強直間代発作  
定型欠神発作
- 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法  
部分発作(二次性全般化発作を含む)  
強直間代発作  
Lennox-Gastaut症候群における全般発作
- 双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制

### 2. 効能又は効果に関連する注意

#### 5. 効能又は効果に関連する注意

##### 〈定型欠神発作〉

- 5.1 15歳以上の患者における有効性及び安全性については確立していないため、15歳未満で本剤の治療を開始した患者において、15歳以降も継続して本剤を使用する場合には、患者の状態を十分観察し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

##### 〈双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制〉

- 5.2 双極性障害の気分エピソードの急性期治療に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。

### 3. 用法及び用量

#### 1) 用法及び用量の解説

#### 6. 用法及び用量

○てんかん患者に用いる場合

成人(錠25mg、錠100mg)

##### (1) 単剤療法の場合(部分発作(二次性全般化発作を含む)及び強直間代発作に用いる場合)

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日25mgを1日1回経口投与し、次の2週間は1日50mgを1日1回経口投与し、5週目は1日100mgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として最大100mgずつ漸増する。維持用量は1日100～200mgとし、1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大100mgずつ、1日用量は最大400mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

##### (2) バルプロ酸ナトリウムを併用する場合

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1回25mgを隔日に経口投与し、次の2週間は1日25mgを1日1回経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として25～50mgずつ漸増する。維持用量は1日100～200mgとし、1日2回に分割して経口投与する。

V. 治療に関する項目

(3)バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合<sup>注1)</sup>

(3)-i)本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤<sup>注2)</sup>を併用する場合

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日50mgを1日1回経口投与し、次の2週間は1日100mgを1日2回に分割して経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として最大100mgずつ漸増する。維持用量は1日200～400mgとし、1日2回に分割して経口投与する。

(3)-ii) (3)-i)以外の薬剤<sup>注3)</sup>を併用する場合

単剤療法の場合に従う。

参考：てんかん患者に用いる場合(成人)

本剤と併用する薬剤の種類	(2)バルプロ酸ナトリウムを併用する場合	併用療法		(1)単剤療法の場合 (部分発作(二次性全般化発作を含む)及び強直間代発作に用いる場合)
		(3)バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合 <sup>注1)</sup>		
		(3)-i) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注2)</sup> を併用する場合	(3)-ii) (3)-i)以外の薬剤 <sup>注3)</sup> を併用する場合	
1・2週目	25mgを隔日投与	50mg/日 (1日1回投与)	25mg/日 (1日1回投与)	
3・4週目	25mg/日 (1日1回投与)	100mg/日 (1日2回に分割して投与)	50mg/日 (1日1回投与)	
5週目以降	1～2週間毎に25～50mg/日ずつ漸増する。	1～2週間毎に最大100mg/日ずつ漸増する。	5週目は100mg/日 (1日1回又は2回に分割して投与) その後1～2週間毎に最大100mg/日ずつ漸増する。	
維持用量	100～200mg/日 (1日2回に分割して投与)	200～400mg/日 (1日2回に分割して投与)	100～200mg/日 (最大400mg/日) (1日1回又は2回に分割して投与) (増量は1週間以上の間隔をあけて最大100mg/日ずつ)	

本剤は主としてグルクロン酸転移酵素で代謝される。

注1)本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法及び用量に従うこと。

注2)本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤  
[7.2、10.2、16.7.1、16.7.2参照]

注3)本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマート、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド  
[7.2、16.7.1、16.7.2参照]

小児(錠小児用2mg、錠小児用5mg、錠25mg、錠100mg)

(1)単剤療法の場合(定型欠神発作に用いる場合)

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日0.3mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与し、次の2週間は1日0.6mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として最大0.6mg/kgずつ漸増する。維持用量は1日1～10mg/kgとし、1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大0.6mg/kgずつ、1日用量は最大200mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

**(2)バルプロ酸ナトリウムを併用する場合**

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日0.15mg/kgを1日1回経口投与し、次の2週間は1日0.3mg/kgを1日1回経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として最大0.3mg/kgずつ漸増する。維持用量は、バルプロ酸ナトリウムに加えて本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤<sup>注2)</sup>を併用する場合は1日1～5mg/kgとし、本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤<sup>注2)</sup>を併用していない場合は1日1～3mg/kgとし、1日2回に分割して経口投与する。なお、1日用量は最大200mgまでとする。

**(3)バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合<sup>注1)</sup>****(3)-i)本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤<sup>注2)</sup>を併用する場合**

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日0.6mg/kgを1日2回に分割して経口投与し、次の2週間は1日1.2mg/kgを1日2回に分割して経口投与する。その後は、1～2週間毎に1日量として最大1.2mg/kgずつ漸増する。維持用量は1日5～15mg/kgとし、1日2回に分割して経口投与する。なお、1日用量は最大400mgまでとする。

**(3)-ii) (3)-i)以外の薬剤<sup>注3)</sup>を併用する場合**

バルプロ酸ナトリウムを併用する場合に従う。

参考：てんかん患者に用いる場合(小児)

本剤と併用する薬剤の種類	併用療法				(1)単剤療法の 場合 (定型欠神発作に 用いる場合)
	(2)バルプロ酸ナトリウムを 併用する場合		(3)バルプロ酸ナトリウムを 併用しない場合 <sup>注1)</sup>		
	本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注2)</sup> を併用する場合	本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注2)</sup> を併用しない場合	(3)-i) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注2)</sup> を併用する場合	(3)-ii) (3)-i)以外の薬剤 <sup>注3)</sup> を併用する場合	
1・2週目	0.15mg/kg/日 (1日1回投与)	0.15mg/kg/日 (1日1回投与)	0.6mg/kg/日 (1日2回に分割して投与)	0.15mg/kg/日 (1日1回投与)	0.3mg/kg/日 (1日1回又は2回に分割して投与)
3・4週目	0.3mg/kg/日 (1日1回投与)	0.3mg/kg/日 (1日1回投与)	1.2mg/kg/日 (1日2回に分割して投与)	0.3mg/kg/日 (1日1回投与)	0.6mg/kg/日 (1日1回又は2回に分割して投与)
5週目以降	1～2週間毎に最大0.3mg/kg/日ずつ漸増する。	1～2週間毎に最大0.3mg/kg/日ずつ漸増する。	1～2週間毎に最大1.2mg/kg/日ずつ漸増する。	1～2週間毎に最大0.3mg/kg/日ずつ漸増する。	1～2週間毎に最大0.6mg/kg/日ずつ漸増する。
維持用量	1～5mg/kg/日 (最大200mg/日) (1日2回に分割して投与)	1～3mg/kg/日 (最大200mg/日) (1日2回に分割して投与)	5～15mg/kg/日 (最大400mg/日) (1日2回に分割して投与)	1～3mg/kg/日 (最大200mg/日) (1日2回に分割して投与)	1～10mg/kg/日 (最大200mg/日) (1日1回又は2回に分割して投与) (増量は1週間以上の間隔をあけて最大0.6mg/kg/日ずつ)

本剤は主としてグルクロン酸転移酵素で代謝される。

## V. 治療に関する項目

注1)本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法及び用量に従うこと。

注2)本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤  
[7.2、10.2、16.7.1、16.7.2参照]

注3)本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマート、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド  
[7.2、16.7.1、16.7.2参照]

○双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制に用いる場合(錠25mg、錠100mg)

### (1)単剤療法の場合

通常、成人にはラモトリギンとして最初の2週間は1日25mgを1日1回経口投与、次の2週間は1日50mgを1日1回又は2回に分割して経口投与し、5週目は1日100mgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。6週目以降は維持用量として1日200mgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大100mgずつ、1日用量は最大400mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

### (2)バルプロ酸ナトリウムを併用する場合

通常、成人にはラモトリギンとして最初の2週間は1回25mgを隔日に経口投与、次の2週間は1日25mgを1日1回経口投与し、5週目は1日50mgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。6週目以降は維持用量として1日100mgを1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大50mgずつ、1日用量は最大200mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

### (3)バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合<sup>注1)</sup>

#### (3-i)本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤<sup>注2)</sup>を併用する場合

通常、成人にはラモトリギンとして最初の2週間は1日50mgを1日1回経口投与、次の2週間は1日100mgを1日2回に分割して経口投与し、5週目は1日200mgを1日2回に分割して経口投与する。6週目は1日300mgを1日2回に分割して経口投与し、7週目以降は維持用量として1日300～400mgを1日2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大100mgずつ、1日用量は最大400mgまでとし、いずれも1日2回に分割して経口投与する。

(3) - ii) (3) - i) 以外の薬剤 <sup>注3)</sup> を併用する場合 単剤療法の場合に従う。				
参考：双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制に用いる場合(成人)				
本剤と併用する薬剤の種類	(2) バルプロ酸ナトリウムを併用する場合	併用療法		(1) 単剤療法の場合
		(3) バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合 <sup>注1)</sup>		
		(3) - i) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注2)</sup> を併用する場合	(3) - ii) (3) - i) 以外の薬剤 <sup>注3)</sup> を併用する場合	
1・2週目	25mgを隔日投与	50mg/日 (1日1回投与)	25mg/日 (1日1回投与)	
3・4週目	25mg/日 (1日1回投与)	100mg/日 (1日2回に分割して投与)	50mg/日 (1日1回又は2回に分割して投与)	
5週目	50mg/日 (1日1回又は2回に分割して投与)	200mg/日 (1日2回に分割して投与)	100mg/日 (1日1回又は2回に分割して投与)	
6週目以降	100mg/日 (最大200mg/日) (1日1回又は2回に分割して投与) (増量は1週間以上の間隔をあけて最大50mg/日ずつ)	6週目300mg/日 7週目以降300～400mg/日 (最大400mg/日) (1日2回に分割して投与) (増量は1週間以上の間隔をあけて最大100mg/日ずつ)	200mg/日 (最大400mg/日) (1日1回又は2回に分割して投与) (増量は1週間以上の間隔をあけて最大100mg/日ずつ)	

本剤は主としてグルクロン酸転移酵素で代謝される。

注1) 本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法及び用量に従うこと。

注2) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤  
[7.2、10.2、16.7.1、16.7.2参照]

注3) 本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマート、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド  
[7.2、16.7.1、16.7.2参照]

## 2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

## V. 治療に関する項目

### 4. 用法及び用量に関連する注意

#### 7. 用法及び用量に関連する注意

##### 〈効能共通〉

- 7.1 発疹等の皮膚障害の発現率は、定められた用法及び用量を超えて投与した場合に高いことが示されているので、併用する薬剤の組み合わせに留意して、6. 用法及び用量を遵守すること。なお、体重換算等により調節した用量に一致する錠剤の組み合わせがない場合には、調節した用量に最も近く、かつ超えない用量になるよう錠剤を組み合わせで投与すること。[1.1.1、1.1.2、7.3、8.1、11.1.1、17.3.1、17.3.2参照]
- 7.2 併用する薬剤については以下のとおり分類されるので留意すること。なお、本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法及び用量に従うこと。[6.、10.2、16.7.1、16.7.2参照]
- ・本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤  
フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤
  - ・本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤  
アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマー  
ト、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド
- 7.3 本剤による発疹等の皮膚症状のために投与を中止した場合には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合以外は再投与しないこと。再投与にあたっては、いかなる理由で投与を中止した患者においても、維持用量より低い用量から漸増すること。なお、投与中止から本剤の消失半減期の5倍の期間(バルプロ酸ナトリウムを併用した時は約350時間、バルプロ酸ナトリウムを併用せず本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用した時は約65時間(いずれも外国人のデータ)、バルプロ酸ナトリウムも本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤も併用しなかった時は約170時間)を経過している場合は、初回用量から6. 用法及び用量に従って再開することが推奨される。[7.1、10.2、16.7.1、16.7.2参照]
- 7.4 本剤投与中に、本剤のグルクロン酸抱合を阻害あるいは誘導する薬剤を投与開始又は投与中止する場合には、本剤の用量調節を考慮すること。

##### 〈各種てんかんの治療〉

- 7.5 本剤を定型欠神発作以外の小児てんかん患者に用いる場合には、他の抗てんかん薬と併用して使用すること。定型欠神発作以外の国内臨床試験において、本剤単独投与での使用経験はない。[9.7.3参照]
- 7.6 小児てんかん患者へ投与する場合に、投与初期(1～2週)に体重換算した1日用量が1～2mgの範囲内であった場合は2mg錠を隔日に1錠服用する。体重換算した1日用量が1mg未満の場合は本剤を服用してはならない。本剤投与中は、体重変化を観察し、必要に応じ適切に用量の変更を行うこと。なお、2～6歳の小児の場合は維持用量の上限付近の用量が必要な場合がある。

### 5. 臨床成績

#### 1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

#### 2) 臨床薬理試験

該当資料なし



## 3) 用量反応探索試験

## 17.1 有効性及び安全性に関する試験

## 〈各種てんかんの治療〉

## 17.1.1 国際共同第Ⅲ相試験(成人、単剤療法)

成人における部分発作又は強直間代発作を有する新たに診断されたてんかん患者及び再発したてんかん患者(未治療)65例(日本人39例)を対象に、日本及び韓国において非対照非盲検試験<sup>24, 25)</sup>を実施した。維持用量を200mg/日となるよう設定して実施した。発作型別の維持療法期(漸増期終了時から24週間)における発作消失維持率は、下表のとおりであった。

発作型	評価例数	発作消失維持例	発作消失維持率 <sup>注)</sup> (%) [95%信頼区間]
すべての発作型	65	28	43.1[30.85, 55.96]
部分発作	55	22	40.0[27.02, 54.09]
強直間代発作	10	8	80.0[44.39, 97.48]

注)維持療法期に発作消失が維持された症例数/ラモトリギン投与症例数

維持投与期を終了した後の継続投与期(24週間)における発作消失維持率は、下表のとおりであった。なお、継続投与期は日本のみで実施された。

発作型	評価例数	発作消失維持例	発作消失維持率 <sup>注)</sup> (%) [95%信頼区間]
すべての発作型	19	16	84.2[60.42, 96.62]
部分発作	13	12	92.3[63.97, 99.81]
強直間代発作	6	5	83.3[35.88, 99.58]

注)継続投与期に発作消失が維持された症例数/ラモトリギン投与症例数

副作用発現頻度は、31%(20/65例)であった。主な副作用は、発疹15%(10/65例)、頭痛、めまい、及び胃腸障害各3%(2/65例)であった(承認時)。

## 17.1.2 国際共同第Ⅲ相試験(小児、単剤療法)

小児における定型欠神発作を有する新たに診断された4歳から12歳のてんかん患者(未治療)20例(日本人16例)を対象に、日本及び韓国において単剤投与による非対照非盲検試験<sup>26, 27)</sup>を実施した。維持用量は発作の状態や安全性を考慮して1.2~10.2mg/kg/日又は400mg/日(いずれか低い用量)<sup>注)</sup>の範囲内で増減可能とした。

維持療法期終了時(維持療法期における12週時)においてHV-EEGにより定型欠神発作の消失が確認された被験者数は、治験薬投与症例数20例中7例であり、その割合(95%信頼区間)は、35.0(15.39~59.22)%であった。

維持療法期を終了した後の継続投与期12週時において、HV-EEGにより定型欠神発作の消失が確認された被験者数は、継続投与期に移行した7例中6例であり、その割合(95%信頼区間)は85.7(42.13~99.64)%であった。

副作用発現頻度は、35%(7/20例)であった。その内訳は、発疹25%(5/20例)、肝機能検査値異常及び頭痛各5%(1/20例)であった(承認時)。

注)小児の定型欠神発作に対する承認された本剤の単剤投与の維持用量は1日1~10mg/kg、最大200mgである。

V. 治療に関する項目

4) 検証的試験

(1) 有効性検証試験

〈各種てんかんの治療〉

17.1.3 海外第Ⅲ相試験(小児及び成人、単剤療法)

部分発作又は強直間代発作を有する新たに診断されたてんかん患者及び再発したてんかん患者(未治療)343例(12~72歳)を対象に、カルバマゼピン対照非盲検試験<sup>28, 29)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量を100mg/日又は200mg/日と設定した。維持投与期(漸増期終了時から24週間)における発作消失維持率は、下表のとおりであった。

	ラモトリギン 100mg/日群	ラモトリギン 200mg/日群	カルバマゼピン群
評価例数	115	111	117
発作消失維持例	59	67	64
発作消失維持率 <sup>注)</sup> (%) [95%信頼区間]	51.3 [41.81, 60.73]	60.4 [50.63, 69.52]	54.7 [45.23, 63.92]

注)維持投与期に発作消失が維持された症例数/ラモトリギン投与症例数

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、26%(58/226例)であった。

17.1.4 国内第Ⅲ相試験(成人、併用療法)

成人における部分発作及び全般発作に対するAdd-on投与による第Ⅲ相試験(二重盲検比較試験)<sup>30~32)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量はバルプロ酸ナトリウム併用患者には150mg、バルプロ酸ナトリウム非併用患者には300mg、維持用量期間8週間と設定して実施した。有効性解析対象症例における最終全般改善度及び各発作型における最終全般改善度は以下のとおりであった。

投与群	症例数	最終全般改善度						検定 Wilcoxon
		著明 改善	改善	やや 改善	不変	悪化	判定 不能	
ラモトリギン群	87	10 (11%)	20 (23%)	16 (18%)	26 (30%)	12 (14%)	3 (3%)	p=0.0119
プラセボ群	89	8 (9%)	13 (15%)	9 (10%)	34 (38%)	23 (26%)	2 (2%)	

発作型	投与群	症例数	著明 改善	改善	やや 改善	不変	悪化	判定 不能	改善率
部分発作	ラモトリギン群	66	6	17	9	22	10	2	23(35%)
	プラセボ群	66	6	12	7	20	20	1	18(27%)
強直間代発作	ラモトリギン群	7	0	3	2	1	1	0	3(43%)
	プラセボ群	11	1	1	1	7	1	0	2(18%)
Lennox-Gastaut 症候群の全般発作	ラモトリギン群	11	1	3	3	2	2	0	4(36%)
	プラセボ群	16	1	0	1	10	4	0	1(6%)

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、37%(32/87例)であった。主な副作用は、傾眠20%(17/87例)、浮動性めまい13%(11/87例)、頭痛及び複視各5%(4/87例)であった。

## 17.1.5 国内第Ⅲ相試験(小児、併用療法)

小児における部分発作及び全般発作に対するAdd-on投与による第Ⅲ相試験(単盲検比較試験)<sup>33,34)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量はバルプロ酸ナトリウム併用患者には約1～5mg/kg/日(バルプロ酸ナトリウムを併用し、グルクロン酸抱合を誘導する薬剤を非併用の患者には約1～3mg/kg/日)、バルプロ酸ナトリウム非併用患者には約5～15mg/kg/日、維持用量期間8週間と設定して実施した。有効性解析対象症例における最終全般改善度及び各発作型における最終全般改善度は以下のとおりであった。

投与群	症例数	最終全般改善度						検定 Wilcoxon
		著明 改善	改善	やや 改善	不変	悪化	判定 不能	
ラモトリギン群	86	12 (14%)	26 (30%)	18 (21%)	18 (21%)	9 (10%)	3 (3%)	p=0.0009
ゾニサミド群	82	3 (4%)	17 (21%)	17 (21%)	22 (27%)	20 (24%)	3 (4%)	

発作型	投与群	症例数	著明 改善	改善	やや 改善	不変	悪化	判定 不能	改善率
部分発作	ラモトリギン群	33	5	7	7	9	5	0	12(36%)
	ゾニサミド群	39	3	11	9	8	6	2	14(36%)
強直間代発作	ラモトリギン群	17	3	9	1	2	1	1	12(71%)
	ゾニサミド群	12	0	1	3	4	4	0	1(8%)
Lennox-Gastaut 症候群の全般発作	ラモトリギン群	33	3	11	8	6	4	1	14(42%)
	ゾニサミド群	34	0	5	6	11	12	0	5(15%)

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、43%(37/87例)であった。主な副作用は、傾眠26%(23/87例)、浮動性めまい7%(6/87例)であった。

## 17.1.6 海外臨床試験(成人、併用療法)

成人における部分発作に対するAdd-on投与による二重盲検クロスオーバー比較試験<sup>35~37)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量を400mg/日(バルプロ酸ナトリウム非併用)、維持用量期間9週間と設定して実施した結果、ラモトリギン群における発作頻度減少率はプラセボ群と比較して有意に高かった。

ラモトリギン投与期における副作用発現頻度は、70%(66/94例)であった。主な副作用は、浮動性めまい30%(28/94例)、失調27%(25/94例)、複視18%(17/94例)であった。

また、ラモトリギンの維持用量を300mg/日(バルプロ酸ナトリウム非併用)又は150mg/日(バルプロ酸ナトリウム併用)、維持用量期間12週間と設定して実施した結果、ラモトリギン群における発作頻度減少率はプラセボ群と比較して有意に高かった。

ラモトリギン投与期における副作用発現頻度は、71%(29/41例)であった。主な副作用は、浮動性めまい17%(7/41例)、悪心15%(6/41例)、頭痛及び失調各12%(5/41例)であった。

投与量	症例数	発作頻度減少率中央値 <sup>注1)</sup>
400mg	88	25%***
150mg <sup>注2)</sup> 又は300mg	41	26%***

注1)プラセボとの差

注2)バルプロ酸ナトリウム併用の場合

\*\*\* : p<0.001

## V. 治療に関する項目

### 17.1.7 海外臨床試験(小児、併用療法)

小児における部分発作に対するAdd-on投与による二重盲検並行群間比較試験<sup>38, 39)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量をバルプロ酸ナトリウム併用患者には約5 mg/kg/日(最大250mg/日)、バルプロ酸ナトリウム非併用患者には約15mg/kg/日(最大750mg/日)、維持用量期間12週間と設定して実施した結果、ラモトリギン群における発作頻度減少率はプラセボ群と比較して有意に高かった。

投与群	症例数	発作頻度減少率中央値
ラモトリギン群	98	36% **
プラセボ群	101	7%

\*\* :  $p < 0.01$

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、65% (64/98例)であった。主な副作用は、傾眠18% (18/98例)、浮動性めまい15% (15/98例)、失調10% (10/98例)であった。

### 17.1.8 海外臨床試験(小児及び成人、併用療法)

Lennox-Gastaut症候群(3~25歳)における全般発作に対するAdd-on投与による二重盲検並行群間比較試験<sup>40, 41)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量をバルプロ酸ナトリウム併用患者には約5 mg/kg/日(最大200mg/日)、バルプロ酸ナトリウム非併用患者には約15mg/kg/日(最大400mg/日)、維持用量期間10週間と設定して実施した結果、ラモトリギン群における発作頻度減少率はプラセボ群と比較して有意に高かった。

投与群	症例数	発作頻度減少率中央値
ラモトリギン群	78	32% *
プラセボ群	89	9%

\* :  $p < 0.05$

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、30% (24/79例)であった。主な副作用は、発疹8% (6/79例)、嘔吐、悪心及び失調各4% (3/79例)であった。

### 17.1.9 海外臨床試験(小児及び成人、併用療法)

強直間代発作(2~55歳)に対するAdd-on投与による二重盲検並行群間比較試験<sup>42)</sup>を実施した。ラモトリギンの維持用量をバルプロ酸ナトリウム併用患者では、2~12歳には約3 mg/kg/日(最大200mg/日)、12歳超には200mg/日、バルプロ酸ナトリウム非併用患者では、2~12歳には12mg/kg/日(最大400mg/日)、12歳超には400mg/日、維持用量期間12週間と設定して実施した結果、ラモトリギン群における発作頻度減少率はプラセボ群と比較して有意に高かった。

投与群	症例数	発作頻度減少率中央値
ラモトリギン群	58	82% **
プラセボ群	59	43%

\*\* :  $p = 0.006$

ラモトリギン群における副作用発現頻度は、22% (13/58例)であった。主な副作用は、浮動性めまい、傾眠及び悪心各5% (3/58例)であった。

## 〈双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制〉

## 17.1.10 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(成人)

双極Ⅰ型障害を有する患者(215例)を対象に、第1期(8~16週間)として非盲検下でラモトリギン200mgを投与し、第2期(26週間)として、症状が安定した患者を対象にプラセボ対照ランダム化治療中止試験<sup>43)</sup>を実施した。主要評価項目である第2期開始から治験を中止・脱落するまでの期間(Time to withdrawal from study: TWS)は、下表のとおりであり、イベント発現までの時間は、ラモトリギン群ではプラセボ群と比較して長く、統計学的な有意差が認められた(p=0.010、ログランク検定)。

## 第Ⅱ/Ⅲ相試験におけるTWS

	プラセボ群	ラモトリギン群
評価例数	58例	45例
イベント発現割合	74.1%(43例)	53.3%(24例)
TWS中央値[95%信頼区間](日)	67.5[32.0, 127.0]	169.0[111.0, n/c]
プラセボ群との比較 <sup>注)</sup>		p=0.010

n/c: 算出不能

注) ログランク検定

第1期における副作用発現頻度は、32%(69/215例)であった。主な副作用は、発疹6.5%(14/215例)、頭痛4.2%(9/215例)、傾眠3.7%(8/215例)、悪心2.8%(6/215例)であった。

## (2) 安全性試験

## 〈双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制〉

## 17.1.11 国内長期投与試験(成人)

第Ⅱ/Ⅲ相試験に継続して実施した52週間の非盲検長期投与試験において、併用薬により調節した用法及び用量(50~400mg/日)でラモトリギンを投与した結果は、下表のとおりであった<sup>44, 45)</sup>。

評価時期	例数	CGI-S <sup>注1)</sup>		HAM-D17 <sup>注2)</sup>		YMRS <sup>注3)</sup>	
		合計点	変化量	合計点	変化量	合計点	変化量
試験開始時	92	2.9±1.1	—	9.7±8.0	—	3.0±5.5	—
6週	84	2.2±0.9	-0.7±1.0	4.3±4.9	-4.7±7.2	2.6±4.4	-0.3±5.9
16週	78	2.1±0.9	-0.7±1.2	5.2±6.0	-3.8±7.5	1.7±3.0	-1.3±6.1
28週	77	2.1±1.0	-0.7±1.2	4.5±5.1	-4.5±7.7	2.0±5.2	-1.1±5.8
40週	70	2.1±1.0	-0.6±1.2	4.7±5.5	-3.9±7.7	1.7±4.0	-1.1±6.7
52週	68	1.8±0.8	-1.0±1.1	3.9±5.3	-4.4±6.9	0.8±1.7	-2.1±6.0
最終評価時 <sup>注4)</sup>	92	2.1±1.2	-0.8±1.2	5.5±7.3	-4.3±7.2	1.9±5.6	-1.1±7.1

平均値±標準偏差

注1) 対象疾患の重症度

注2) ハミルトンうつ病評価尺度(17項目)

注3) ヤング躁病評価尺度

注4) LOCF (Last Observation Carried Forward)にて欠測値を補完、HAM-D17及びYMRSについては91例

長期投与試験に移行した症例における副作用発現頻度は、21%(19/92例)であった。主な副作用は、胃腸障害7.6%(7/92例)であった(承認時)。

## 5) 患者・病態別試験

該当資料なし

## V. 治療に関する項目

### 6) 治療的使用

(1) 使用成績調査(一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

(2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

I. -6. 参照

### 7) その他

#### 17.3 その他

##### 17.3.1 国内臨床試験における用量の違いによる発疹等の皮膚障害の発現率(バルプロ酸ナトリウム併用患者)

承認用量(初回用量及びその後の漸増用量)より高い用量で投与した国内臨床試験(バルプロ酸ナトリウム併用患者)での発疹等の皮膚障害の発現率は10.4%(18/173例)であったのに対し<sup>46)</sup>、バルプロ酸ナトリウム併用患者において承認用量で投与した第Ⅲ相臨床試験では2.9%(3/102例)であった<sup>47)</sup>。[7.1、8.1参照]

試験	症例数	発疹等の皮膚障害の発現例数(発現率)
承認用量で投与した第Ⅲ相臨床試験	102	3 (2.9%)
承認用量より高い用量で投与した国内臨床試験	173	18 (10.4%)

##### 17.3.2 国内臨床試験における皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)の発現率

成人及び小児てんかん患者を対象とした第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験において、547例中3例(0.5%)に皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)が認められ、いずれもバルプロ酸ナトリウムを併用し、承認用量(初回用量及びその後の漸増用量)より高い用量を投与した症例であった(成人:335例中1例(0.3%)、小児:212例中2例(0.9%))<sup>48)</sup>。[7.1、8.1参照]

## VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

電位依存性Naチャンネル抑制作用：ルフィナミド<sup>49)</sup>

注意：関連のある化合物の効能又は効果等は、最新の電子添文を参照すること。

### 2. 薬理作用

#### 1) 作用部位・作用機序

##### 18.1 作用機序

Na<sup>+</sup>チャンネルを頻度依存のかつ電位依存的に抑制することによって神経膜を安定化させ、グルタミン酸等の興奮性神経伝達物質の遊離を抑制することにより抗痙攣作用を示すと考えられている<sup>1, 2)</sup>。

#### 2) 薬効を裏付ける試験成績

##### 18.2 抗痙攣作用

各種てんかん動物モデルにおいて抗痙攣作用を示すことが報告されている。

18.2.1 マウス及びラットの最大電撃痙攣を抑制する<sup>50)</sup>。

18.2.2 薬物(ペンチレンテトラゾール、4-アミノピリジン及び6, 7-dimethoxy-4-ethyl-β-carboline-3-carboxylate(DMCM))によりマウスに誘発される強直性痙攣を抑制する<sup>50~52)</sup>。

18.2.3 ラット及びイヌの海馬における電気刺激誘発後発射を抑制する<sup>53)</sup>。

18.2.4 扁桃核及び海馬キンドリングラットにおいて、キンドリング発作を抑制し、後発射持続時間を短縮する<sup>54, 55)</sup>。また、扁桃核キンドリングラットにおいてはキンドリングの形成を抑制する<sup>55)</sup>。

18.2.5 各種遺伝的てんかん動物モデル(聴原性発作マウス及びラット、ELマウス、lethargicマウス)のてんかん様発作を抑制する<sup>56~59)</sup>。

18.2.6 ラットにおける協調性運動障害作用は弱く、治療係数(協調性運動障害を示すED<sub>50</sub>値/抗痙攣作用のED<sub>50</sub>値の比)は、フェニトインやジアゼパムよりも高い値を示す<sup>57)</sup>。

#### 3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

## 1. 血中濃度の推移

## 1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

## 2) 臨床試験で確認された血中濃度

## 16.1 血中濃度

## 16.1.1 健康成人

健康成人6例にラモトリギン25～200mgを単回経口投与した時、投与後1.7～2.5時間でCmaxに達し、 $t_{1/2}$ は約31～38時間であった。Cmax及びAUC<sub>0-∞</sub>は投与量の増加に伴い増大した。また、健康成人6例にラモトリギン50mgを1日2回10日間反復経口投与した時、血漿中ラモトリギン濃度は投与6日目に定常状態に達した<sup>60)</sup>。

表1 健康成人にラモトリギン25～200mgを単回経口投与した時のラモトリギンの薬物動態パラメータ

投与量 (mg)	例	Cmax ( $\mu$ g/mL)	Tmax (hr)	$t_{1/2}$ (hr)	AUC <sub>0-∞</sub> ( $\mu$ g・hr/mL)	CLt/F (mL/min)	Vd/F (L)
25	6	0.338±0.031	1.7±0.8	37.9±11.1	15.2±4.9	29.77±9.12	91.0±8.1
50	6	0.718±0.049	2.5±1.2	35.0±4.7	33.7±5.9	25.33±4.09	75.2±4.8
100	6	1.488±0.261	2.3±1.4	30.5±3.3	59.9±12.1	28.79±5.65	74.2±9.2
200	6	3.075±0.336	2.5±1.0	32.4±5.5	136.1±33.2	25.64±5.69	69.8±9.3

平均値±標準偏差

## 16.1.2 てんかん患者

成人てんかん患者を対象とした国内臨床試験において、ラモトリギン200mgを投与した時の血中ラモトリギン濃度は、バルプロ酸ナトリウムを併用し、ラモトリギンのグルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用しない場合は9.6 $\mu$ g/mL、バルプロ酸ナトリウムを併用せず、ラモトリギンのグルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用した場合は2.2 $\mu$ g/mLであった<sup>61)</sup>。成人又は小児てんかん患者を対象とした国内臨床試験において、既存の抗てんかん薬の投与を受けている患者にラモトリギンを投与した時の定常状態における血中ラモトリギン濃度を以下に示した。併用抗てんかん薬によりラモトリギンの維持用量は異なるが、同様の血中濃度が示された。また、ラモトリギンの投与前後で併用抗てんかん薬の血中濃度に顕著な差は認められなかった<sup>61)</sup>。

表2 成人患者における血中濃度

併用薬剤			ラモトリギン維持用量 (mg/日)	患者数 (サンプル数)	血漿中ラモトリギン濃度 <sup>注2)</sup> ( $\mu$ g/mL)
バルプロ酸ナトリウム	ラモトリギンのグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注1)</sup>	ラモトリギンとの薬物相互作用が明らかでない抗てんかん薬			
併用	併用又は非併用	併用又は非併用	100～200	5 (10)	3.25 (1.44～9.58)
非併用	併用	併用又は非併用	200～400	60 (99)	2.81 (0.32～7.28)

注1)カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、フェニトイン

注2)中央値(最小値～最大値)



表3 小児患者における血中濃度

併用薬剤			ラモトリギン維持用量 (mg/kg/日)	患者数 (サンプル数)	血漿中ラモトリギン濃度 <sup>注2)</sup> ( $\mu$ g/mL)
バルプロ酸ナトリウム	ラモトリギンのグルクロン酸抱合を誘導する薬剤 <sup>注1)</sup>	ラモトリギンとの薬物相互作用が明らかでない抗てんかん薬			
併用	非併用	併用又は非併用	1～3	18(45)	3.85 (1.07～11.38)
	併用		1～5	48(101)	2.32 (0.29～5.91)
非併用	非併用	併用又は非併用			5～15
	併用				

注1)カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、フェニトイン  
注2)中央値(最小値～最大値)  
グルクロン酸転移酵素を誘導する抗てんかん薬を併用した時のラモトリギンの $t_{1/2}$ は約14時間であった<sup>62)</sup>(外国人データ)。なお、外国人健康成人にバルプロ酸ナトリウムを併用した時のラモトリギンの $t_{1/2}$ は約70時間であった<sup>63)</sup>。

## &lt;生物学的同等性試験&gt;

●ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」<sup>64,65)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」： 平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号
採血時点	0、0.33、0.67、1、1.5、2、2.5、3、4、6、12、24、48、72hr
休薬期間	21日間
測定方法	LC/MS法
試験製剤	ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」
標準製剤	ラミクタール錠小児用2mg

ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」とラミクタール錠小児用2mgを健康成人男子にそれぞれ1錠(ラモトリギンとして2mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中ラモトリギン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUCt、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。


## 1)そのまま水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng・hr/mL)
ラモトリギン錠 小児用2mg「サワイ」	34.44±3.89	1.4±0.8	50.7±23.2	1227±207
ラミクタール錠 小児用2mg	35.72±4.73	1.0±0.8	49.6±19.8	1233±190

(Mean±S.D.)

VII. 薬物動態に関する項目



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log (0.99)	log (0.97) ~ log (1.01)
Cmax	log (0.97)	log (0.92) ~ log (1.01)


血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2) 咀嚼して水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng·hr/mL)
ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」	33.31 ± 3.70	0.9 ± 0.7	46.8 ± 9.7	1152 ± 138
ラミクタール錠小児用 2mg	34.03 ± 4.10	1.0 ± 0.8	43.8 ± 8.8	1137 ± 157

(Mean ± S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log (1.02)	log (0.99) ~ log (1.04)
Cmax	log (0.98)	log (0.93) ~ log (1.03)

血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」<sup>64,66)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」： 平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号
採血時点	0、0.33、0.67、1、1.5、2、2.5、3、4、6、12、24、48、72hr
休薬期間	21日間
測定方法	LC/MS法
試験製剤	ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
標準製剤	ラミクタール錠小児用 5mg


ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」とラミクタール錠小児用 5mgを健康成人男子にそれぞれ1錠(ラモトリギンとして 5mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中ラモトリギン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

## 1) そのまま水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng・hr/mL)
ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」	65.48±8.36	1.3±0.8	44.7±8.5	2279±298
ラミクタール錠 小児用 5mg	67.26±9.12	1.2±0.8	45.9±9.0	2327±261

(Mean±S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log(0.98)	log(0.95)～log(1.00)
C <sub>max</sub>	log(0.97)	log(0.94)～log(1.01)

血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


VII. 薬物動態に関する項目

2) 咀嚼して水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng・hr/mL)
ラモトリギン錠 小児用5mg「サワイ」	72.16±10.93	1.0±0.5	44.2±7.0	2544±272
ラミクタール錠 小児用5mg	73.41±15.47	1.0±0.6	44.7±6.6	2549±314

(Mean±S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log(1.00)	log(0.98)~log(1.02)
Cmax	log(0.99)	log(0.94)~log(1.05)

血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>14)</sup>

16.8 その他

〈ラモトリギン錠25mg「サワイ」〉

ラモトリギン錠25mg「サワイ」は溶出挙動に基づき、ラモトリギン錠100mg「サワイ」と生物学的に同等とみなされた。

IV. -9. 参照

●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>67, 68)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」： 平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号
採血時点	0、0.33、0.67、1、1.5、2、2.5、3、4、6、12、24、48、72hr
休薬期間	21日間
測定方法	LC/MS法
試験製剤	ラモトリギン錠100mg「サワイ」
標準製剤	ラミクタール錠100mg


ラモトリギン錠100mg「サワイ」とラミクタール錠100mgを健康成人男子にそれぞれ1錠(ラモトリギンとして100mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中ラモトリギン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

1) そのまま水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng・hr/mL)
ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	1638±334	1.4±0.9	38.9±5.6	55877±6321
ラミクタール錠100mg	1598±310	1.4±0.8	39.4±5.5	56495±6866

(Mean±S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log(0.99)	log(0.98)～log(1.00)
C <sub>max</sub>	log(1.02)	log(0.99)～log(1.06)

血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


VII. 薬物動態に関する項目

2) 咀嚼して水で服用

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-72hr</sub> (ng・hr/mL)
ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	1624±158	1.2±0.7	39.9±8.9	57457±7211
ラミクタール錠100mg	1666±196	1.2±0.8	40.3±7.5	57310±6457

(Mean±S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC <sub>0-72hr</sub>	log(1.00)	log(0.99)～log(1.02)
Cmax	log(0.98)	log(0.94)～log(1.02)

血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

3) 中毒域

該当資料なし

4) 食事・併用薬の影響

16.2.1 食事の影響

健康成人12例にラモトリギン150mgを空腹時及び食後に単回経口投与した時、食後投与では空腹時に比べ血漿中ラモトリギンのTmaxは遅延したが、AUCに有意な差を認めなかった<sup>69)</sup>(外国人データ)。

## 16.7 薬物相互作用

## 16.7.1 本剤のグルクロン酸抱合における併用薬剤の影響

[6.、7.2、7.3、10.2参照]

本剤とグルクロン酸抱合が競合する薬剤	本剤のグルクロン酸抱合を誘導(促進)する薬剤	本剤のグルクロン酸抱合に影響を及ぼさない薬剤
バルプロ酸ナトリウム	フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビタール プリミドン リファンピシン ロピナビル・リトナビル配合剤 アタザナビル+リトナビル エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル配合剤(経口避妊薬)	アリピプラゾール オランザピン ゾニサミド ガバペンチン シメチジン トピラマート プレガバリン リチウム レベチラセタム ペランパネル ラコサミド

## 16.7.2 他剤との併用試験

## (1)バルプロ酸ナトリウム

健康成人男性にバルプロ酸ナトリウム500mg(1日2回)とラモトリギン50mg、100mg及び150mg(1日1回)を反復併用した時のラモトリギンの薬物動態を以下に示した。健康成人にラモトリギンのみを反復経口投与した時の成績と比べ、バルプロ酸ナトリウム併用時のラモトリギンの $t_{1/2}$ は2倍以上であり、CLt/Fは1/2以下であった。また、血漿中バルプロ酸濃度に変動はみられたものの一定の傾向はみられず、その有効濃度域を維持していた<sup>70)</sup>(外国人データ)。<sup>[7.2、7.3、10.2参照]</sup>

表8 健康成人にバルプロ酸ナトリウムとラモトリギンを併用した時のラモトリギンの薬物動態パラメータ

ラモトリギン投与量	例	Cmax ( $\mu\text{g/mL}$ )	Cmin ( $\mu\text{g/mL}$ )	Tmax (hr)	$t_{1/2}$ (hr)	AUC <sub>ss</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$ )	CLt/F (mL/min/kg)	Vd/F (L/kg)
50mg	18	3.45±0.61	2.53±0.46	1.83±0.98	75.3±14.1	66.7±10.9	0.17±0.03	0.94±0.10
100mg		6.78±1.13	5.02±0.97	1.96±1.00	69.6±14.3	132.5±22.6	0.17±0.04	0.88±0.09
150mg		9.44±1.71	6.48±1.53	2.02±0.96	69.6±14.8	178.2±37.1	0.20±0.05	1.03±0.18

平均値±標準偏差

## (2)リファンピシン

健康成人男性にリファンピシン600mg(1日1回)を5日間投与した翌日にラモトリギン25mgを単回経口投与した時のラモトリギンのみかけのクリアランス値及び $t_{1/2}$ はそれぞれ5.13L/hr及び14.1時間であった。ラモトリギン単独投与(プラセボ5日間投与の翌日にラモトリギン25mgを単回経口投与)した時のみかけのクリアランス値及び $t_{1/2}$ はそれぞれ2.6L/hr及び23.8時間であり、リファンピシンの前投与によりラモトリギンのみかけのクリアランス値は有意に増加し、 $t_{1/2}$ は有意に短縮した<sup>71)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2、7.3、10.2参照]</sup>

## (3)ロピナビル・リトナビル配合剤

健康成人を対象とした試験において、ラモトリギンとロピナビル・リトナビル配合剤との併用投与により、ラモトリギンの血中濃度が約50%低下した<sup>72)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2、7.3、10.2参照]</sup>

## (4)アタザナビル+リトナビル

健康成人男性を対象とした試験において、ラモトリギン(100mg)とアタザナビル(300mg)、リトナビル(100mg)の3剤を併用投与した時のラモトリギンのAUC、Cmaxは、ラモトリギン(100mg)を単回投与した時と比較してそれぞれ32%、6%低下した<sup>73)</sup>(外国人データ)。<sup>[10.2参照]</sup>

## Ⅶ. 薬物動態に関する項目

### (5) リスペリドン

健康成人を対象とした試験において、ラモトリギン(400mg/日)の反復投与はリスペリドン単回投与時(2mg)の薬物動態に臨床的に問題となる影響を与えなかった。リスペリドン2mgとラモトリギンの併用投与後、14例中12例に傾眠がみられた。ラモトリギン単回投与例では傾眠の報告はなく、リスペリドン単回投与では20例中1例に傾眠がみられた<sup>74)</sup>(外国人データ)。<sup>[10.2参照]</sup>

### (6) 経口避妊薬(エチニルエストラジオール30 $\mu$ g及びレボノルゲストレル150 $\mu$ g含有)

健康成人女性にラモトリギン300mgと経口避妊薬を併用した時、血清中ラモトリギンのAUC<sub>0-24</sub>及びCmaxはラモトリギンの単回投与時のそれぞれ48%及び61%であり、経口避妊薬との併用により血清中ラモトリギン濃度は明らかに低下した。経口避妊薬休薬期間(7日間)では、ラモトリギンの血中濃度が徐々に上昇し、休薬終了時には経口避妊薬服用期間と比較して平均約2倍となった。また、レボノルゲストレルのAUC<sub>0-24</sub>及びCmaxは経口避妊薬単回投与時のそれぞれ81%及び88%であった。一方、エチニルエストラジオールのAUC<sub>0-24</sub>は経口避妊薬単回投与時の93%であったが、Cmaxに違いはみられなかった<sup>75)</sup>(外国人データ)。<sup>[10.2参照]</sup>

### (7) オランザピン

健康成人男性にラモトリギン200mg(1日1回)とオランザピン15mg(1日1回)を反復投与した時の定常状態(56日目)におけるラモトリギンのAUC<sub>0-24</sub>及びCmaxはラモトリギン単回投与時のそれぞれ76%及び80%に低下した。またラモトリギン併用投与時のオランザピンのAUC<sub>0-24</sub>及びCmaxの幾何平均値はオランザピン単回投与時と同程度であった<sup>76)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (8) ゾニサミド

てんかん患者において、ラモトリギン(150~500mg/日)とゾニサミド(200~400mg/日)を35日間併用した時、ラモトリギンの薬物動態に影響を与えなかった<sup>77)</sup>。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (9) ガバペンチン

ラモトリギン単回及びラモトリギンとガバペンチンの併用投与を受けた34例のてんかん患者におけるレトロスペクティブ分析によれば、ガバペンチンはラモトリギンのみかけのクリアランスに影響を与えなかった<sup>78)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (10) トピラマート

てんかん患者において、ラモトリギンとトピラマート(最高:400mg/日)との併用はラモトリギンの定常状態時のAUC、Cmin、Cmaxに影響を与えなかった<sup>79)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (11) レベチラセタム

てんかん患者において、ラモトリギンとレベチラセタム(1000~4000mg/日)との併用は、相互の薬物動態に影響を与えなかった<sup>80,81)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (12) ペランパネル

てんかん患者において、ラモトリギンとペランパネル(12mg/日)を併用投与した時のラモトリギンのみかけのクリアランスは、ペランパネル非併用時と比較して9.3%の増加と推定され、顕著な差はみられなかった<sup>82)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (13) ラコサミド

てんかん患者において、ラモトリギンとラコサミド(200、400mg/日)との併用は、血漿中ラモトリギン濃度に影響を与えなかった<sup>83)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

### (14) プレガバリン

ラモトリギン(100~600mg/日)を単剤で維持投与しているてんかん患者にプレガバリン200mg(1日3回)を反復経口投与した時、プレガバリンは定常状態における血漿中ラモトリギン濃度(トラフ値)に影響を与えなかった<sup>84)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>



**(15) シメチジン**

健康成人男性にシメチジン400mg(1日2回)を5日間投与した翌日にラモトリギン25mgを単回経口投与した時とラモトリギン単独投与(プラセボ5日間投与の翌日にラモトリギン25mgを単回経口投与)した時のラモトリギンの薬物動態パラメータに顕著な差はみられなかった<sup>71)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

**(16) リチウム**

健康成人男性にラモトリギン100mg(1日1回)と無水グルコン酸リチウム2g(1日2回)を6日間反復経口投与した時と無水グルコン酸リチウム単独投与時のリチウムの薬物動態パラメータに顕著な差はみられなかった<sup>85)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

**(17) アリピプラゾール**

ラモトリギン100~400mg/日を維持投与している双極性障害患者において、アリピプラゾール10~30mg/日を併用投与した時、ラモトリギンのC<sub>max</sub>及びAUCは約10%低下した<sup>86)</sup>(外国人データ)。<sup>[6.、7.2参照]</sup>

**16.7.3 *In vitro*試験**

ラモトリギンは有機カチオントランスポーター(OCT2)を介した腎尿細管分泌を阻害する可能性が示された<sup>87)</sup>。

**VIII. -7. 参照****2. 薬物速度論的パラメータ****1) 解析方法**

該当資料なし

**2) 吸収速度定数**

該当資料なし

**3) 消失速度定数**

- ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」を健康成人男子に1錠(ラモトリギンとして2mg)空腹時単回経口投与した場合の消失速度定数<sup>64, 65)</sup>  
 そのまま水で服用した場合： $0.016 \pm 0.005 \text{hr}^{-1}$   
 咀嚼して水で服用した場合： $0.015 \pm 0.003 \text{hr}^{-1}$
- ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」を健康成人男子に1錠(ラモトリギンとして5mg)空腹時単回経口投与した場合の消失速度定数<sup>64, 66)</sup>  
 そのまま水で服用した場合： $0.016 \pm 0.003 \text{hr}^{-1}$   
 咀嚼して水で服用した場合： $0.016 \pm 0.002 \text{hr}^{-1}$
- ラモトリギン錠100mg「サワイ」を健康成人男子に1錠(ラモトリギンとして100mg)空腹時単回経口投与した場合の消失速度定数<sup>67, 68)</sup>  
 そのまま水で服用した場合： $0.018 \pm 0.002 \text{hr}^{-1}$   
 咀嚼して水で服用した場合： $0.018 \pm 0.003 \text{hr}^{-1}$

**4) クリアランス**

該当資料なし

**5) 分布容積**

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

6) その他

該当資料なし

3. 母集団(ポピュレーション)解析 .....

1) 解析方法

該当資料なし

2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収 .....

16.2 吸収

16.2.2 生物学的利用率

健康成人8例にラモトリギン75mgを単回経口投与した時の生物学的利用率は97.6%であった<sup>88)</sup>(外国人データ)。

5. 分布 .....

1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

2) 血液-胎盤関門通過性

VIII. -6. -5) 参照

3) 乳汁への移行性

VIII. -6. -6) 参照

4) 髄液への移行性

該当資料なし

5) その他の組織への移行性

該当資料なし

6) 血漿蛋白結合率

16.3 分布

*In vitro*でのラモトリギン(1~10 $\mu$ g/mL)のヒト血漿蛋白結合率は53.1~56.2%であった<sup>89)</sup>。

## 6. 代謝

## 1) 代謝部位及び代謝経路

## 16.4 代謝

ラモトリギンは主としてグルクロン酸転移酵素(主にUGT1A4)で代謝される。ヒト肝細胞にアミトリプチリン、クロナゼパム、ハロペリドール、もしくはロラゼパム(臨床血漿中濃度)存在下で<sup>14</sup>C-ラモトリギンを添加した時、ラモトリギン-N2-グルクロン酸抱合体の生成が17~29%低下した<sup>90~92)</sup>。[10. 参照]

## 2) 代謝に関与する酵素(CYP等)の分子種、寄与率

VII. -6. -1) 参照

## 3) 初回通過効果の有無及びその割合

VII. -4. 参照

## 4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

VII. -7. 参照

## 7. 排泄

## 16.5 排泄

健康成人6例に<sup>14</sup>C-ラモトリギン240mg(15 $\mu$ Ci)を単回経口投与した時、投与後168時間までに糞中に約2%、尿中に約94%が排泄された。尿中へは主にラモトリギン-N2-グルクロン酸抱合体(約71%)として排泄され、以下未変化体(10%)、ラモトリギン-N5-グルクロン酸抱合体(5~10%)及びラモトリギン-N2-メチル体(0.14%)の順であった<sup>93)</sup>(外国人データ)。

## 8. トランスポーターに関する情報

VII. -1. 4) 参照

## 9. 透析等による除去率

VII. -10. 参照

## 10. 特定の背景を有する患者

## 16.6 特定の背景を有する患者

## 16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害患者12例(クレアチンクリアランス:平均13mL/min)及び透析患者6例(血清クレアチニン:平均854 $\mu$ mol/L)にラモトリギン100mgを単回経口投与した時、ラモトリギンの $t_{1/2}$ は健康成人のそれぞれ約1.6倍及び約2.2倍に遅延し、AUCは腎機能障害患者で約1.8倍に増加した。また血液透析を4時間実施した場合、体内に存在するラモトリギンの約20%が透析により除去された<sup>94,95)</sup>(外国人データ)。[9.2.1参照]

VII. 薬物動態に関する項目

16.6.2 肝機能障害患者

健康成人12例及び肝硬変患者24例にラモトリギン100mgを単回経口投与した時のラモトリギンの薬物動態パラメータを以下に示した。中等度肝硬変患者においてCmaxの低下がみられたものの、他のパラメータでは健康成人との間に顕著な差はみられなかった。重度肝硬変患者では健康成人と比較してCmax及びTmax以外のパラメータに差がみられ、AUC<sub>0-∞</sub>及びt<sub>1/2</sub>は腹水なしで約2倍、腹水ありで約4倍増加し、CL/Fは腹水なしで2/3、腹水ありで1/3に減少した<sup>96,97)</sup>(外国人データ)。<sup>[9.3参照]</sup>

表7 肝機能障害患者におけるラモトリギンの薬物動態パラメータ

	健康被験者 (対照群) (12例)	中等度 肝硬変患者 (12例)	重度肝硬変患者	
			腹水なし (7例)	腹水あり (5例)
Child-Pugh 分類	—	A	B	C
Cmax ( $\mu\text{g/mL}$ )	1.61 (1.14-2.53)	1.34 (0.99-1.81)	1.48 (1.22-2.26)	1.65 (1.12-1.84)
Tmax (hr)	1.00 (1.00-8.00)	1.00 (1.00-4.00)	1.00 (1.00-4.00)	2.00 (1.00-9.52)
t <sub>1/2</sub> (hr)	32.16 (22.27-49.29)	35.99 (30.16-89.08)	59.68 (34.79-145.12)	110.13 (50.11-158.14)
AUC <sub>0-∞</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$ )	69.07 (38.77-98.09)	70.60 (47.86-215.75)	110.72 (73.53-225.35)	248.86 (73.72-368.62)
CL/F (mL/min/kg)	0.338 (0.267-0.593)	0.312 (0.165-0.443)	0.237 (0.114-0.356)	0.103 (0.061-0.260)

中央値(範囲)

16.6.3 高齢者

高齢者12例(65歳以上、クレアチニンクリアランス:平均61mL/min)にラモトリギン150mgを単回経口投与した時、ラモトリギンのCmax、AUC<sub>0-∞</sub>、t<sub>1/2</sub>及びCL/Fの平均値(標準偏差)は各々2.35(0.40) $\mu\text{g/mL}$ 、93.8(21.0) $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$ 、31.2(5.4)時間及び0.396(0.063)mL/min/kgであった。これらは、健康成人男性にラモトリギン150mgを単回経口投与した時のCmax、AUC<sub>0-∞</sub>、t<sub>1/2</sub>及びCL/Fの平均値(標準偏差)、各々2.45(0.18) $\mu\text{g/mL}$ 、117.30(24.61) $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$ 、31.2(6.4)時間、0.313(0.087)mL/min/kgと顕著な差はなかった<sup>60,98,99)</sup>(外国人データ)。

11. その他

該当資料なし

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

## 1. 警告内容とその理由

## 1. 警告

本剤の投与により中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、薬剤性過敏症症候群等の全身症状を伴う重篤な皮膚障害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されているので、以下の事項に注意すること。

1.1 用法及び用量を超えて本剤を投与した場合に皮膚障害の発現率が高いことから、本剤の6. 用法及び用量を遵守すること。

1.1.1 投与開始時は定められた用法及び用量を超えないこと。バルプロ酸ナトリウム併用時の投与開始2週間までは隔日投与にすること(成人のみ)。[7.1参照]

1.1.2 維持用量までの漸増時も定められた用法及び用量を超えないこと。また、増量時期を早めないこと。[7.1参照]

1.2 発疹発現時には早期に皮膚科専門医に相談し、適切な処置を行うこと。また、発疹に加え以下に示す症状があらわれた場合には重篤な皮膚障害に至ることがあるので、直ちに本剤の投与を中止すること。[11.1.1、11.1.2参照]

発熱(38℃以上)、眼充血、口唇・口腔粘膜のびらん、咽頭痛、全身倦怠感、リンパ節腫脹等

1.3 重篤な皮膚障害の発現率は、小児において高いことが示されているので、特に注意すること。[8.1、9.7.1参照]

1.4 患者又は家族に対して、発疹や上記の症状があらわれた場合には直ちに受診するよう指導すること。

## 2. 禁忌内容とその理由

## 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

## 3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

V. -2. 参照

## 4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

V. -4. 参照

## 5. 重要な基本的注意とその理由

## 8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 本剤の投与による発疹は斑状・丘疹状にあらわれることが多く、重篤な皮膚障害の発現率は、本剤投与開始から8週間以内に高く、また、バルプロ酸ナトリウムと併用した場合、あるいは小児において高いことが示されているので、本剤の投与にあたっては十分に注意し、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。[1.3、7.1、9.7.1、11.1.1、17.3.1、17.3.2参照]

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

- 8.2 双極性障害患者を含め、うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期並びに投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。また、新たな自傷、気分変動、アカシジア/精神運動不穏等の情動不安定の発現、もしくはこれらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。[8.3、8.4、9.1.1、15.1.1参照]
- 8.3 自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方する場合には、1回分の処方日数を最小限にとどめること。[8.2、8.4、9.1.1、15.1.1参照]
- 8.4 家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。[8.2、8.3、9.1.1、15.1.1参照]
- 8.5 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
- 〈各種てんかんの治療〉**
- 8.6 てんかん患者では、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、てんかん発作の増悪又はてんかん重積状態があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、発疹の発現等安全性の観点から直ちに投与を中止しなければならない場合を除き、少なくとも2週間以上かけて徐々に減量するなど慎重に行うこと。

### 6. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 1) 合併症・既往歴等のある患者

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者  
[8.2-8.4、15.1.1参照]
- 9.1.2 脳の器質的障害又は統合失調症の素因のある患者  
精神症状を増悪させることがある。
- 9.1.3 他の抗てんかん薬に対しアレルギー歴又は発疹発現の既往歴がある患者  
重篤ではない発疹の発現頻度が約3倍になる。
- 9.1.4 Brugada症候群の患者  
Brugada症候群に特徴的な心電図変化(右脚ブロック及び右側胸部誘導(V1～V3)のcoved型ST上昇)が顕在化したとの報告がある。
- 9.1.5 心不全、基礎心疾患(心筋梗塞、弁膜症、心筋症等)、刺激伝導障害のある患者  
刺激伝導障害を起こす又は悪化させる可能性がある。*In vitro*試験においてヒト心筋型電位依存性Na<sup>+</sup>チャンネル電流を抑制し、抗不整脈薬クラスIb群に属する薬剤と同様の特性を有することが示された。

#### 2) 腎機能障害患者

- 9.2 腎機能障害患者
- 9.2.1 腎不全患者  
腎クリアランスが低下しているために、主代謝物(グルクロン酸抱合体)の血漿中濃度が健康成人よりも高くなることもある。[16.6.1参照]

#### 3) 肝機能障害患者

- 9.3 肝機能障害患者  
減量を考慮すること。肝機能障害の程度に応じて本剤のクリアランスが低下し、消失半減期が延長することがある。[16.6.2参照]

## 4) 生殖能を有する者

設定されていない

## 5) 妊婦

## 9.5 妊婦

9.5.1 以下の報告を考慮し、妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

- ・海外での複数のプロスペクティブ調査において、妊娠第1三半期に本剤を単独投与された総計2000例以上の妊婦の情報が収集されている。本剤使用による大奇形発現リスクの実質的な増加は認められていないが、いくつかの妊娠調査において孤発性の口蓋口唇裂奇形発現リスクの増加が報告されている。ケースコントロール研究においては、他の奇形と比較して、本剤の使用に伴う口蓋口唇裂の発現リスクが高いとの結果は得られていない。本妊娠調査のデータは、多剤併用療法時の先天異常発現のリスクに対する本剤の影響について評価するのに十分なものではない。
- ・動物(ラット)において本剤の胎児への移行が認められたとの報告がある。
- ・動物を用いた生殖発生毒性試験において催奇形性作用は認められなかったが、本剤はジヒドロ葉酸還元酵素に対し弱い阻害作用を有するため、妊娠中に本剤を投与した場合、胎児奇形を誘発する危険性が考えられる。また、ラットでヒト最大用量である400mg/日の0.12倍以上の投与量[体表面積換算(mg/m<sup>2</sup>)に基づく]において母動物の一般状態の悪化に関連した胎児体重の低値、着床後胚・胎児死亡率及び死産児数の増加、胎児骨格変異の発現頻度増加、出生児における神経行動学的異常、出生児回収率(哺育中の巣から出生児を離し、5分以内に母動物が巣内に出生児を連れ戻す)の低下又は出生後の生存率低下がみられた。

9.5.2 妊娠により本剤の血中濃度や治療効果に影響がみられる可能性があるため(妊娠中に本剤の血中濃度が低下したという報告がある)、妊婦に対し本剤を投与する場合には、患者の状態等に十分注意すること。

## 6) 授乳婦

## 9.6 授乳婦

本剤投与中は授乳を避けさせること。本剤はヒト乳汁中へ移行し、授乳中の乳児における血中濃度は、授乳中の女性の血中濃度の最大約50%に達したとの報告がある<sup>100)</sup>。また、授乳されている新生児、乳児において、無呼吸、傾眠、体重増加不良等を起こすことが報告されている。

## 7) 小児等

## 9.7 小児等

## 〈効能共通〉

9.7.1 重篤な皮膚障害の発現率は、小児において高いことが示されている。[1.3、8.1参照]

9.7.2 小児において、発疹の初期徴候は感染と誤診されやすいので、本剤投与開始8週間以内に発疹及び発熱等の症状が発現した場合には特に注意すること。

## 〈各種てんかんの治療〉

9.7.3 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児、及び定型欠神発作以外の単剤療法に対する国内臨床試験は実施していない。[7.5参照]

## 〈双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制〉

9.7.4 小児及び18歳未満の患者を対象とした臨床試験は実施していない。

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

8) 高齢者

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に、生理機能が低下している。

7. 相互作用

10. 相互作用

ラモトリギンは主としてグルクロン酸転移酵素(主にUGT1A4)で代謝される。[16.4参照]

1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バルプロ酸ナトリウム [7.2、7.3、16.7.1、16.7.2 参照]	本剤の消失半減期が約2倍 延長するとの報告がある。	肝におけるグルクロン酸抱 合が競合する。
本剤のグルクロン酸抱合を 誘導する薬剤 フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビタール プリミドン リファンピシン ロピナビル・リトナビル配 合剤 [7.2、7.3、16.7.1、16.7.2 参照]	本剤の血中濃度が低下する。	肝における本剤のグルクロ ン酸抱合が促進される。
アタザナビル+リトナビル [16.7.2参照]	アタザナビル及びリトナビ ル両剤と本剤を併用した場 合に本剤の血中濃度が低下 したとの報告がある。 本剤維持用量投与中にアタ ザナビルとリトナビルを投 与開始又は投与中止する場 合には、本剤の用量調節を考 慮すること。	肝における本剤のグルクロ ン酸抱合が促進される。
カルバマゼピン [6.参照]	本剤とカルバマゼピンの併 用により、めまい、失調、複 視、霧視、嘔気等が発現した という報告があり、通常、こ れらの症状はカルバマゼピ ンの減量により回復する。	機序不明
リスペリドン [16.7.2参照]	本剤とリスペリドンの併用 時には、それぞれの単独投与 時に比較して、傾眠の報告が 多いとの報告がある。	機序不明



薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
経口避妊薬(卵胞ホルモン・ 黄体ホルモン配合剤) [16.7.2参照]	本剤とエチニルエストラジ オール・レボノルゲストレル 配合剤との併用において、以 下の報告がある。 1)本剤の血中濃度が減少し たとの報告があるので、 本剤維持用量投与中に経 口避妊薬を投与開始又は 投与中止する場合には、 本剤の用量調節を考慮す ること。 2)レボノルゲストレルの血 中濃度が減少し、血中卵 胞ホルモン(FSH)及び 黄体形成ホルモン(LH) が上昇し、エストラジ オールが僅かに上昇した との報告がある。	1)肝における本剤のグルク ロン酸抱合が促進され る。  2)機序不明

## 8. 副作用

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 1) 重大な副作用と初期症状

## 11.1 重大な副作用

## 11.1.1 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN) (頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) (0.5%)、多形紅斑(頻度不明)

発熱、眼充血、顔面の腫脹、口唇・口腔粘膜や陰部のびらん、皮膚や粘膜の水疱、紅斑、咽頭痛、そう痒、全身倦怠感等の異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[1.2、7.1、8.1参照]

## 11.1.2 薬剤性過敏症症候群(頻度不明)

発疹、発熱等が初期にみられることがあり、更にリンパ節腫脹、顔面浮腫、血液障害(好酸球増多、白血球増加、異型リンパ球の出現)及び臓器障害(肝機能障害等)の種々の全身症状があらわれることがある。薬剤性過敏症症候群の徴候又は症状<sup>101)</sup>は遅発性に発現する。薬剤性過敏症症候群の徴候が認められた場合には、本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。

また、ヒトヘルペスウイルス6 (HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがある。なお、過敏症の初期症状は、発疹を伴わないこともあるので、発疹以外の症状(発熱又はリンパ節腫脹等)の発現にも注意が必要である。[1.2参照]

## 11.1.3 再生不良性貧血(頻度不明)、汎血球減少(頻度不明)、無顆粒球症(頻度不明)

## 11.1.4 血球貪食症候群(頻度不明)

発熱、発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## 11.1.5 肝炎、肝機能障害及び黄疸(0.1%)

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

11.1.6 無菌性髄膜炎(頻度不明)

項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐又は意識混濁等の症状を伴う無菌性髄膜炎があらわれることがある。本剤の再投与により、さらに重篤な症状を伴う無菌性髄膜炎が投与後すぐに再発したとの報告がある。

2) その他の副作用

11.2 その他の副作用				
	5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明
皮膚	発疹		脱毛	
全身症状			発熱、疲労、疼痛	
精神神経系	傾眠(15%)、めまい	頭痛、不眠、不安・ 焦燥・興奮、てんかん発作回数の増加	易刺激性、運動障害、失調、振戦、 幻覚、眼振、攻撃性	平衡障害、チック、錯乱、パーキンソン症状の悪化、錐体外路症状、舞踏病アテトーゼ、悪夢
消化器	胃腸障害(嘔気・嘔吐、下痢等)	食欲不振		
肝臓	肝機能検査値異常			
血液		白血球減少、好中球減少、貧血	血小板減少、リンパ節症	低ガンマグロブリン血症
眼		複視	霧視、結膜炎	
筋骨格系			背部痛、関節痛	
その他				ループス様反応

9. 臨床検査結果に及ぼす影響 .....  
 設定されていない

10. 過量投与 .....

13. 過量投与

13.1 症状

QRS延長の発現が報告されている。用量上限の10～20倍量により眼振、失調、意識障害、大発作痙攣、昏睡等の症状の発現が報告されている。

11. 適用上の注意 .....

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は少量の水と共にそのまま服用する、あるいは咀嚼又は少なくとも錠剤が浸る程度の少量の水に溶かして服用するよう指導すること。

12. その他の注意.....

1) 臨床使用に基づく情報

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外で実施された本剤を含む複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く(抗てんかん薬服用群:0.43%、プラセボ群:0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1000人あたり1.9人多いと計算された(95%信頼区間:0.6-3.9)。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ1000人あたり2.4人多いと計算されている。[8.2-8.4、9.1.1参照]

15.1.2 本剤はジヒドロ葉酸還元酵素に対し弱い阻害作用を有するため、長期投与により葉酸代謝を阻害する可能性がある。なお、ヒトにおける長期投与の成績において、投与1年目まではヘモグロビン値、平均赤血球容積、血清中及び赤血球中の葉酸濃度に有意な変化は認められず、また、投与5年目まで赤血球中の葉酸濃度に有意な変化は認められなかった。

2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

---

## IX. 非臨床試験に関する項目

---

1. 薬理試験 .....
  - 1) 薬効薬理試験  
「VI. 薬効薬理に関する項目」参照
  - 2) 安全性薬理試験  
該当資料なし
  - 3) その他の薬理試験  
該当資料なし
  
2. 毒性試験 .....
  - 1) 単回投与毒性試験  
該当資料なし
  - 2) 反復投与毒性試験  
該当資料なし
  - 3) 遺伝毒性試験  
該当資料なし
  - 4) がん原性試験  
該当資料なし
  - 5) 生殖発生毒性試験  
VIII. -6. -5) 参照
  - 6) 局所刺激性試験  
該当資料なし
  - 7) その他の特殊毒性  
該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

## 1. 規制区分

規制区分	
製剤	劇薬、処方箋医薬品 <sup>注)</sup>
有効成分	毒薬

注) 注意一医師等の処方箋により使用すること

## 2. 有効期間

有効期間：3年

## 3. 包装状態での貯法

室温保存

## 4. 取扱い上の注意

該当しない

## 5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：あり、くすりのしおり：あり

その他の患者向け資材

ラモトリギン錠「サワイ」を服用される患者さんとそのご家族の方へ（I.-4. 及びXIII.-2. 参照）

## 6. 同一成分・同効薬

同一成分：ラミクタール錠小児用 2mg/錠小児用 5mg/錠25mg/錠100mg

同効薬：電位依存性Naチャンネル抑制作用

ルフィナミド<sup>49)</sup>

## 7. 国際誕生年月日

該当しない

## 8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

製品名	製造販売承認 年月日	承認番号	薬価基準収載 年月日	販売開始 年月日
ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」	2018年 2月 15日	23000AMX00245000	2018年 6月 15日	2018年 6月 15日
ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」	2018年 2月 15日	23000AMX00247000	2018年 6月 15日	2018年 6月 15日
ラモトリギン錠 25mg「サワイ」	2018年 2月 15日	23000AMX00244000	2018年 6月 15日	2018年 6月 15日
ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	2018年 2月 15日	23000AMX00246000	2018年 6月 15日	2018年 6月 15日

X. 管理的事項に関する項目

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

承認年月日：2020年2月5日

効能又は効果内容：「定型欠神発作の単剤療法」の効能又は効果を追加した。

用法及び用量内容：効能又は効果追加に伴い、関連の用法及び用量を追加した。

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

製品名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT番号	レセプト電算処理 システム用コード
ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」	1139009F1013	1139009F1030	126383101	622638301
ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」	1139009F2010	1139009F2036	126384801	622638401
ラモトリギン錠 25mg「サワイ」	1139009F3059	1139009F3059	126381701	622638101
ラモトリギン錠 100mg「サワイ」	1139009F4055	1139009F4055	126382401	622638201

14. 保険給付上の注意

●ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」

特になし

●ラモトリギン錠小児用 5mg/錠25mg/錠100mg「サワイ」

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

---

**XI . 文 献**


---

1. 引用文献
- 1) Xie, X. et al. : Pflügers Arch., 1995 ; 430 : 437-446
  - 2) Leach, M. J. et al. : Epilepsia, 1986 ; 27 : 490-497
  - 3) 医療用医薬品最新品質情報集(ブルーブック) <<https://www.nihs.go.jp/drug/ecqaged/bluebook/list.html>> (2024/11/1 アクセス)
  - 4) 沢井製薬(株) 社内資料[加速試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
  - 5) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
  - 6) 沢井製薬(株) 社内資料[加速試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
  - 7) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
  - 8) 沢井製薬(株) 社内資料[加速試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
  - 9) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
  - 10) 沢井製薬(株) 社内資料[加速試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
  - 11) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
  - 12) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
  - 13) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
  - 14) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
  - 15) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
  - 16) 沢井製薬(株) 社内資料[自動分包機錠剤落下試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
  - 17) 沢井製薬(株) 社内資料[自動分包機錠剤落下試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
  - 18) 沢井製薬(株) 社内資料[自動分包機錠剤落下試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
  - 19) 沢井製薬(株) 社内資料[自動分包機錠剤落下試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
  - 20) 沢井製薬(株) 社内資料[分散性] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
  - 21) 沢井製薬(株) 社内資料[分散性] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
  - 22) 沢井製薬(株) 社内資料[分散性] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
  - 23) 沢井製薬(株) 社内資料[分散性] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
  - 24) Yamamoto, T. et al. : Epilepsy & Seizure Journal of Japan Epilepsy Society, 2014 ; 7 : 55-65
  - 25) 国際共同第Ⅲ相試験(成人、単剤療法)(ラミクタール錠 : 2014年 8月29日承認、審査報告書)
  - 26) Yasumoto, S. et al. : Brain Dev., 2016 ; 38 : 407-413
  - 27) 国際共同第Ⅲ相試験(小児、単剤療法)(ラミクタール錠 : 2015年 9月24日承認、申請資料概要2.7.6 LAM115377試験)
  - 28) Reunanen, M. et al. : Epilepsy Res., 1996 ; 23 : 149-155
  - 29) 海外第Ⅲ相試験(小児及び成人、単剤療法)(ラミクタール錠 : 2014年 8月29日承認、審査報告書)
  - 30) 村崎光邦他 : 臨床精神薬理, 2008 ; 11 : 117-134
  - 31) 国内第Ⅲ相試験(成人、併用療法)①(ラミクタール錠 : 2008年10月16日承認、申請資料概要 2.7.6.3.1.2)
  - 32) 国内第Ⅲ相試験(成人、併用療法)②(ラミクタール錠 : 2008年10月16日承認、審査報告書)
  - 33) 大田原俊輔他 : てんかん研究, 2008 ; 25 : 425-440
  - 34) 国内第Ⅲ相試験(小児、併用療法)(ラミクタール錠 : 2008年10月16日承認、審査報告書)

## X I. 文献

- 35) Messenheimer, J. et al. : *Epilepsia*, 1994 ; 35 : 113-121
- 36) Schapel, G. J. et al. : *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, 1993 ; 56 : 448-453
- 37) 海外臨床試験(成人、併用療法)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.3.3.2.2.1, 2.7.6.3.1.5, 2.7.6.3.1.6)
- 38) Duchowny, M. et al. : *Neurology*, 1999 ; 53 : 1724-1731
- 39) 海外臨床試験(小児、併用療法)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.3.1.8)
- 40) Motte, J. et al. : *N. Engl. J. Med.*, 1997 ; 337 : 1807-1812
- 41) 海外臨床試験(小児及び成人、併用療法)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.3.1.9)
- 42) Biton, V. et al. : *Neurology*, 2005 ; 65 : 1737-1743
- 43) 小山司他: 臨床精神医学, 2011 ; 40 : 369-383
- 44) 国内長期投与試験(成人)①(ラミクタール錠:2011年7月1日承認、申請資料概要2.7.4.7, 2.7.6.SCA106052試験)
- 45) 国内長期投与試験(成人)②(ラミクタール錠:2011年7月1日承認、審査報告書)
- 46) 厚生労働省医薬食品局: 医薬品・医療機器等安全性情報, No.287(2012)
- 47) 国内臨床試験における皮膚障害の発現率(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.3.2.9)
- 48) 国内臨床試験における皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)の発現率(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.5.5.4)
- 49) 薬剤分類情報閲覧システム<<https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/>> (2024/11/1 アクセス)
- 50) Miller, A. A. et al. : *Epilepsia*, 1986 ; 27 : 483-489
- 51) Cramer, C. L. et al. : *Life Sci.*, 1994 ; 54 : PL271-275
- 52) Dalby, N. O. et al. : *Epilepsy Res.*, 1997 ; 28 : 63-72
- 53) Wheatley, P. L. et al. : *Epilepsia*, 1989 ; 30 : 34-40
- 54) Otsuki, K. et al. : *Epilepsy Res.*, 1998 ; 31 : 101-112
- 55) Stratton, S. C. et al. : *Epilepsy Res.*, 2003 ; 53 : 95-106
- 56) De Sarro, G. et al. : *Neuropharmacology*, 1996 ; 35 : 153-158
- 57) Smith, S. E. et al. : *Epilepsy Res.*, 1993 ; 15 : 101-111
- 58) Hosford, D. A. et al. : *Epilepsia*, 1997 ; 38 : 408-414
- 59) 遺伝的てんかんモデル動物での評価(ELマウス)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.6.2.2)
- 60) 血中濃度(健康成人)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.2.1)
- 61) 血中濃度(てんかん患者)(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.2.2)
- 62) Jawad, S. et al. : *Epilepsy Res.*, 1987 ; 1 : 194-201
- 63) Anderson, G. D. et al. : *Clin. Pharmacol. Ther.*, 1996 ; 60 : 145-156
- 64) 竹内譲他: 新薬と臨床, 2018 ; 67(4) : 429-445
- 65) 沢井製薬(株) 社内資料[生物学的同等性試験] ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」
- 66) 沢井製薬(株) 社内資料[生物学的同等性試験] ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」
- 67) 高野和彦他: 新薬と臨床, 2018 ; 67(4) : 417-427
- 68) 沢井製薬(株) 社内資料[生物学的同等性試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
- 69) 食事の影響(ラミクタール錠:2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.1.1.2)



- 70)他剤との併用試験(バルプロ酸ナトリウム)(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.2.1.7)
- 71)Ebert, U. et al. : Eur. J. Clin. Pharmacol., 2000 ; 56 : 299-304
- 72)van der Lee, M. J. et al. : Clin. Pharmacol. Ther., 2006 ; 80 : 159-168
- 73)Burger, D. M. et al. : Clin. Pharmacol. Ther., 2008 ; 84 : 698-703
- 74)他剤との併用試験(リスペリドン)(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.2.4.4)
- 75)他剤との併用試験(経口避妊薬)(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.2.4.1)
- 76)他剤との併用試験(オランザピン)(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.4.2, 2.7.6.2.4.2)
- 77)Levy, R. H. et al. : Ther. Drug Monit., 2005 ; 27 : 193-198
- 78)Weintraub, D. et al. : Arch. Neurol., 2005 ; 62 : 1432-1436
- 79)Doose, D. R. et al. : Epilepsia, 2003 ; 44 : 917-922
- 80)Gidal, B. E. et al. : Epilepsy Res., 2005 ; 64 : 1-11
- 81)Perucca, E. et al. : Epilepsy Res., 2003 ; 53 : 47-56
- 82)Majid, O. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol., 2016 ; 82 : 422-430
- 83)Halász, P. et al. : Epilepsia, 2009 ; 50 : 443-453
- 84)Brodie, M. J. et al. : Epilepsia, 2005 ; 46 : 1407-1413
- 85)他剤との併用試験(リチウム)(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.2.4.3)
- 86)Schieber, F. C. et al. : Hum. Psychopharmacol., 2009 ; 24 : 145-152
- 87)*In vitro*試験(ラミクタール錠：2011年7月1日承認、申請資料概要2.7.4.6)
- 88)Yuen, W. C. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol., 1988 ; 26 : 242P
- 89)分布(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.6.4.4.3)
- 90)Magdalou, J. et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther., 1992 ; 260 : 1166-1173
- 91)Green, M. D. et al. : Drug Metab. Dispos., 1995 ; 23 : 299-302
- 92)代謝(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.1.7)
- 93)排泄(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.1.4)
- 94)Fillastre, J. P. et al. : Drugs Exp. Clin. Res., 1993 ; 19 : 25-32
- 95)腎機能障害患者(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.3.3)
- 96)Marcellin, P. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol., 2001 ; 51 : 410-414
- 97)肝機能障害患者(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.2.2.3.1)
- 98)Posner, J. et al. : J. Pharm. Med., 1991 ; 1 : 121-128
- 99)高齢者(ラミクタール錠：2008年10月16日承認、申請資料概要2.7.6.2.3.5)
- 100)Newport, D. J. et al. : Pediatrics, 2008 ; 122 : e223-231
- 101)厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候群
- 102)沢井製薬(株) 社内資料[粉碎後の安定性試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
- 103)沢井製薬(株) 社内資料[粉碎後の安定性試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
- 104)沢井製薬(株) 社内資料[粉碎後の安定性試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」
- 105)沢井製薬(株) 社内資料[粉碎後の安定性試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」
- 106)沢井製薬(株) 社内資料[崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験] ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」
- 107)沢井製薬(株) 社内資料[崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験] ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」
- 108)沢井製薬(株) 社内資料[崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験] ラモトリギン錠25mg「サワイ」

X I . 文献

109) 沢井製薬(株) 社内資料[崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験] ラモトリギン錠100mg「サワイ」

2. その他の参考文献 .....

---

## XII. 参考資料

---

1. 主な外国での発売状況 .....
  
  2. 海外における臨床支援情報 .....
- 該当資料なし

### XIII. 備考

#### 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

##### 1) 粉砕

###### <粉砕後の安定性試験>

###### ●ラモトリギン錠小児用 2mg「サワイ」<sup>102)</sup>

本製剤を粉砕後、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	透明瓶開放 (室温、30日)	透明瓶密栓 (室温、30日)	褐色瓶密栓 (室温、30日)
性状	白色の粉末	変化なし	変化なし	変化なし
定量試験*	100.0	99.5	99.7	99.9

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

###### ●ラモトリギン錠小児用 5mg「サワイ」<sup>103)</sup>

本製剤を粉砕後、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	透明瓶開放 (室温、30日)	透明瓶密栓 (室温、30日)	褐色瓶密栓 (室温、30日)
性状	白色の粉末	変化なし	変化なし	変化なし
定量試験*	100.0	99.7	99.2	99.2

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

###### ●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>104)</sup>

本製剤を粉砕後、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	透明瓶開放 (室温、90日)	透明瓶密栓 (室温、90日)	褐色瓶密栓 (室温、90日)
性状	白色の粉末	変化なし	変化なし	変化なし
定量試験*	100.0	100.1	99.5	99.8

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>105)</sup>

本製剤を粉碎後、下記条件で保存し、安定性試験を行った。  
その結果、以下の結果が得られた。

	イニシャル	透明瓶開放 (室温、90日)	透明瓶密栓 (室温、90日)	褐色瓶密栓 (室温、90日)
性状	白色の粉末	変化なし	変化なし	変化なし
定量試験※	100.0	100.3	100.2	100.1

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

<崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験>

●ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」<sup>106)</sup>

試験方法

1. 本剤を1錠、シリンジにとり(ピストン部を抜き取り、錠剤を入れてピストン部を戻す)、温湯(約55℃)20mLを採取した。
2. 5分放置後シリンジを15回転倒混和し、崩壊・懸濁状態を確認した。  
崩壊しない場合、5分毎に同様の操作を繰り返した。(最大20分まで)
3. シリンジ内の液を8Fr.(外径2.7mm)フィーディングチューブに注入し、水(20mL)でフラッシュ後、通過状態を観察した。

結 果

懸濁状態	錠剤は1分以内に崩壊し、転倒混和により懸濁液となったが、試料は沈殿しやすかった
チューブ通過性	通過した

●ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」<sup>107)</sup>

試験方法

1. 本剤を1錠、シリンジにとり(ピストン部を抜き取り、錠剤を入れてピストン部を戻す)、温湯(約55℃)20mLを採取した。
2. 5分放置後シリンジを15回転倒混和し、崩壊・懸濁状態を確認した。  
崩壊しない場合、5分毎に同様の操作を繰り返した。(最大20分まで)
3. シリンジ内の液を8Fr.(外径2.7mm)フィーディングチューブに注入し、水(20mL)でフラッシュ後、通過状態を観察した。

結 果

懸濁状態	錠剤は1分以内に崩壊し、転倒混和により懸濁液となったが、試料は沈殿しやすかった
チューブ通過性	通過した

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」<sup>108)</sup>

試験方法

1. 本剤を1錠、シリンジにとり(ピストン部を抜き取り、錠剤を入れてピストン部を戻す)、温湯(約55℃)20mLを採取した。
2. 5分放置後シリンジを15回転倒混和し、崩壊・懸濁状態を確認した。  
崩壊しない場合、5分毎に同様の操作を繰り返した。(最大20分まで)
3. シリンジ内の液を8Fr.(外径2.7mm)フィーディングチューブに注入し、水(20mL)でフラッシュ後、通過状態を観察した。

結 果

懸濁状態	錠剤は1分以内に崩壊し、転倒混和により懸濁液となったが、試料は沈殿しやすかった
チューブ通過性	通過した

●ラモトリギン錠100mg「サワイ」<sup>109)</sup>

試験方法

1. 本剤を1錠、シリンジにとり(ピストン部を抜き取り、錠剤を入れてピストン部を戻す)、温湯(約55℃)20mLを採取した。
2. 5分放置後シリンジを15回転倒混和し、崩壊・懸濁状態を確認した。  
崩壊しない場合、5分毎に同様の操作を繰り返した。(最大20分まで)
3. シリンジ内の液を8Fr.(外径2.7mm)フィーディングチューブに注入し、水(20mL)でフラッシュ後、通過状態を観察した。

結 果

懸濁状態	錠剤は1分以内に崩壊し、転倒混和により懸濁液となったが、試料は沈殿しやすかった
チューブ通過性	通過した

2. その他の関連資料 .....

患者向け資材

●ラモトリギン錠小児用2mg/錠小児用5mg/錠25mg/錠100mg「サワイ」

- ・ラモトリギン錠「サワイ」を服用される患者さんとそのご家族の方へ
- ・自動車運転等はしないでください・お知らせ指導箋

●ラモトリギン錠25mg「サワイ」

- ・ラモトリギン錠25mg「サワイ」服薬指導シート成人用A
- ・ラモトリギン錠25mg「サワイ」服薬指導シート成人用B
- ・ラモトリギン錠25mg「サワイ」服薬指導シート成人用C

医療関係者向け資材

●ラモトリギン錠小児用2mg/錠小児用5mg/錠25mg/錠100mg「サワイ」

- ・ラモトリギン錠小児用錠「サワイ」適正使用のお願い
- ・ラモトリギン錠「サワイ」処方にあたって\_てんかん小児用

●ラモトリギン錠25mg/錠100mg「サワイ」

- ・ラモトリギン錠「サワイ」処方にあたって\_双極性障害成人用
- ・ラモトリギン錠「サワイ」処方にあたって\_てんかん成人用

沢井製薬株式会社「医療関係者向け総合情報サイト」<https://med.sawai.co.jp/> 参照



