

# ドセタキセル 点滴静注用20mg「サワイ」・80mg「サワイ」 ご使用にあたって



**本剤は添付溶解液にエタノールを含有しています。  
アルコールに過敏な患者さんには十分にご注意ください。**

本剤は、タキソテール点滴静注用20mg・80mg(サノフィ株式会社)と同一で、ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL・80mg/4mL(サノフィ株式会社)と以下のとおりに相違がありますので、ご使用に際してはご注意ください。

|          |            | ドセタキセル 点滴静注用「サワイ」                   |        | タキソテール <sup>®</sup> 点滴静注用           |        | ワンタキソテール <sup>®</sup> 点滴静注 |          |
|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------|----------|
| 規格       |            | 20mg                                | 80mg   | 20mg                                | 80mg   | 20mg/1mL                   | 80mg/4mL |
| エタノール量   | ドセタキセルバイアル | なし                                  | なし     | なし                                  | なし     |                            |          |
|          | 添付溶解液      | 180mg*                              | 720mg* | 180mg*                              | 720mg* | 395mg                      | 1580mg   |
| 調製方法     |            | ①添付溶解液で溶解<br>②生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解 |        | ①添付溶解液で溶解<br>②生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解 |        | プレミックス**不要                 |          |
| 製剤写真     |            |                                     |        |                                     |        |                            |          |
| ドセタキセル濃度 |            | 10mg/mL<br>(添付溶解液で溶解後のプレミックス液)      |        | 10mg/mL<br>(添付溶解液で溶解後のプレミックス液)      |        | 20mg/mL<br>ドセタキセルの濃度が2倍    |          |

※日局エタノールを無水エタノールに換算した重量です。  
 ※※プレミックス：バイアルを輸液に混和する前に、エタノール溶液または調製用輸液で溶解する作業です。

〈裏面も必ずご覧ください。〉

# ドセタキセル「サワイ」製剤 外観比較表

|          |      | ドセタキセル 点滴静注用「サワイ」   |                  | ドセタキセル 点滴静注液「サワイ」  |          |
|----------|------|---|------------------|--|----------|
| 規格       |      | 20mg  | 80mg             | 20mg/1mL   | 80mg/4mL |
| エタノール量   |      | 180mg<br>(添付溶解液)  | 720mg<br>(添付溶解液) | 395mg  | 1580mg   |
| 調製方法     |      | ① 添付溶解液で溶解<br>② 生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解   |                  | プレミックス*不要  |          |
| 製剤写真     | バイアル |   |                  |   |          |
|          | 外箱   |  |                  |  |          |
| ドセタキセル濃度 |      | 10mg/mL<br>(添付溶解液で溶解後のプレミックス液)  |                  | 20mg/mL<br>[ドセタキセルの濃度が2倍]  |          |

\*プレミックス：バイアルを輸液に混和する前に、エタノール溶液または調製用輸液で溶解する作業です。

**上記2製剤は販売名が類似しているため、ご使用前に必ず、今一度、販売名及び薬剤濃度等をご確認いただき、取り違えに十分ご注意ください。**