

ファモチジン静注液「サワイ」適正使用のお願い

H₂受容体拮抗剤

2021年1月

日本薬局方 ファモチジン注射液

ファモチジン静注液 10mg「サワイ」

ファモチジン静注液 20mg「サワイ」

先発品：ガスター

2020年8月17日に製造販売承認を取得したファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」につきましては、ファモチジン注射用10mg/20mg「サワイ」と異なり、筋肉内投与はできません。両製剤には用法・用量に相違がございますので、ご使用の際はご留意いただきますようお願い致します。

■添付文書記載の相違点

	ファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」	ファモチジン注射用10mg/20mg「サワイ」
用法・用量	<p>○上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制</p> <p>通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを1日2回(12時間毎)緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。なお、年齢・症状により適宜増減する。</p> <p>上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみるが、内服可能となった後は経口投与に切りかえる。</p> <p>侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与とする。</p> <p>○麻酔前投薬</p> <p>通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。</p>	<p>・上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制</p> <p>通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液20mLにて溶解し、1日2回(12時間毎)緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。<u>又は、ファモチジンとして1回20mgを日局注射用水1~1.5mLに溶解し、1日2回(12時間毎)筋肉内投与する。</u></p> <p>なお、年齢・症状により適宜増減する。</p> <p>上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみるが、内服可能となった後は経口投与に切りかえる。</p> <p>侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与とする。</p> <p>・麻酔前投薬</p> <p>通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを日局注射用水1~1.5mLに溶解し、麻酔導入1時間前に筋肉内投与する。<u>又は、日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液20mLにて溶解し、麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。</u></p>
適用上の注意	(該当なし)	<p>1) <u>筋肉内注射時</u>：筋肉内注射にあたっては、組織・神経等への影響を避けるため、下記の点に配慮すること。</p> <p>(1)筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ、必要最小限に行うこと。同一部位への反復注射は行わないこと。特に新生児、低出生体重児、幼児、小児には注意すること。</p> <p>(2)神経走行部位を避けるよう注意すること。</p> <p>(3)注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。</p> <p>(4)注射部位に疼痛、硬結をみることもある。</p> <p>2) <u>アンプルカット時</u>：本品はワンポイントアンプルなので、マークを上にして下方へ折ること。なお、アンプルカット部分をエタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。</p>

詳細は製品添付文書をご参照ください。

適正使用のお願い

ファモチジン 静注液 10mg/20mg「サワイ」

■ ファモチジン 静注液 10mg「サワイ」



(実物大)

■ ファモチジン 静注液 20mg「サワイ」



(実物大)

【包装】

(ルアーフィットポリエチレンボトル)

ファモチジン 静注液 10mg「サワイ」：(10mL)10管

ファモチジン 静注液 20mg「サワイ」：(20mL)10管、50管

以上

医療関係者向け総合情報サイト
sawai medical site 簡単アクセス▶▶
<https://med.sawai.co.jp/>



■ お問い合わせ窓口
医薬品情報センター
0120-381-999



沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30