

*** 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。***

リバスチグミンテープ 4.5mg/ 9mg 13.5mg/18mg 「サワイ」

適正使用のお願い

— 過量投与及びテープを切って使用することについて —

2020年12月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 0120(381)999

リバスチグミン経皮吸収型製剤を処方された患者様において、テープのはがし忘れや複数枚同時使用による過量投与及びテープを切って使用する等、投与量に関する誤使用の事例が報告されています。

本剤を投与する際は、以下の点について患者様及びご家族・介護者の方へご指導頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

【以下の事項について、患者様及びご家族・介護者の方へ説明してください。】

◎本剤は**1日1枚を24時間ごとに貼り替えます**。貼り替える際は、**前日に貼ったテープをはがしたことを十分に確認**してください。

貼り替える際に、前日のテープをはがさないまま新たなテープを貼った場合、過量投与となり重篤な副作用が発現するおそれがあります。貼付24時間後でも本剤の成分がテープに残っていますので、必ず前日のテープをはがしてから新しいテープを貼ってください。

◎本剤は**医療従事者又はご家族・介護者の方のもとで使用し、患者様が誤って使用する可能性がある場合にはご家族・介護者の方が薬剤を適切な場所に保管**してください。特に**シップ等と混同しないように注意**してください。

患者様ご本人が投与量を誤認したり、他の貼付剤(シップ等)と誤解して複数枚貼った場合、過量投与となるおそれがあります。ご家族・介護者の方も、このような誤使用のないよう注意して取り扱ってください。

◎本剤は**切って使用しないでください**。

本剤を切って使用した場合の有効性及び安全性は確認されておりません。

本剤の使用にあたっては、最新の添付文書をご確認ください。