

アレルギー性疾患治療剤

オキサトミド[®]DS小児用2%「サワイ」**OXATOMIDE**

オキサトミドドライシロップ

通常、小児には1回オキサトミドとして0.5mg/kg(ドライシロップとして25mg/kg)を用時水で懸濁して、朝及び就寝前の1日2回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1回最高用量はオキサトミドとして0.75mg/kg(ドライシロップとして37.5mg/kg)を限度とする。

年齢*	体重* (kg)	DSとして 1日投与量(g)	年齢*	体重* (kg)	DSとして 1日投与量(g)
6ヵ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳	4	0.20	10歳	34	1.70
	6	0.30		36	1.80
	8	0.40	11歳	38	1.90
	10	0.50		40	2.00
	12	0.60	12歳	42	2.10
	14	0.70		44	2.20
	16	0.80	13歳	46	2.30
	18	0.90		48	2.40
	20	1.00	14歳	50	2.50
	22	1.10		52	2.60
	24	1.20	15歳	54	2.70
	26	1.30		56	2.80
28	1.40	58	2.90		
30	1.50	60	3.00		
32	1.60				

* 2010/2011年「国民衛生の動向」

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。