

深在性真菌症治療剤

2020年 9 月

処方箋医薬品

日本薬局方 フルコナゾールカプセル

フルコナゾールカプセル 50mg「サワイ」

フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

| 改訂後   |  |   | 改訂前   |           |          |
|---|--|---|---|-----------|----------|
| <b>3. 相互作用</b><br>本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。<br>2)併用注意(併用に注意すること) |  |   | <b>3. 相互作用</b><br>本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。<br>2)併用注意(併用に注意すること) |           |          |
| 薬 剤 名 等   | 臨床症状・措置方法  | 機序・危険因子   | 薬 剤 名 等   | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子  |
| トルバプタン  | トルバプタンの血中濃度上昇の報告があり、トルバプタンの作用が増強するおそれがある。やむを得ず併用する際は、トルバプタンを減量あるいは低用量から開始すること。 | 本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。 |   |           |          |
| イブルチニブ  | イブルチニブの副作用が増強されるおそれがある。やむを得ず併用する際は、イブルチニブの減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。         | 本剤はイブルチニブの主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりイブルチニブの血中濃度が上昇することがある。       |   |           |          |
|   |  |   |   |           | 〈該当項目なし〉 |



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。