

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

お知らせ文書 No. 20-56

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

2020年11月

処方箋医薬品

ペリンドプリルエルブミン錠 2mg「サワイ」

ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」

(ペリンドプリルエルブミン錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

## 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 記

#### ・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前
<p><b>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</b> 2) <u>アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬</u> <u>(サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物)</u> <u>を投与中の患者又は投与中止から36時間以内の</u> <u>患者(「相互作用」の項参照)</u></p>	<p><b>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</b>  〈該当項目なし〉</p>

(裏面につづく)



改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
<b>3. 相互作用</b>			<b>3. 相互作用</b>		
1) 併用禁忌(併用しないこと)			1) 併用禁忌(併用しないこと)		
薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 (エンレスト)	血管浮腫があらわれるおそれがある。左記薬剤が投与されている場合は、少なくとも本剤投与開始36時間前に中止すること。また、本剤投与終了後に左記薬剤を投与する場合は、本剤の最終投与から36時間後までは投与しないこと。	併用により相加的にブラジキニンの分解を抑制し、血管浮腫のリスクを増加させる可能性がある。	〈該当項目なし〉		
<b>4. 副作用</b>			<b>4. 副作用</b>		
1) 重大な副作用(頻度不明)			1) 重大な副作用(頻度不明)		
(2) 急性腎障害：急性腎障害があらわれることがあるので、腎機能に異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。			(2) 急性腎不全：急性腎不全があらわれることがあるので、腎機能に異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。		

☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。