

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年10月
沢井製薬株式会社キサンチン系気管支拡張剤
処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠

テオフィリン徐放錠 50mg「サワイ」

キサンチン系気管支拡張剤
劇薬、処方箋医薬品
テオフィリン徐放ドライシロップ

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」

キサンチン系気管支拡張剤
処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠

テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」

劇薬、処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠

テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前						
<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 2)12時間以内にアデノシン(アデノスキャン)を使用する患者(「相互作用」の項参照)</p> <p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP1A2で代謝される。</p> <p>1)併用禁忌(併用しないこと)</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>アデノシン (アデノスキャン)</td><td>本剤によりアデノシンによる冠血流速度の増加及び冠血管抵抗の減少を抑制し、虚血診断に影響を及ぼすことがある。アデノシン(アデノスキャン)を投与する場合は12時間以上の間隔をあけること。</td><td>本剤はアデノシン受容体に拮抗するため、アデノシンの作用を減弱させる。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アデノシン (アデノスキャン)	本剤によりアデノシンによる冠血流速度の増加及び冠血管抵抗の減少を抑制し、虚血診断に影響を及ぼすことがある。アデノシン(アデノスキャン)を投与する場合は12時間以上の間隔をあけること。	本剤はアデノシン受容体に拮抗するため、アデノシンの作用を減弱させる。	<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 〈該当項目なし〉</p> <p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP1A2で代謝される。</p> <p>「併用禁忌」の項新設</p>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
アデノシン (アデノスキャン)	本剤によりアデノシンによる冠血流速度の増加及び冠血管抵抗の減少を抑制し、虚血診断に影響を及ぼすことがある。アデノシン(アデノスキャン)を投与する場合は12時間以上の間隔をあけること。	本剤はアデノシン受容体に拮抗するため、アデノシンの作用を減弱させる。					

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。

テオフィリン徐放錠 50mg「サワイ」



(01)14987080000515

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」



(01)14987080000447

テオフィリン徐放錠 100mg/200mg「サワイ」



(01)14987080001413

