

マイナートランキライザー

2014年 2月

向精神薬・処方せん医薬品

メデポリン[®]錠 0.4
メデポリン[®]錠 0.8

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 06(6105)5816

(アルプラゾラム錠)

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (下線部改訂又は追加箇所、取り消し線部削除箇所)

改訂後	改訂前												
<p>3. 相互作用</p> <p>2) 併用注意(併用に注意すること)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>ジゴキシン</u></td><td><u>本剤との併用においてジゴキシンの血中濃度が上昇するとの報告がある。特に高齢者では注意すること。</u></td><td><u>機序不明</u></td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>ジゴキシン</u>	<u>本剤との併用においてジゴキシンの血中濃度が上昇するとの報告がある。特に高齢者では注意すること。</u>	<u>機序不明</u>	<p>3. 相互作用</p> <p>2) 併用注意(併用に注意すること)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">〈該当項目なし〉</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	〈該当項目なし〉		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
<u>ジゴキシン</u>	<u>本剤との併用においてジゴキシンの血中濃度が上昇するとの報告がある。特に高齢者では注意すること。</u>	<u>機序不明</u>											
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
〈該当項目なし〉													
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>(4) 痒疹、蕁麻疹、顔面潮紅・腫脹、息切れ等のアナフィラキシーがあらわれたとの報告があるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、痒疹、<u>光線過敏性反応</u></td></tr></tbody></table> <p>注)このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	過敏症^{注)}	発疹、痒疹、<u>光線過敏性反応</u>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>(4) 痒疹、蕁麻疹、顔面潮紅・腫脹、息切れ等のアナフィラキシー様症状があらわれたとの報告があるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、痒疹</td></tr></tbody></table> <p>注)このような場合には投与を中止すること。</p>		頻度不明	過敏症^{注)}	発疹、痒疹				
	頻度不明												
過敏症^{注)}	発疹、痒疹、<u>光線過敏性反応</u>												
	頻度不明												
過敏症^{注)}	発疹、痒疹												

