

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年5月
沢井製薬株式会社キサンチン系気管支拡張剤
処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠
テオフィリン徐放錠 50mg「サワイ」キサンチン系気管支拡張剤
劇薬、処方箋医薬品
テオフィリン徐放ドライシロップ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」キサンチン系気管支拡張剤
処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠
テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」劇薬、処方箋医薬品
テオフィリン徐放錠
テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所、取り消し線部削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>7. 用法及び用量に関連する注意 〈気管支喘息〉</p> <p>7.2 小児に投与する場合の投与量、投与方法等については、学会のガイドライン等、最新の情報を参考に投与すること。[9.7.1参照]</p> <p>＜参考：日本小児アレルギー学会：小児気管支喘息治療・管理ガイドライン¹⁾＞</p> <p>6～15歳では8～10mg/kg/日(1回4～5mg/kg 1日2回)より開始し、臨床効果と血中濃度を確認しながら調節する。</p> <p>23. 主要文献</p> <p>1) 滝沢琢己他監修：<u>一般社団法人日本小児アレルギー学会編</u>，<u>小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023</u>，協和企画，2023</p>	<p>7. 用法及び用量に関連する注意 〈気管支喘息〉</p> <p>7.2 小児に投与する場合の投与量、投与方法等については、学会のガイドライン等、最新の情報を参考に投与すること。[9.7.1参照]</p> <p>＜参考：日本小児アレルギー学会：小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017¹⁾＞</p> <p>6～15歳では8～10mg/kg/日(1回4～5mg/kg 1日2回)より開始し、臨床効果と血中濃度を確認しながら調節する。</p> <p>23. 主要文献</p> <p>1) 荒川浩一他監修：日本小児アレルギー学会編，<u>小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017</u>，協和企画，2017</p>

2. 改訂理由

自主改訂

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン(一般社団法人日本小児アレルギー学会編)の改訂に基づき、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

テオフィリン徐放錠 50mg「サワイ」



(01)14987080000515

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」



(01)14987080000447

テオフィリン徐放錠 100mg/200mg「サワイ」



(01)14987080001413

