

## オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の飲ませ方

このお薬は、甘みをつけて飲みやすくする工夫をしています。

少量の水に混ぜて飲ませてください。

水に混ぜる方法で飲みにくい場合は、少量の牛乳やアイスクリーム等に混ぜると飲みやすくなる場合があります。**飲ませる直前に混ぜてください。**

### 飲みやすくする工夫

牛乳<sup>※</sup>

プリン

アイスクリーム

### 混ぜると苦く感じることもあるもの

オレンジジュース

スポーツ飲料

※牛乳本来の味と異なるように感じる場合がありますのでご注意ください。

## 水や牛乳等の飲み物に混ぜる場合

飲む直前に、このお薬の1回量を小さな容器に入れ、飲み物を少量加えてよくかき混ぜて飲んでください。


(お薬を飲み残すことのないよう、飲みきれる量の飲み物を加えてください。)



## アイスクリーム等の食品に混ぜる場合

飲む直前に少量の食品を小さな容器に取り、このお薬の1回量を加えてよくかき混ぜて飲んでください。

(お薬を飲み残すことのないよう、食べきれる量の食品に加えてください。)



## ご注意いただきたいこと

- 飲み物や食品に混ぜる場合は、作り置きせず、必ず飲む直前に混ぜてください。
- お薬が口の中に残ると苦みが出ることもあるため、服用後は水等を飲ませてください。
- 他のお薬と一緒に飲ませると苦くなる場合があります。