


治療スケジュール

何週間かお薬を続けて飲む「服用期間」の後に、お薬を飲まない「休薬期間」があります。治療は、「服用期間」と「休薬期間」を何度か繰り返します。

● 一般的な治療スケジュール



※治療スケジュールは、体の状態や副作用により変更されることがあります。

エスエーワンの服用方法

担当医師の指示に従って、決められた量を1日2回、朝夕の食後30分をめやすに飲んでください。

- 空腹時の服用は避けてください。
- 自分の判断で飲む量や服用期間を変えないようにしてください。



飲み忘れた場合

次の回から決められたとおりの服用を始めてください。飲み忘れたお薬を、次の回に絶対に一緒に飲まないようにしてください。

2回分を一度に飲むと副作用が強くあらわれるおそれがあります。



定期的な受診

お薬の効果を確認し、副作用を早期に見つけるために、担当医師の指示にしたがって定期的に診察・検査を受けてください。

間違えて多く飲んでしまった場合

すぐに担当医師か薬剤師に連絡してください。



! 次のような症状に気付いた場合も、いったん飲むのをやめて、すぐに担当医師・薬剤師に相談してください。

神経 しびれ、しゃべりにくい、ふらつき、物忘れ

嗅覚 においがわかりにくい

呼吸器 息苦しい、息切れ

心臓 胸が痛む、^{どうき}動悸、脈拍が不規則になる

腎臓 尿量が減る、顔や手足などがむくむ

皮膚 やけどの様な水ぶくれ、口や目の粘膜のただれ

筋肉 手足に力がはらない、筋肉が痛い、尿が赤褐色になる

医療機関名

エスエーワンを服用される方へ

大切な注意です。薬を服用する前に必ずお読みください。

あなたが飲むお薬

エスエーワン® 配合カプセルT20



カプセル剤 (白/白)

エスエーワン® 配合顆粒T20




顆粒剤

エスエーワン® 配合カプセルT25



カプセル剤 (だいたい/白)

エスエーワン® 配合顆粒T25



顆粒剤

- エスエーワンはジェネリック医薬品です。担当医師、薬剤師の指示を守ってお飲みください。

大切な注意事項

エスエーワンと絶対に一緒に使用してはいけないお薬や、飲み合わせに注意が必要なお薬があります。

! 一緒に使用してはいけない飲み薬・注射薬

フッ化ピリミジン系のお薬

※使用していた場合は、少なくとも7日間以上の間をあけます。

飲み合わせに注意が必要なお薬

- フェニトイン (てんかんの薬)
- ワルファリンカリウム (血液を固まりにくくする薬)
- トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 (抗がん剤)

安全に治療を行うために

- 薬局で買ったお薬も含めて、今飲んでお薬や以前に飲んでいて手元に残っているお薬がある場合は、必ず担当医師や薬剤師に申し出てください。自分で判断して使用してはいけません。
- 他の診療科や病院を受診するときは、担当医師に受診することを伝えてください。
- 他の診療科や病院の医師、薬剤師にはエスエーワンを服用していることを必ず知らせてください。

注意する症状

副作用(症状)はエスエーワンを飲みはじめてからおおよそ1~3週間までに現れることが多いようです。

次のような症状があらわれたら、担当医師や薬剤師に連絡してください。

特に1日4回以上の下痢や、飲み始めて数日以内に口内炎と同時に下痢が現れた場合は服用をやめてすぐに担当医師に連絡してください。

▶ のどが痛い



▶ 咳が出る



▶ 涙が出る
目が痛い



▶ 下痢
お腹が痛い



▶ 口内炎ができる



▶ 全身に発赤や
発疹が出る



▶ 熱が出る



▶ 皮膚や眼が
黄色くなる



▶ あざができる
(内出血)



▶ 鼻や歯ぐきから
出血する



▶ 血尿が出る
血便が出る



▶ 倦怠感
(だるさ)



▶ 吐き気や、食欲が
ないために
食事がとれない



これら以外にも、気になる症状があらわれた場合には、担当医師や薬剤師に連絡してください。

お薬の保管

直射日光の当たるところや高温多湿になるところは避けて、室温で保管してください。他の人が間違えて飲むことのないよう、特に小さいお子さんの手の届かないところに保管してください。