

# アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 を飲まれる患者さんへ

- このお薬は、不整脈の治療薬です。
- 今までに服用したお薬で十分な効果がなかった場合に、処方されることがあります。
- これまでに、特有な副作用が報告されていますので、これを防ぐために、主治医の指示に従って定期的に診察・検査を受けてください。

## →副作用については裏面をご覧ください

- 飲み始めてから効果が現れるまでに1～2週間かかることがあります。  
また、症状が改善したからといって自己判断でお薬を減らしたり飲むのをやめたりせず、主治医の指示に従いましょう。
- このお薬には、一緒に飲んではいけない薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要な薬があります。  
他のお薬を飲んでいる、あるいは今後他のお薬を飲む場合には、必ず主治医や薬剤師に相談してください。

## 一緒に飲んではいけないお薬

リトナビル、ニルマトレルビル・リトナビル、ネルフィナビルメシル酸塩、モキシフロキサシン塩酸塩、ラスクフロキサシン塩酸塩（注射剤）、バルデナフィル塩酸塩水和物、シルデナフィルクエン酸塩（勃起不全治療薬）、トレミフェンクエン酸塩、フィンゴリモド塩酸塩、シポニモドフマル酸、エリグルスタット酒石酸塩

<裏面もご覧ください>

## 副作用を防ぐために

次のような症状に気づいたら、すぐに主治医・薬剤師にお知らせください。



咳がでる



胸苦しさ・息切れがある



発熱、さむけがする



体のだるさや食欲不振がある

これら以外にも、いつもと違う症状があれば  
すぐに主治医・薬剤師にご相談ください。

## 定期的にうける検査 (主治医の指示に従ってください)

- 血液検査、肺機能検査、検尿
- 心電図、胸部レントゲン
- 眼科検査

