




アナストロゾール錠「サワイ」を 飲まれる患者さんへ

！ご注意！ いただきたいこと

 眠気がでたり、意識がぼんやりするといった症状が現れることがあります。自動車の運転や機械の操作をするときは、十分注意してください。

 他の薬と併用する場合は、薬局で買った薬も含めて、その薬について必ず主治医に伝えてください。

 他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、アナストロゾール錠「サワイ」を服用していることをお知らせください。

医療機関名

・このお薬は…

閉経後の女性のエストロゲン合成をおさえ、乳がんの再発や進行を防ぎます。

・服用方法は??

1日1錠を毎日服用します。

お薬はシートから取り出し、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

・服用し忘れた場合は??


気がついたときに、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間がせまっている場合は1回分とばして、次の通常の服用時間に1回分を服用します。

 **2回分を一度に服用してはいけません。**

比較的发生りやすい副作用

関節の痛み・こわばり

飲みはじめて、1年目ごろまでに発現することが多いですが、服用期間を通じて生じることもあります。



ほてり



吐き気



発疹・かゆみ



頭痛・めまい



つらいと感じるときは、無理せずに医師に相談してください。

注意すべき副作用

骨粗鬆症・骨折

エストロゲンの合成が抑えられることで、骨からカルシウムが失われ、骨粗鬆症や骨折が起こることがあります。治療中は定期的に検査して骨の状態を観察します。



骨粗鬆症



骨折

まれに以下のような症状が現れることがあり、副作用の初期症状である可能性があります。このような症状が現れたときは、使用を中止して、すぐに医師の診察を受けてください。

- ❗ 発熱、食欲がない、中央に浮腫を伴った紅斑
[皮膚粘膜眼症候群]
- ❗ くちびる、舌などの腫れ、呼吸困難、かゆみを伴った発疹
[アナフィラキシー様症状、血管浮腫、じん麻疹]
- ❗ からだがだるい、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる
[肝機能障害、黄疸]
- ❗ 発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ❗ 局所の痛みや腫れ、胸の痛み、呼吸困難 [血栓塞栓症]

➤ 気になる症状があらわれたときは、
医師または薬剤師にすぐにご相談ください。