

服用するときの注意

- 眠気や注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあります。

自動車の運転など、危険を伴う機械の操作はおこなわないようにしてください。



- アルコールと一緒に飲むことは避けてください。

アルコールと一緒に服用すると、ふらつきや立ちくらみなどの副作用がおこりやすくなります。

- このお薬を服用中に他のお薬を新たに使用する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

他のお薬と組み合わせることにより、このお薬の作用が強く出たり、副作用が出たりすることがあります。他の診療科や医療機関を受診するときや、薬局などで他のお薬を購入するときは、このお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

アリピプラゾール「サワイ」を 服用される患者さんとそのご家族の方へ

—統合失調症の方へ—

服用する前に

次のような方は、服用する前に医師に相談してください。

- 妊娠または妊娠している可能性がある方、授乳中の方
- 現在服用しているお薬がある方（薬局で買ったお薬を含めて）
- 以前にお薬を服用して発疹やかゆみなどが出たことがある方

飲み方の注意！

- アリピプラゾール「サワイ」を飲み忘れたとき

気がついたとき、すぐに1回分を服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は服用せず、1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。

- あやまって多く服用したとき

医師または薬剤師に相談してください。嗜眠（睡眠^{しみん}を続け、強い刺激を与えなければ目覚めて反応しない状態）、ぼんやりする、血圧が上がる、脈が速くなる、嘔吐などの症状があらわれることがあります。

副作用について

アリピプラゾール「サワイ」を服用する際は以下のような副作用があらわれることがあります。このような症状が認められた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

●高血糖や低血糖があらわれることがあります。

高血糖の症状(激しいのどの渇き、水やジュースをたくさん飲む、尿の量が多い、尿の回数が多いなど)や低血糖の症状(脱力感、倦怠感、冷や汗、手足のふるえ、うとうとする、意識が薄れるなど)があらわれたら、ただちに受診してください。

●衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進するなど、衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。このような症状があらわれたら、医師に相談してください。



●体重が減少する場合があります。

このような場合、糖尿病など他の病気を合併している可能性がありますので、医師または薬剤師に相談してください。

●アリピプラゾール「サワイ」を服用する前に、他の抗精神病薬を服用していた場合、月経が再開する、月経量が増える、貧血、子宮内膜症があらわれることがあります。

このような場合、医師または薬剤師に相談してください。

●これまでに飲んでいた他の成分のお薬からアリピプラゾール「サワイ」に切り替えたとき、好ましくない作用があらわれる場合があります。

▶あらわれやすい症状 不眠、悪心・嘔吐、頭痛など

このような場合、医師または薬剤師に相談してください。

●その他にも以下のような症状があらわれることがあります。

そわそわ感、落ち着かない、足がむずむずする、じっと座っていられない、じっとしておれず動きたくなる、不眠、不安、高熱、手足のふるえ、筋肉のこわばり、小刻みな歩行、めまい、悪心・嘔吐、食欲不振、体重減少、神経過敏(イライラ感、焦燥感、興奮など)、眠気、頭痛、脈が速い、立ちくらみ、便秘、腹痛、下痢、月経異常、しゃっくりなど

気になる症状があらわれた際には、医師または薬剤師にすぐにご相談ください。