

ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 をお飲みになる患者さんへ

このお薬は、前立腺に対する男性ホルモンの働きをおさえる作用があります。

飲み方について

1日1回1錠を、決められた時間に服用してください。

このお薬は、口の中で速やかに溶けます

- 水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、唾液と一緒に飲みこんでください。ただし、寝たままの状態では、水なしでは飲まないようにしてください。
- 普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

? 飲み忘れたときは

気がついたときにできるだけ早く1回分を服用してください。次の服用時間が近い場合は、1回分とはして、次の時間に1回分を服用してください。

2回分を一度に飲まないようにしてください。

? 間違えて多く飲んだときは

すぐに医師または薬剤師にご相談ください。



自分の判断でお薬を飲むのを止めないようにしてください。

注意すべき副作用について

起こりやすい副作用として、「乳房の痛み」「ほてり」「性欲の低下」「勃起障害」などがあります。

このような症状に気づいたら、医師または薬剤師にお知らせください。

まれに以下のような副作用が起きることがあります。症状があらわれたら、すぐに医師の診察を受けてください。

からだのだるい、かゆみ、
吐き気、食欲不振、発熱、
発疹、皮膚や白目が黄色くなる

肝機能障害・黄疸

※定期的に肝機能検査をする必要があります。



のどの痛み、発熱、
歯ぐきや鼻からの出血、
手足の皮下出血(青あざ)

白血球や血小板の減少



頭痛、息苦しい、発熱、から咳

間質性肺炎



急激な胸の痛みや圧迫感、
冷や汗、息切れ

心筋梗塞、心不全

