


イマチニブ錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

大切な注意です。お薬を服用する前に必ずお読みください。

服用に関する注意事項

- 胃への負担を減らし、吐き気などの消化器症状を抑えるため、食後に多めの水で服用してください。
- 十分な効果を維持するためには、必ず毎日続けて服用することが大切です。自分の判断で服用を中止したり、服用量を変更しないでください。
- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースやセント・ジョンズ・ワート（セイヨウオトギリソウ）含有食品を避けてください。
- このお薬には、一緒に飲む際に注意すべきお薬があります。そのため、他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- めまい、眠気、目のかすみなどの症状があらわれることがあるので、自動車の運転などには十分に注意してください。



約 200cc 程度

服用中に次のような症状がみられることがあります。
我慢せずに、医師または薬剤師にご相談ください。



出血



発熱



吐き気・嘔吐、
食欲低下、下痢



むくみ
(目のまわりや足)



皮膚の発赤・
かゆみ



筋肉のけいれん・
筋肉痛

医師の指示に従って、定期的に受診・検査を受けてください。
この他にも気になる症状があらわれたら、医師や薬剤師に
ご相談ください。