

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」を
服用される患者さん・ご家族の方へ

血液障害に 注意しましょう



メトトレキサートカプセル「サワイ」の副作用の1つに
血液障害があります。

以下のような症状に気がいたら、服用を一時中止
して、主治医に相談してください。

血液障害

こんな症状をチェック!

- ひどい口内炎、口の中の痛みやただれ
- 風邪のような症状
(発熱・全身のだるさ・のどの痛みなど)
- 胃腸症状
(はきけ・胃の痛み・食欲不振など)
- 青あざ、歯ぐきからの出血
など



血液障害の症状に注意しましょう

沢井製薬株式会社

主治医に相談しましょう

血液障害がおこると、ひどい口内炎、青あざや歯ぐきからの出血、発熱や全身のだるさといった風邪のような症状があらわれることがあります。

症状が軽い場合は、過剰に心配する必要はありませんが、血液障害の症状があらわれたときには、服用をやめて主治医に相談してください。



スケジュールを守って服用しましょう

服用する量や回数・曜日をまちがえて多く服用すると、血液障害がおこりやすくなるといわれています。また、脱水症状をおこして尿の量や回数が減ったりした場合も注意が必要です。

高齢の患者さんでは、周囲の方も服用状況を確認し、脱水症状や、ひどい口内炎などに注意してあげてください。

