

その他の注意点

- 女性やお子さんは服用しないでください。
また、カプセルから漏れた薬液に触れないでください。
カプセルから漏れた薬液に触れてしまった場合は、すぐに石けんと水で洗い流してください。
- カプセルは、かんだり切ったりせずに服用してください。
カプセルの中の薬液が、口やのどの粘膜を刺激する場合があります。
- AGA (男性型脱毛症) の医療用医薬品 (飲み薬) を服用している方は、医師または薬剤師に必ず伝えてください。

AGA の医療用医薬品 (飲み薬)

- ・フィナステリド
- ・デュタステリド (ザガーロカプセル 0.1mg/0.5mg)

- このお薬を服用中は、献血をしないでください。
このお薬を服用中、および最後に服用した日から6ヵ月間は、献血をしないでください。
- 医師の指示通りに、きちんと服用を続けましょう。
前立腺肥大症は進行する病気です。
医師の指示に従い、じっくり治療に取り組みましょう。

デュタステリド カプセル 0.5mgAV「サワイ」を服用される患者さんへ


肥大した前立腺を小さくして、排尿障害を改善するお薬です

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」を服用すると、

- ① 肥大した前立腺が小さくなり、
 - ✓ 尿が出にくい、尿の勢いが弱い
 - ✓ 排尿後も尿が残っている感じがする
 - ✓ 尿がためられない、トイレの間隔が近いといった症状が改善します。
- ② 尿閉 (尿が出なくなる) を起こす可能性が少なくなります。
- ③ 手術療法が必要になる可能性が少なくなります。

? 前立腺肥大症とは

肥大した前立腺が尿道を圧迫し、排尿障害を引き起こします。
前立腺肥大症が悪化すると、尿閉を起こしたり、手術療法が必要になる場合があります。



服用中の注意点

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」は、服用開始6ヵ月後よりPSA* 値を約50%減少させます。

*PSA：前立腺特異抗原。血液検査で測定する、前立腺がんの腫瘍マーカー。

このお薬は、血液中のPSAの量を減らす作用があります**が、その影響を考慮すれば、お薬を服用中であっても、PSA検査を通常通り行うことができます。

**このお薬は、前立腺がんの治療薬ではありません。

PSA検査を行う際は、

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」を服用中であることを、必ず担当医師に伝えてください

PSA検査を行う際は、『デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」服用カード』を担当医師に提示してください。

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」		服用カード	
患者さんへ		本カードは必ず常に携帯してください	
医療機関を受診する際、または健康診断などでPSA検査を行う際は、必ず本カードを提示してください。			
お薬の服用を開始した日	年	月	日
お薬の服用を開始する前のPSA値	ng/mL		
お名前			

服用カード（縮小イメージ）

副作用について

このお薬の副作用として、次のような症状があらわれることがあります。

- ・勃起不全、性欲減退
- ・乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）など

まれに、次のような副作用があらわれることがあります。異常が認められた場合は、すぐに医師へ連絡してください。

- ・肝機能障害、黄疸（ASTやALTの上昇、体がだるい、白目が黄色くなるなど）

**その他にも気になる症状があらわれた場合は
医師または薬剤師に相談してください。**

保管時の注意点

- お薬を保管する際は、温度と湿度に注意してください。
高温・多湿のもとで保管した場合、カプセルが軟らかくなり、くっついたりベタついたりする可能性があります。
- PTPシートの小さな傷や穴あきに注意してください。
小さな傷や穴からPTPシート内に湿気が入ると、カプセルが軟らかくなって変形したり、ベタついたりする原因となります。

❗ 包装（PTPシート）から取り出して保管しないでください

❗ 次のような場所で保管しないでください

- ・暖房器具の周辺
- ・高温になりやすい場所（車の中など）
- ・直射日光が当たりやすい場所（窓際など）
- ・湿気が多い場所（洗面所など）

など