

エルデカルシトールカプセル「サワイ」を 服用される患者さんへ

— 医師または薬剤師のみなさまへ —

エルデカルシトールカプセル 0.5 μ g/0.75 μ g 「サワイ」
を服用される患者さまに、本指導箋をもちいて、服用中の
注意についてご説明ください。

**エルデカルシトールカプセル「サワイ」を
服用される患者さんへ**

このお薬は、活性型ビタミンD₃製剤の
骨粗しょう症治療薬です。

●服用するときの注意点

1日1回1カプセルを服用してください。

- ・包装（PTP）シートからお薬を取り出し、水またはぬるま湯で服用して
ください。
- ・飲み忘れた場合は、飲み忘れた分とはとして、次回からはいつもの飲
み方で飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・あやまって多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。

●妊娠している方、授乳中の方は、服用しないでください。
●服用中に妊娠したと考えられる場合は、すぐに主治医にご相談
ください。
●妊娠する可能性のある方は、主治医にご相談ください。服用前
に妊娠検査を受け、服用期間中と最終服用後2週間は必ず避
妊してください。

・以前にお薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たこ
とがある方は、服用する前に主治医または薬剤師にご相談ください。
このお薬は、継続して服用することで効果が得られますので
必ず主治医の指示どおりに飲み続けるようにしてください。

他の人がまちがえて飲むことのないように注意しましょう。
特に小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。

ウラ画もお読みください▶

この指導箋は、電子添文のすべての内容について記載してい
るものではありません。

服薬指導にあたっては、最新の電子添文をご確認ください。

高カルシウム血症、妊婦・授乳婦に関するご注意

» 併用時にご注意いただきたい薬剤

次の薬剤を併用される場合は、**高カルシウム血症**があらわれるおそれがあるため、特にご注意ください。

- ・カルシウム製剤（乳酸カルシウム、炭酸カルシウム等）
- ・ビタミンD および その誘導体（アルファカルシドール、カルシトリオール等）
- ・PTH製剤（テリパラチド等） ・PTHrP製剤（アパロパラチド酢酸塩）
- ・マグネシウムを含有する製剤（酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム等）

カルシウム、**ビタミンD**および**マグネシウム**については、これらの成分を含む**サプリメント**の併用に関してもご注意ください。サプリメントを服用される場合は、医師または薬剤師に相談するようご指導ください。

» 定期的な血液検査

エルデカルシトール投与中は、血清カルシウム値を**定期的（3～6カ月に1回程度）**に測定するために、医療機関を受診するようご指導ください。

» 高カルシウム血症の症状について

エルデカルシトール服用後、高カルシウム血症に関連する下記のような症状があらわれた場合は、血清カルシウム値を測定するために、医療機関を受診するようご指導ください。

倦怠感、いらいら感、嘔気、口渇感、食欲減退、意識レベルの低下 等

» 高カルシウム血症のおそれのある患者

次の方は高カルシウム血症を発現しやすいため、投与初期に頻回に血清カルシウム値を測定するために、医療機関を受診するようご指導ください。

腎機能障害のある患者、悪性腫瘍のある患者、原発性副甲状腺機能亢進症の患者 等

» 妊婦、授乳婦への処方について

エルデカルシトールは、動物での試験（ラット、ウサギ）において、胎児の骨格異常、出生児の腎臓の変化および外形異常、乳汁中への移行などが報告されています。より安全にご使用いただくために、女性の患者さんに必ずご確認、ご指導ください。

- ・妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の方は**禁忌**です。
- ・妊娠する可能性のある女性へは、本剤服用中と最終服用後2週間は避妊の必要があること、適切な避妊方法について、ご説明ください。

エルデカルシトールカプセル「サワイ」を 服用される患者さんへ

このお薬は、活性型ビタミンD₃製剤の
骨粗しょう症治療薬です。

●服用するときの注意点

1日1回1カプセルを服用してください。

- ・包装(PTP)シートからお薬を取り出し、水またはぬるま湯で服用してください。
- ・飲み忘れた場合は、飲み忘れた分はとばして、次回からはいつもの飲み方で飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- ・あやまって多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。

- 妊娠している方、授乳中の方は、服用しないでください。
- 服用中に妊娠したと考えられる場合は、すぐに主治医にご相談ください。
- 妊娠する可能性のある方は、主治医にご相談ください。服用前に妊娠検査を受け、服用期間中と最終服用後2週間は必ず避妊してください。

- ・以前にお薬を使用して、かゆみ、ほっしん発疹などのアレルギー症状が出たことがある方は、服用する前に主治医または薬剤師にご相談ください。

このお薬は、継続して服用することで効果が得られますので必ず主治医の指示どおりに飲み続けるようにしてください。

他の人がまちがえて飲むことのないように注意しましょう。
特に小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。



◎服用中に注意していただきたいこと

このお薬の主な副作用として、**血液中のカルシウム増加**や**尿中のカルシウム増加**があります。

次の方は、特に注意する必要がありますので、服用する前に主治医または薬剤師にお知らせください。

- ・腎機能障害と診断された方
- ・悪性腫瘍と診断された方
- ・原発性副甲状腺機能亢進症と診断された方



高カルシウム血症になる
おそれがあります

- ・尿路結石と診断された方
- ・尿路結石になったことがある方



高カルシウム尿症により、
尿路結石が悪化する
おそれがあります

- ・このお薬と一緒に**カルシウム**や**ビタミンD**、**マグネシウム**を含む**サプリメント**を服用すると、これらの副作用があらわれやすくなることがあります。サプリメントを服用する場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- ・血液検査や尿検査などを行うことがありますので、**定期的に受診**するようにしましょう。
- ・服用後に**次のような症状**があらわれた場合には、主治医にご相談ください。

体がだるい、いらいらする、吐き気がする、
口が渇く、食欲が低下する、意識がぼーっとする

sawai



(01)14987080196119

専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることで、
電子添文を閲覧できます。