


イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」の 治療を受ける患者さんへ

このお薬は、「骨粗しょう症」の治療薬です

骨は、古い骨をこわす破骨細胞はこつさいぼうと新しい骨をつくる骨芽細胞こつがさいぼうによって毎日つくりかえられています。

このお薬は、ビスホスホネート系薬剤のひとつで、骨をこわす破骨細胞のはたらきを抑えることで、骨量(骨に含まれるカルシウムなどの量)を増やし、骨を折れにくくします。



月 1 回の通院が必要です

このお薬は月 1 回、医師や看護師による静脈注射が必要です。
骨粗しょう症の治療は、**継続することが大切です。**
月に 1 回受診し、きちんと治療を続けましょう。

次の方はこのお薬による治療を受けることができません。

過去にこのお薬の成分または他のビスホスホネート系薬剤で過敏症を経験したことがある方

妊婦、または妊娠している可能性のある方
※授乳中の方は主治医に相談してください。

低カルシウム血症の方

治療中は次のことに注意してください

● 急性期反応(インフルエンザ様症状)

主に初めて注射した日から3日以内にあらわれ、7日以内に回復する一過性の症状です。背中・筋肉・関節・骨などの痛み、頭痛、体のだるさなどがあらわれることがあります。このような症状を感じた場合、すぐに主治医、薬剤師または看護師に連絡してください。

● 歯やあごの症状

あごの痛み、歯のゆるみ、歯ぐきのはれなどの症状があらわれた場合、すぐに主治医、薬剤師または看護師に伝え、歯科医師に連絡してください。

このほかにも気になる症状があらわれたら、
主治医、薬剤師または看護師に相談してください。



歯科受診の際のお願い

- ・抜歯などの歯科治療を受ける場合には、事前に主治医、薬剤師または看護師に相談してください。
- ・歯科医師に、イバンドロン酸による治療を受けていることを必ず伝えてください。

次回の
注射日は

月

日です。