

<b>アリピプラゾール内用液</b> <b>3mg分包/6mg分包/12mg分包「サワイ」</b>
--

効能・効果が先発品と一部異なります

<b>先発品と同一の効能・効果</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・統合失調症</li><li>・双極性障害における躁症状の改善</li><li>・うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)</li></ul>

<b>先発品のみが有する効能・効果</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性</li></ul>

用法・用量が先発品と一部異なります

<b>先発品と同一の用法・用量</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</li><li>・双極性障害における躁症状の改善 通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</li><li>・うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) 通常、成人にはアリピプラゾールとして3mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。</li></ul>

<b>先発品のみが有する用法・用量</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>・小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 通常、アリピプラゾールとして1日1mg(1mL)を開始用量、1日1～15mg(1～15mL)を維持用量とし、1日1回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として最大3mg(3mL)とし、1日量は15mg(15mL)を超えないこと。</li></ul>