

先発品と効能が異なる製品一覧(2019年3月)

沢井製薬株式会社

サワイ製品名	先発品名	先発品のみの効能・効果、用法・用量
アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg/ 内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」	エビリファイ錠3mg/6mg/12mg /内用液0.1%	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
イマチニブ錠100mg/200mg「サワイ」	グリベック錠100mg (錠200mgは先発品に規格なし)	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFR α 陽性の疾患(好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病)
エダラボン点滴静注液30mg/点滴静注液 30mgバッグ「サワイ」	ラジカット注30mg/点滴静注バッグ 30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
ジエノゲスト錠1mg「サワイ」	ディナゲスト錠1mg	子宮腺筋症に伴う疼痛の改善
ドネペジル塩酸塩細粒0.5%/錠3mg/5mg/10mg /OD錠3mg/5mg/10mg「サワイ」	アリセプト細粒0.5%/錠3mg/5mg/10mg /D錠3mg/5mg/10mg	レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	レミッチOD錠2.5 μ g/カプセル2.5 μ g	次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) ①腹膜透析患者、②慢性肝疾患患者
ピタバスタチンCa錠1mg/2mg /・OD錠1mg/2mg「サワイ」	リバロ錠1mg/2mg/OD錠1mg/2mg	小児(10歳以上): 家族性高コレステロール血症
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	ファムビル錠250mg	<再発性の単純疱疹の用法>成人1回1000mgを2回
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg「サワイ」	デプロメール錠25/50/75 ルボックス錠25/50/75	小児(8歳以上): 強迫性障害
ペポタスチンベシル酸塩錠5mg/10mg /OD錠5mg/10mg「サワイ」	タリオン錠5mg/10mg/OD錠5mg/10mg	小児(7歳以上): アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
ポセンタン錠62.5mg「サワイ」	トラクリア錠62.5mg	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「サワイ」	ガスモチン錠2.5mg/5mg	経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助
ラモトリギン錠25mg/100mg /錠小児用2mg/5mg「サワイ」	ラミクタール錠25mg/100mg /錠小児用2mg/5mg	てんかん患者の定型欠神発作に対する単剤療法
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	パリエット錠10mg	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
リスペリドン細粒1%/錠1mg/2mg /OD錠0.5mg/1mg/2mg「サワイ」	リスパダール細粒1%/錠1mg/2mg /OD錠0.5mg/1mg/2mg	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
リネゾリド錠600mg/注射液600mg「サワイ」	ザイボックス錠600mg/注射液600mg	<適応菌種>本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎

(2019年3月6日時点)

【最近、適応・用法等の追加について一変承認された品目(2018年4月以降)】

- ・アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg／内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」「うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)」追加(2019/3/6承認) [まだ不一致]
- ・アルガトロバン注射液10mg「サワイ」「ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓症の発症抑制」追加(2019/1/9承認) [同一]
- ・リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」「骨ページェット病」追加(2018/12/5承認) [同一]
- ・ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」「心エコー図検査における負荷」追加(2018/12/5承認) [同一]
- ・レボホリナート点滴静注用25mg/100mg「サワイ」「レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法 小腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強」追加(2018/11/21承認) [同一]
- ・アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg／内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」「双極性障害における躁症状の改善」追加(2018/9/5承認) [まだ不一致]
- ・アリピプラゾール錠24mg「サワイ」「双極性障害における躁症状の改善」追加(2018/9/5承認) [同一]
- ・オランザピン錠2.5mg/5mg/10mg／細粒1%「サワイ」「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)」追加(2018/4/4承認) [同一]
- ・メロペネム点滴静注用0.25g/0.5g「サワイ」「<化膿性髄膜炎における用法>成人1日6g分3、小児1日120mg/kg分3(1日6gを超えない)」追加(2018/4/4承認) [同一]