

先発品と効能・効果、用法・用量が異なる製品(2021年4月)

沢井製薬株式会社

弊社製品において、先発品と効能・効果、用法・用量が一部異なる品目は以下の通りです。

サワイ製品名	先発品名	先発品のみの効能・効果、用法・用量
アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg ／内用液3mg/6mg/12mg分包「サワイ」	エビリファイ錠3mg/6mg/12mg ／内用液0.1%	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
イマチニブ錠100mg/200mg「サワイ」	グリベック錠100mg (錠200mgは先発品に規格なし)	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFR α 陽性の疾患(好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病)
エゼチミブ錠10mg「サワイ」	ゼチーア錠10mg	ホモ接合体性シトステロール血症
エダラボン点滴静注液30mg／点滴静注液 30mgバッグ「サワイ」	ラジカット注30mg／点滴静注バッグ 30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	ファムビル錠250mg	<再発性の単純疱疹の用法・用量>成人1回1000mgを2回
ファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」	ガスター注射液10mg/20mg	<用法・用量> 静脈内投与する際の日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液での希釈、筋肉内投与
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg「サワイ」	デプロメール錠25/50/75 ルボックス錠25/50/75	小児(8歳以上):強迫性障害
プロナンセリン錠2mg/4mg/8mg／散2%「サ ワイ」／散2%「アメル」	ロナセン錠2mg/4mg/8mg／散2%	<用法・用量> 小児には1回2mg、1日2回食後経口投与より開始し、徐々に増量。維持量として1日8~16mgを2回 に分けて食後経口投与。適宜増減(1日量は16mgを超えない)
ポセentan錠62.5mg「サワイ」	トラクリア錠62.5mg	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍 の既往歴のある場合に限る)

ご使用の際は各製品の添付文書をご確認ください。

(2021年4月14日時点)

【最近、効能・用法等について一変承認された品目(2020年4月以降)】

- ・カペシタビン錠300mg「サワイ」「＜用法・用量＞手術不能又は再発乳癌におけるラパチニブトシル酸塩水和物と併用する場合のC法、結腸・直腸癌における補助化学療法でのオキサリプラチンと併用する場合のC法、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌における他の抗悪性腫瘍剤との併用でのE法」追加(2021/4/14承認) [同一]
- ・ジェノゲスト錠1mg「サワイ」「子宮腺筋症に伴う疼痛の改善」追加(2021/3/24承認) [同一]
- ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」「次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 透析患者、慢性肝疾患患者」(2021/1/6承認) [同一]
- ・ミカファンギンNa点滴静注用50mg/75mg「サワイ」「造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防」追加(2020/9/30承認) [同一]
- ・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「サワイ」「経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助」追加(2020/9/30承認) [同一]
- ・リスペリドン細粒1%/錠1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・リスペリドンOD錠0.5mg/1mg/2mg「サワイ」「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」追加(2020/8/26承認) [同一]
- ・ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」追加(2020/6/24承認) [同一]