

# 先発品と効能又は効果、用法及び用量が異なる製品(2024年6月)

沢井製薬株式会社

弊社製品において、先発品と効能又は効果、用法及び用量が一部異なる品目は以下の通りです。

なお本資料は、先発品と異なる内容のみを示した簡略版です。

サワイ製品名	先発品名	先発品のみの効能又は効果、用法及び用量
アジルサルタン錠 10mg/20mg/40mg／OD錠 10mg/20mg/40mg「サワイ」	アジルバ錠10mg/20mg/40mg	【用法及び用量】 小児(6歳以上)における高血圧症
アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」	ヴォリブリス錠2.5mg	【用法及び用量】 小児(8歳以上)における肺動脈性肺高血圧症
エソメプラゾールカプセル10mg/20mg「サワイ」	ネキシウムカプセル10mg/20mg	【用法及び用量】 <カプセル10mg> 小児における逆流性食道炎の維持療法、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 <カプセル20mg> 小児における逆流性食道炎の維持療法
カルボプラチニ点滴静注液50mg/150mg/450mg 「SW」	パラプラチン注射液50mg/150mg/450mg	子宮体癌
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	キュビシン静注用350mg	【用法及び用量】 小児(1歳以上18歳未満)における敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染
トルバズタンOD錠7.5mg/15mg／顆粒1% 「サワイ」	サムスカOD錠7.5mg/15mg／顆粒1%	○抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
ファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」	ガスター注射液10mg/20mg	【用法及び用量】 静脈内投与する際の日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液での希釀 又は筋肉内投与
フェブキソstatt錠10mg/20mg/40mg／ OD錠10mg/20mg「サワイ」	フェブリク錠10mg/20mg/40mg	【用法及び用量】 小児における痛風、高尿酸血症
プロナンセリン錠2mg/4mg/8mg／散2% 「サワイ」	ロナセン錠2mg/4mg/8mg／散2%	【用法及び用量】 小児における統合失調症
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	トラクリア錠62.5mg	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)
ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	ベルケイド注射用3mg	○マントル細胞リンパ腫 ○全身性ALアミロイドーシス
レナリドミドカプセル2.5mg/5mg「サワイ」	レブラミドカプセル2.5mg/5mg	○再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ○再発又は難治性の滤胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫
レベチラセタムDS50%「サワイ」	イーケプラドライシロップ50%	【用法及び用量】 小児(生後1ヵ月以上4歳未満)における部分発作(二次性全般化発作を含む)

ご使用の際は各製品の電子添文をご確認ください。

(2024年6月24日時点)

## 【最近、効能・用法等について一変承認された品目(2023年4月以降)】

- ・エスエーワン配合カプセルT20/T25／配合顆粒T20/T25／配合OD錠T20/T25「胃癌におけるB法又はC法、結腸・直腸癌におけるC法又はD法、非小細胞肺癌におけるB法又はC法、膀胱癌におけるC法、胆道癌におけるE法又はF法の使用」の用法及び用量追加(2024/2/14承認) [同一]
- ・ダサチニブ錠20mg/50mg「サワイ」「慢性骨髄性白血病」追加(2023/10/4承認) [同一]
- ・レボホリナート点滴静注用25mg/100mg「サワイ」「治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強」追加(2023/9/6承認) [同一]
- ・オキサリプラチン点滴静注液50mg/100mg/200mg「サワイ」「結腸癌における術後補助療法」追加、「胃癌におけるA法の使用」の用法及び用量追加(2023/8/30承認) [同一]
- ・ファムシクロビル錠250mg「サワイ」「再発性の単純疱疹」の用法及び用量の追加(2023/8/30承認) [同一]
- ・エスエーワン配合カプセルT20/T25／配合顆粒T20/T25／配合OD錠T20/T25「ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法」追加(2023/6/7承認)
- ・ドネペジル塩酸塩錠3mg/5mg/10mg／OD錠3mg/5mg/10mg／細粒0.5%「サワイ」「レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制」の用法及び用量追加(2023/4/26承認) [同一]

## 【問い合わせ先】

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター  
フリーダイヤル 0120-381-999

沢井製薬株式会社  
大阪市淀川区宮原5丁目2-30