

先発品と効能又は効果、用法及び用量が異なる製品(2026年6月)

沢井製薬株式会社

弊社製品において、先発品と効能又は効果、用法及び用量が一部異なる品目は以下の通りです。

なお本資料は、先発品と異なる内容のみを示した簡略版です。

| サワイ製品名 | 先発品名 | 先発品のみの効能又は効果、用法及び用量 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アンプリセンタン錠2.5mg「サワイ」 | ヴェオリプリス錠2.5mg | 【用法及び用量】 小児(8歳以上)における肺動脈性肺高血圧症 |
| エソメプラゾールカプセル10mg/20mg「サワイ」 | ネキシウムカプセル10mg/20mg | 【用法及び用量】 <カプセル10mg> 小児における逆流性食道炎の維持療法、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 <カプセル20mg> 小児における逆流性食道炎の維持療法 |
| エルトロンボパグ錠12.5mg/25mg「サワイ」 | レボレード錠12.5mg/25mg | ○再生不良性貧血 |
| カルボプラチン点滴静注液50mg/150mg/450mg「SW」 | パラプラチン注射液50mg/150mg/450mg | 【用法及び用量】 乳癌に対するペムブロリズマブ(遺伝子組換え)及びゲムシタビン塩酸塩との併用 乳癌に対するペムブロリズマブ(遺伝子組換え)及びパクリタキセルとの併用 |
| ダバグリフロジン錠5mg/10mg「サワイ」 | フォシーガ錠5mg/10mg | ○1型糖尿病 ○慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 ○慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。 |
| ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | キュピシン静注用350mg | 【用法及び用量】 小児(1歳以上18歳未満)における敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染 |
| トルバプタンOD錠7.5mg/15mg／顆粒1%「サワイ」 | サムスカOD錠7.5mg/15mg／顆粒1% | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 |
| ニロチニブカプセル150mg/200mg「サワイ」 | タシグナカプセル150mg/200mg | 【用法及び用量】 小児における慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病 |
| ファモチジン静注液10mg/20mg「サワイ」 | ガスター注射液10mg/20mg | 【用法及び用量】 静脈内投与する際の日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液での希釈 又は筋肉内投与 |
| フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg/8mg「サワイ」 | トビエース錠4mg/8mg | ○神経因性膀胱における排尿管理 |

ご使用の際は各製品の電子添文をご確認ください。

(2026年6月12日時点)

| サワイ製品名 | 先発品名 | 先発品のみの効能又は効果、用法及び用量 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| フェブキソスタット錠10mg/20mg/40mg／OD錠10mg/20mg「サワイ」 | フェブリク錠10mg/20mg/40mg | 【用法及び用量】 小児における痛風、高尿酸血症 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」 | ベルケイド注射用3mg | 全身性ALアミロイドーシス |
| リバーロキサバン錠10mg/15mg／OD錠10mg/15mg「サワイ」 | イグザレルト錠10mg/15mg／OD錠10mg/15mg | 小児 ○Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制 |
| レナリドミドカプセル2.5mg/5mg「サワイ」 | レブラミドカプセル2.5mg/5mg | ○再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ○再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | イーケブラドライシロップ50% | 【用法及び用量】 小児(生後1ヵ月以上4歳未満)における部分発作(二次性全般化発作を含む) |

ご使用の際は各製品の電子添文をご確認ください。

(2026年6月12日時点)

【最近、効能・用法等について承認事項一部変更承認された品目(2025年1月以降)】

- ・トルバプタンOD錠7.5mg/15mg／顆粒1%「サワイ」「腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制」追加(2026/4/20承認)
- ・アジルサルタン錠10mg/20mg/40mg／OD錠10mg/20mg/40mg「サワイ」「高血圧症」の小児における用法及び用量追加(2026/3/25承認) [同一]
- ・ボセンタン錠62.5mg「サワイ」「全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に限る)」追加(2026/3/25承認) [同一]
- ・レナリドミドカプセル2.5mg/5mg「サワイ」「多発性骨髄腫における他の抗悪性腫瘍剤との併用時のA法またはB法の使用」の用法及び用量追加(2026/2/10承認)
- ・ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」「マントル細胞リンパ腫」追加(2025/12/17承認)
- ・リバーロキサバン錠10mg/15mg／OD錠10mg/15mg「サワイ」「<成人> 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制」「<小児> 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制」追加(2025/12/17承認)
- ・ラコサミド錠50mg/100mg／DS10%「サワイ」「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」追加(2025/12/3承認) [同一]
- ・ブロナンセリン錠2mg/4mg/8mg／散2%「サワイ」「統合失調症」の小児における用法及び用量追加(2025/7/23承認) [同一]
- ・ペメトレキセド点滴静注液100mg/500mg/800mg／点滴静注用100mg/500mg/800mg「サワイ」「扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法」の用法及び用量追加(2025/1/22承認) [同一]

【問い合わせ先】

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
フリーダイヤル 0120-381-999

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30