


## 製剤残渣が排泄される可能性のある弊社製品について










下記の弊社製品におきまして、服用された患者さんの糞便中に、製剤残渣が見られる場合がございます。  
弊社では服用時の注意につきましてお知らせをご用意しておりますので、患者さんへお伝えいたしますようお願い申し上げます。

### 記


#### ●メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」

製剤写真	患者さんへのお知らせ
	<p>お知らせ(メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●このお薬は、湿気を避けて保存し、服用直前にシートから取り出してください。</li> <li>●このお薬は、かまずに服用してください。</li> <li>●このお薬は服用後、糞便中に錠剤の破片(茶色)がみられることがありますが、問題はありません。</li> </ul> <p style="text-align: right;">D01A150601</p> <p style="text-align: right;">※製品箱に封入されています。</p>
<p>製品の電子添文における記載(抜粋)</p> <p>14. 適用上の注意</p> <p>14. 3. 1 便中に錠剤がみられる場合がある。</p>	

#### ●ニフェジピンCR錠10mg/20mg/40mg「サワイ」

製剤写真	患者さんへのお知らせ			
<p>CR錠10mg</p>  <p>CR錠20mg</p>  <p>CR錠40mg</p> 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>&lt;表紙&gt;</p>  </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>&lt;指導箋本体&gt;</p>  </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>&lt;個装箱封入&gt;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ニフェジピンCR錠「サワイ」を服用される方へ</p> <p>このお薬は、体調(下痢等)により、まれに錠剤の形のまま糞便中に排泄されることがあります。このような体調の異変を感じられましたら、医師又は薬剤師にご相談下さい。</p> <p style="text-align: right;">Z01A141201</p> </div> </td> </tr> </table>	<p>&lt;表紙&gt;</p> 	<p>&lt;指導箋本体&gt;</p> 	<p>&lt;個装箱封入&gt;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ニフェジピンCR錠「サワイ」を服用される方へ</p> <p>このお薬は、体調(下痢等)により、まれに錠剤の形のまま糞便中に排泄されることがあります。このような体調の異変を感じられましたら、医師又は薬剤師にご相談下さい。</p> <p style="text-align: right;">Z01A141201</p> </div>
<p>&lt;表紙&gt;</p> 	<p>&lt;指導箋本体&gt;</p> 	<p>&lt;個装箱封入&gt;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ニフェジピンCR錠「サワイ」を服用される方へ</p> <p>このお薬は、体調(下痢等)により、まれに錠剤の形のまま糞便中に排泄されることがあります。このような体調の異変を感じられましたら、医師又は薬剤師にご相談下さい。</p> <p style="text-align: right;">Z01A141201</p> </div>		
<p>製品の電子添文における記載(抜粋)</p> <p>14. 適用上の注意</p> <p>14. 1. 3 内核のフィルムコーティング剤のエチルセルロースは水に不溶のため、糞便中にまれに錠剤の形状を残したまま排出されることがある。</p>				

●ジソピラミド徐放錠150mg「SW」



製剤写真	患者さんへのお知らせ
	<p style="text-align: center;"><b>患者さんへのお知らせ</b></p> <p>この薬(ジソピラミド徐放錠150mg「SW」)は、服用後、錠剤が便の中に外見上そのままの形で出てくる場合がありますが、薬の成分は体内に吸収されており、薬の効き目に問題はございません。</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">2023年6月作成 C3E1 T.F.</p>

製品の電子添文における記載(抜粋)

14. 適用上の注意

14. 2. 2 本剤のマトリックス基剤は成分放出後も体内で崩壊せずに排泄されるため、錠剤の形をした白い塊として糞便中に認められることがある。

●プロフェキ配合錠「サワイ」




製剤写真	患者さんへのお知らせ
	

製品の電子添文における記載(抜粋)

14. 適用上の注意

14. 1. 1 患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。  
・糞便中に、有効成分放出後の殻錠が排泄されることがある。

●ロピニロール徐放錠2mg/8mg「サワイ」

製剤写真	患者さんへのお知らせ
<p>徐放錠2mg</p>  <p>徐放錠8mg</p> 	

製品の電子添文における記載(抜粋)

8. 重要な基本的注意

8. 5 本剤は24時間かけて有効成分を放出し、溶解するよう設計されているので、腸切除の既往、人工肛門造設術、下痢等の影響で、本剤の消化管内滞留時間が短くなったと考えられる場合、又は糞便中に本剤の残留物が確認された場合には、本剤の効果が十分に得られないおそれがある。

製品箱に封入されていない指導箋は、弊社『医療関係者向け総合情報サイト』よりご請求いただけます



以上