

# 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」


通知等	「医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料の取扱等について」：昭和55年5月30日 薬審第718号
採血時点	0、0.5、1、2、3、4、6、8、12、24hr
休薬期間	14日間
測定方法	ガスクロマトグラフィー
試験製剤	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
標準製剤	フランドル錠20mg

硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」とフランドル錠20mgを健康成人男子にそれぞれ1錠（硝酸イソソルビドとして20mg）空腹時単回経口投与（クロスオーバー法）し、血漿中硝酸イソソルビド濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ（AUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-24hr</sub> (ng・hr/mL)
硝酸イソソルビド 徐放錠20mg「サワイ」	4.4 ± 1.7	3.9 ± 2.8	3.5 ± 1.4	25.6 ± 3.9
フランドル錠20mg	4.6 ± 1.3	3.3 ± 2.8	4.4 ± 2.7	26.6 ± 5.4

(Mean ± S.D.)



血漿中濃度ならびにAUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。