

ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」


通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」： 平成18年11月24日 薬食審査発第1124004号
採血時点	0、1、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、8、10hr
休薬期間	3日間
測定方法	LC/MS法
試験製剤	ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」
標準製剤	パリエット錠20mg

ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」とパリエット錠20mgを健康成人男子にそれぞれ1錠（ラベプラゾールナトリウムとして20mg）空腹時単回経口投与（クロスオーバー法）し、血漿中ラベプラゾール濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ（AUC_t、C_{max}）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-10hr} (ng・hr/mL)
ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」	618±233	4.0±1.0	1.0±0.2	1255±759
パリエット錠20mg	628±290	3.7±0.9	1.0±0.3	1193±667

(Mean ± S.D.)



	対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC _{0-10hr}	log(1.04)	log(0.97)～log(1.12)
C _{max}	log(1.03)	log(0.89)～log(1.19)

血漿中濃度ならびにAUC_t、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。