2023年９月作成

グリクラジド錠40mg「サワイ」

品質再評価結果通知日	2002年3月6日	オレンジブック収載	No.12
通知等	「医療用医薬品の品質再評価に係る公的溶出試験(案)等について」:平成13年8月10日 医薬審発第1259号		
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、6.0、6.8、水)	
試験回数	6ベッセル		
試験製剤	グリクラジド錠40mg「サワイ」		
標準製剤	グリミクロン錠40mg		
結果及び考察	<50rpm:pH1.2> 標準製剤の平均溶出率が60%(10分)及び85%(30分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。 <50rpm:pH6.0> 標準製剤の平均溶出率が40%(5分)及び85%(30分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。 <50rpm:pH6.8> 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。 <50rpm:水> 標準製剤の平均溶出率が40%(10分)及び85%(240分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。 以上の結果より、両製剤の溶出挙動は同等であると判断した。		

＜50rpm:pH1．2＞



＜50rpm:pH6．0＞



＜50rpm:pH6．8＞



＜50rpm:水＞



(I:判定基準の適合範囲)

沢井製薬(株) 申請資料：グリクラジド錠40mg「サワイ」 溶出試験より作成

沢井製薬株式会社