

NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤

劇薬・処方箋医薬品*

日本標準商品分類番号

87119

メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Tablets, OD Tablets [SAWAI]

メマンチン塩酸塩製剤

貯法：室温保存
 使用期限：外箱に表示
 注意：OD錠は「取扱い上の注意」の項参照

	錠5mg	錠10mg	錠20mg
承認番号	30200AMX00115000	30200AMX00116000	30200AMX00117000
薬価収載	2020年6月	2020年6月	2020年6月
販売開始	2020年6月	2020年6月	2020年6月

	OD錠5mg	OD錠10mg	OD錠20mg
承認番号	30200AMX00118000	30200AMX00119000	30200AMX00120000
薬価収載	2020年6月	2020年6月	2020年6月
販売開始	2020年6月	2020年6月	2020年6月

※注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

・組成

品名	メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」
有効成分 [1錠中]	メマンチン塩酸塩		
	5mg	10mg	20mg
添加剤	カルナウバロウ、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000、D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸Mg		
	三二酸化鉄	—	

品名	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」
有効成分 [1錠中]	メマンチン塩酸塩		
	5mg	10mg	20mg
添加剤	アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、カルメロースCa、クエン酸トリエチル、クロスポビドン、結晶セルロース、ステアリン酸Mg、タルク、トウモロコシデンプン、バニリン、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、ポリソルベート80、D-マンニトール、メタクリル酸コポリマーLD、メタケイ酸アルミン酸Mg、ラウリル硫酸Na、香料		
	三二酸化鉄	—	

・製剤の性状

品名	メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」
外形			
剤形	フィルムコーティング錠	割線入りフィルムコーティング錠	
性状	淡赤色～帯黄淡赤色	白色～帯黄白色	
直径(mm)	6.1	7.1	12.1×6.1
厚さ(mm)	2.7	3.1	4.4
重量(mg)	約81	約122	約244
本体表示	メマンチン 5 サワイ	メマンチン 10 サワイ	メマンチン 20 サワイ

品名	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」
外形			
剤形	素錠 (口腔内崩壊錠)	割線入り素錠 (口腔内崩壊錠)	
性状	淡赤白色	淡黄白色	白色～微黄白色
直径(mm)	6.0	7.5	9.0
厚さ(mm)	3.2	3.6	4.9
重量(mg)	約82	約134	約268
本体表示	メマンチン OD 5 サワイ	メマンチン OD 10 サワイ	メマンチン OD 20 サワイ

【効能・効果】

中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

- 1) アルツハイマー型認知症と診断された患者にのみ使用すること。
- 2) 本剤がアルツハイマー型認知症の病態そのものの進行を抑制するという成績は得られていない。
- 3) アルツハイマー型認知症以外の認知症性疾患において本剤の有効性は確認されていない。

【用法・用量】

通常、成人にはメマンチン塩酸塩として1日1回5mgから開始し、1週間に5mgずつ増量し、維持量として1日1回20mgを経口投与する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

- 1) 1日1回5mgからの漸増投与は、副作用の発現を抑える目的であるので、維持量まで増量すること。
- 2) 高度の腎機能障害(クレアチニンクリアランス値:30mL/min未満)のある患者には、患者の状態を観察しながら慎重に投与し、維持量は1日1回10mgとすること(「慎重投与」の項参照)。
- 3) 医療従事者、家族等の管理の下で投与すること。
- 4) OD錠は口腔内で速やかに崩壊するが、口腔粘膜からの吸収により効果発現を期待する薬剤ではないため、崩壊後は唾液又は水で飲み込むこと。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) てんかん又は痙攣の既往のある患者[発作を誘発又は悪化させることがある。]
- 2) 腎機能障害のある患者[本剤は腎排泄型の薬剤であり、腎機能障害のある患者では排泄が遅延する(「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照)。]
- 3) 尿pHを上昇させる因子(尿細管性アシドーシス、重症の尿路感染等)を有する患者[尿のアルカリ化により本剤の尿中排泄率が低下し、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。]
- 4) 高度の肝機能障害のある患者[使用経験がなく、安全性が確立していない。]

2. 重要な基本的注意

- 1) 投与開始初期においてめまい、傾眠が認められることがあるので、患者の状態を注意深く観察し、異常が認められた場合は、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
また、これらの症状により転倒等を伴うことがあるため、十分に注意すること。
- 2) 通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。
また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
- 3) 他の認知症性疾患との鑑別診断に留意すること。
- 4) 本剤投与により効果が認められない場合、漫然と投与しないこと。

3. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドパミン作動薬 レボドパ等	ドパミン作動薬の作用を増強させるおそれがある。	本剤のNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体拮抗作用が、ドパミン遊離を促進させる可能性がある。
ヒドロクロロチアジド	ヒドロクロロチアジドの血中濃度を低下させる。	機序は不明である。
腎尿細管分泌(カチオン輸送系)により排泄される薬剤 シメチジン等	本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は一部が尿細管分泌(カチオン輸送系)により排泄されるため、同じ輸送系を介する薬剤と競合する可能性がある。
尿アルカリ化を起こす薬剤 ¹⁾ アセタゾラミド等	本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。	尿のアルカリ化により、本剤の尿中排泄率が低下するため。
NMDA受容体拮抗作用を有する薬剤 アマタジン塩酸塩 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 等	相互に作用を増強させるおそれがある。	両薬剤ともNMDA受容体拮抗作用を有するため。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用(頻度不明)

- (1) **痙攣**：痙攣があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
 - (2) **失神、意識消失**：失神、意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
 - (3) **精神症状(激越、攻撃性、妄想、幻覚、錯乱、せん妄)**：精神症状(激越、幻覚、錯乱等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
 - (4) **肝機能障害、黄疸**：AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (5) **横紋筋融解症**：横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。
- ***(6) 完全房室ブロック、高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈**：完全房室ブロック、高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2) その他の副作用

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には必要に応じ投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	発疹、顔面浮腫、眼瞼浮腫

	頻度不明
精神神経系	めまい、頭痛、傾眠、不眠、徘徊、不穏、易怒性、不安、歩行障害、不随意運動(振戦、チック、ジスキネジー等)、活動性低下、鎮静
腎臓	頻尿、尿失禁、尿潜血、BUN上昇
肝臓	肝機能異常
消化器	便秘、食欲不振、消化管潰瘍、悪心、嘔吐、下痢、便失禁
循環器	血圧上昇、血圧低下、上室性期外収縮
その他	血糖値上昇、転倒、浮腫、体重減少、CK(CPK)上昇、貧血、倦怠感、発熱、コレステロール上昇、トリグリセリド上昇、脱力感

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔動物実験(ウサギ)で胎児への移行が認められている。また、動物実験(ラット)で胎児及び出生児の体重増加抑制が認められている。〕
- 授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔動物実験(ラット)で、乳汁中への移行が認められている。〕

6. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

7. 過量投与

- 症状**(外国人における報告)：メマンチン塩酸塩400mg服用患者において、不穏、幻視、痙攣、傾眠、昏迷、意識消失等があらわれ、また、メマンチン塩酸塩2,000mg服用患者において、昏睡、複視及び激越があらわれ、それぞれ回復したとの報告がある。
- 処置**：過量投与に対する特異的な中和剤は知られていない。過量投与と考えられる症状がみられた場合には、投与を中止し、適切な対症療法等を行うこと。なお、尿の酸性化により、わずかに排泄が促進したとの報告がある。

8. 適用上の注意

- 薬剤交付時**：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)
- 服用時**：
 - OD錠は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。
 - OD錠は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。

9. その他の注意

ラットの高用量投与実験(メマンチン塩酸塩100mg/kg単回経口投与、25mg/kg/日以上14日間反復経口投与、又は100mg/kg/日14日間混餌投与)において、脳梁膨大皮質及び帯状回皮質に神経細胞の空胞化又は壊死が認められた。

【薬物動態】

生物学的同等性試験

- メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)」に基づき、メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。²⁾
- メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」
メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)」に基づき、メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。³⁾


○メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」

メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」と標準製剤を健康成人男子にそれぞれ1錠(メマンチン塩酸塩として20mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中メマンチン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。⁴⁾

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-168hr} (ng·hr/mL)
メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	24.9±3.0	5.3±1.5	60.2±12.4	1647±178
標準製剤(普通錠、20mg)	25.3±3.4	5.2±1.8	58.9±8.3	1647±169

(Mean ± S. D., n = 20)



血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、血液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

○メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)」に基づき、メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。⁵⁾

○メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号)」に基づき、メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。⁶⁾

○メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」



メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」と標準製剤を健康成人男子にそれぞれ1錠(メマンチン塩酸塩として20mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中メマンチン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。⁷⁾

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

		Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-168hr} (ng·hr/mL)
水なし (n=20)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」	30.0±4.3	2.9±0.7	57.9±10.6	1661±174
	標準製剤(OD錠、20mg)	29.7±4.1	2.8±1.2	57.9±8.0	1663±174
水あり (n=19)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」	29.0±4.1	2.1±0.3	55.8±8.7	1550±173
	標準製剤(OD錠、20mg)	29.4±3.8	2.3±1.1	54.8±7.8	1587±205

(Mean ± S. D.)






血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

【薬効薬理】

メマンチンは低親和性のNMDA受容体非競合性電位依存性拮抗薬である。選択的にNMDA受容体に作用しMg²⁺と置換してチャネル機能を阻害することが、神経細胞傷害の進行抑制の作用機序とされている。⁸⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：メマンチン塩酸塩(Memantine Hydrochloride)
 化学名：3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-ylamine
 monohydrochloride
 分子式：C₁₂H₂₁N・HCl
 分子量：215.76
 構造式：



性状：白色の粉末である。ギ酸又はエタノール(99.5)に溶けやすく、水にやや溶けやすい。

【取扱い上の注意】

1. 取扱い上の注意

〈OD錠〉

- 1) 開封後は湿気を避けて保存すること。
- 2) 製剤の特性上、吸湿により錠剤表面がざらつくことがある。
- 3) OD錠5mg、OD錠10mgは錠剤表面に使用色素による斑点がみられることがある。

2. 安定性試験

錠5mg/10mg/20mg：PTP包装(PTPシートをアルミピロー包装)及びバラ包装したものをを用いた加速試験(40℃75%RH、6ヶ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。^{9)、10)、11)}
 OD錠5mg/10mg/20mg：PTP包装(PTPシートをアルミピロー包装(乾燥剤入り))及びバラ包装(ポリエチレン瓶(乾燥剤入り))したものをを用いた加速試験(40℃75%RH、6ヶ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。^{12)、13)、14)}

【包装】

メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」：
 PTP：14錠(14錠×1)、56錠(14錠×4)
 バラ：100錠
 メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」：
 PTP：14錠(14錠×1)、56錠(14錠×4)
 バラ：100錠
 メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」：
 PTP：56錠(14錠×4)、112錠(14錠×8)
 バラ：100錠
 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」：
 PTP：14錠(14錠×1)、56錠(14錠×4)
 バラ：100錠
 メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」：
 PTP：14錠(14錠×1)、56錠(14錠×4)
 バラ：100錠
 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」：
 PTP：56錠(14錠×4)、112錠(14錠×8)
 バラ：100錠

【主要文献及び文献請求先】

・主要文献

- 1) Freudenthaler, S. et al., Br. J. Clin. Pharmacol., **46**(6), 541(1998).
- 2)～7) 沢井製薬(株)社内資料[生物学的同等性試験]
- 8) 田中千賀子他編, NEW薬理学, 改訂第7版, 南江堂, 2017, p.314.
- 9)～14) 沢井製薬(株)社内資料[安定性試験]

・文献請求先 [主要文献(社内資料を含む)は下記にご請求下さい]

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30
 TEL：0120-381-999 FAX：06-6394-7355

製造販売元
沢井製薬株式会社
 大阪市淀川区宮原5丁目2-30