

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2018(2019年更新版)に準拠して作成

### 抗ウイルス化学療法剤

日本薬局方 バラシクロビル塩酸塩錠

# バラシクロビル錠500mg「サワイ」

VALACICLOVIR Tablets [SAWAI]

剤形	割線入りフィルムコーティング錠
製剤の規制区分	処方箋医薬品 <sup>注)</sup> 注)注意—医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	1錠中日局バラシクロビル塩酸塩556.21mg(バラシクロビルとして500mg)含有
一般名	和名:バラシクロビル塩酸塩(JAN) 洋名:Valaciclovir Hydrochloride(JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載年月日 販売開始年月日	製造販売承認年月日:2013年8月15日 薬価基準収載年月日:2013年12月13日 販売開始年月日:2013年12月13日
製造販売(輸入)・提携・販売会社名	製造販売元:沢井製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	沢井製薬株式会社 医薬品情報センター TEL:0120-381-999、FAX:06-7708-8966 医療関係者向け総合情報サイト: <a href="https://med.sawai.co.jp/">https://med.sawai.co.jp/</a>

本IFは2023年12月改訂の電子添文の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

# 医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ー日本病院薬剤師会ー

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書(以下、添付文書)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者(以下、MR)等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム(以下、IFと略す)が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬)学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)の医療用医薬品情報検索のページ(<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>)にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、IF記載要領2018が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

## 2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

### 3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V. 5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

### 4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020年4月改訂)

# 目次

I. 概要に関する項目 .....	1	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目 .....	26
1. 開発の経緯 .....	1	1. 警告内容とその理由 .....	26
2. 製品の治療学的特性.....	1	2. 禁忌内容とその理由 .....	26
3. 製品の製剤学的特性.....	1	3. 効能又は効果に関連する注意とその理由 .....	26
4. 適正使用に関して周知すべき特性.....	2	4. 用法及び用量に関連する注意とその理由 .....	26
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項.....	2	5. 重要な基本的注意とその理由 .....	26
6. RMPの概要 .....	2	6. 特定の背景を有する患者に関する注意 .....	26
II. 名称に関する項目 .....	3	7. 相互作用 .....	28
1. 販売名 .....	3	8. 副作用 .....	28
2. 一般名 .....	3	9. 臨床検査結果に及ぼす影響 .....	29
3. 構造式又は示性式.....	3	10. 過量投与 .....	29
4. 分子式及び分子量.....	3	11. 適用上の注意 .....	30
5. 化学名(命名法)又は本質.....	3	12. その他の注意 .....	30
6. 慣用名、別名、略号、記号番号.....	3		
III. 有効成分に関する項目.....	4	IX. 非臨床試験に関する項目 .....	31
1. 物理化学的性質.....	4	1. 薬理試験 .....	31
2. 有効成分の各種条件下における安定性.....	4	2. 毒性試験 .....	31
3. 有効成分の確認試験法、定量法.....	5		
IV. 製剤に関する項目 .....	6	X. 管理的事項に関する項目 .....	32
1. 剤形 .....	6	1. 規制区分 .....	32
2. 製剤の組成 .....	6	2. 有効期間 .....	32
3. 添付溶解液の組成及び容量.....	6	3. 包装状態での貯法 .....	32
4. 力価 .....	7	4. 取扱い上の注意 .....	32
5. 混入する可能性のある夾雑物.....	7	5. 患者向け資材 .....	32
6. 製剤の各種条件下における安定性.....	7	6. 同一成分・同効薬 .....	32
7. 調製法及び溶解後の安定性.....	8	7. 国際誕生年月日 .....	32
8. 他剤との配合変化(物理化学的变化).....	8	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準 収載年月日、販売開始年月日 .....	32
9. 溶出性 .....	8	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容 .....	32
10. 容器・包装 .....	9	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその 内容 .....	33
11. 別途提供される資材類.....	10	11. 再審査期間 .....	33
12. その他 .....	10	12. 投薬期間制限に関する情報 .....	33
V. 治療に関する項目 .....	11	13. 各種コード .....	33
1. 効能又は効果 .....	11	14. 保険給付上の注意 .....	33
2. 効能又は効果に関連する注意.....	11		
3. 用法及び用量 .....	11	XI. 文献 .....	34
4. 用法及び用量に関連する注意.....	12	1. 引用文献 .....	34
5. 臨床成績 .....	13	2. その他の参考文献 .....	35
VI. 薬効薬理に関する項目.....	19		
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群.....	19	XII. 参考資料 .....	36
2. 薬理作用 .....	19	1. 主な外国での発売状況 .....	36
VII. 薬物動態に関する項目.....	20	2. 海外における臨床支援情報 .....	36
1. 血中濃度の推移.....	20		
2. 薬物速度論的パラメータ.....	22	XIII. 備考 .....	37
3. 母集団(ポピュレーション)解析.....	22	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあ たっての参考情報 .....	37
4. 吸收 .....	23	2. その他の関連資料 .....	37
5. 分布 .....	23		
6. 代謝 .....	23		
7. 排泄 .....	24		
8. トランスポーターに関する情報.....	24		
9. 透析等による除去率.....	24		
10. 特定の背景を有する患者.....	24		
11. その他 .....	25		

## I. 概要に関する項目

### 1. 開発の経緯

バラシクロビル錠500mg「サワイ」は、日局バラシクロビル塩酸塩を含有する抗ウイルス化学療法剤である。

本剤は、後発医薬品として下記通知に基づき、製造方法並びに規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、承認を得て上市に至った。

承認申請に際し準拠した通知名	平成17年3月31日 薬食発第0331015号(平成21年3月4日 薬食発第0304004号により一部改正)
承認	2013年8月
上市	2013年12月

2015年5月に「造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制」の「効能又は効果」および「用法及び用量」、小児に対する単純疱疹、帯状疱疹、性器ヘルペスの再発抑制の「用法及び用量」が追加承認された。(X. -9. 参照)

### 2. 製品の治療学的特性

1) 本剤は、「単純疱疹」、「造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制」、「帯状疱疹」、「水痘」、「性器ヘルペスの再発抑制」の効能又は効果を有する。(V. -1. 参照)

2) バラシクロビルはアシクロビルのL-バリルエステルであり、経口投与後、主に肝初回通過効果によりアシクロビルに変換されて抗ウイルス作用を発現する。アシクロビルは、単純ヘルペスウイルスあるいは水痘・帯状疱疹ウイルスが感染した細胞内に入ると、ウイルス性チミジンキナーゼにより一リン酸化された後、細胞性キナーゼによりリン酸化され、アシクロビル三リン酸(ACV-TP)となる。ACV-TPは正常基質であるdGTPと競合してウイルスDNAポリメラーゼによりウイルスDNAの3'末端に取り込まれると、ウイルスDNA鎖の伸長を停止させ、ウイルスDNAの複製を阻害する<sup>1~5)</sup>。

アシクロビルリン酸化の第一段階である一リン酸化は感染細胞内に存在するウイルス性チミジンキナーゼによるため、ウイルス非感染細胞に対する障害性は低いものと考えられる。(VI. -2. 参照)

3) 重大な副作用として、アナフィラキシーショック、アナフィラキシー、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、播種性血管内凝固症候群(DIC)、血小板減少性紫斑病、急性腎障害、尿細管間質性腎炎、精神神経症状、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、呼吸抑制、無呼吸、間質性肺炎、肝炎、肝機能障害、黄疸、急性膵炎が報告されている。(VIII. -8. 参照)

### 3. 製品の製剤学的特性

特になし

## I. 概要に関する項目

### 4. 適正使用に関して周知すべき特性 .....

適正使用に関する資材、最適使用ガイドライン等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

(2025年4月1日時点)

### 5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項 .....

#### 1) 承認条件

該当しない

#### 2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

### 6. RMPの概要 .....

該当しない

## II. 名称に関する項目

1. 販売名 .....

1) 和名

バラシクロビル錠500mg「サワイ」

2) 洋名

VALACICLOVIR Tablets [SAWAI]

3) 名称の由来

通知「平成17年9月22日 薬食審査発第0922001号」に基づき命名した。

2. 一般名 .....

1) 和名(命名法)

バラシクロビル塩酸塩(JAN)

2) 洋名(命名法)


Valaciclovir Hydrochloride (JAN)

Valaciclovir (INN)

3) ステム(stem)

-ciclovir(see vir) : antivirals, bicyclic heterocycles compounds

3. 構造式又は示性式 .....



4. 分子式及び分子量 .....

分子式 : C<sub>13</sub>H<sub>20</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub> · HCl

分子量 : 360.80

5. 化学名(命名法)又は本質 .....

2-[ (2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl L-valinate monohydrochloride (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号 .....

略号 : VACV

### III. 有効成分に関する項目

## III. 有効成分に関する項目

### 1. 物理化学的性質 ······

#### 1) 外観・性状

白色～微黄白色の結晶性の粉末である。  
結晶多形が認められる。

#### 2) 溶解性

水に溶けやすく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくい。  
0.05mol/L塩酸試液に溶ける。

#### 3) 吸湿性

水分：1.7%以下(0.2g、電量滴定法)

#### 4) 融点(分解点)、沸点、凝固点

該当資料なし

#### 5) 酸塩基解離定数

$pK_{a1}=1.90$ 、 $pK_{a2}=7.47$ 、 $pK_{a3}=9.43$ <sup>6)</sup>

#### 6) 分配係数

該当資料なし

#### 7) その他の主な示性値

旋光度 $[\alpha]_D^{20} : -7.1 \sim -11.1^\circ$  (1g、水、20mL、100mm)

### 2. 有効成分の各種条件下における安定性 ······

#### 原薬の安定性<sup>6)</sup>

水：該当資料なし

液性(pH)：該当資料なし

光：苛酷試験

保存条件	保存期間	保存形態	試験結果
25°C、白色蛍光燈 1000Lux	120万Lux・hr	ガラス製シャーレ (ポリ塩化ビニリデンフィルムで覆った)	変化なし

測定項目：性状、確認試験、純度試験、水分、定量法、溶状、熱分解

### III. 有効成分に関する項目

その他：

試験区分	保存条件	保存期間	保存形態	試験結果
長期保存試験	25°C、 60%RH、 暗所	36カ月	2重のポリエチレン袋、密閉	変化なし。
加速試験	40°C、 75%RH、 暗所	6カ月	2重のポリエチレン袋、密閉	変化なし。
苛 酷 試 験	50°C、 75%RH、 暗所	6カ月	ガラス瓶、密栓	類縁物質の増加(その他個々 : 0.11% (RRT 1.93)、 0.14% (RRT 3.36)、 その他合計 0.25%)が認められた。その他の項目は変化なし。
	60°C、 75%RH、 暗所			類縁物質の増加(1512W91/HCL 0.5%、その他個々 : 0.06% (RRT 0.79)、 0.23% (RRT 1.12)、 0.14% (RRT 1.91)、 0.06% (RRT 2.57)、 0.15% (RRT 3.36)、 その他合計 0.64%)が認められた。その他の項目は変化なし。
	40°C、 75%RH、 暗所	6カ月	ガラス瓶、開栓	変化なし。
	50°C、 75%RH、 暗所			変化なし。
	60°C、 75%RH、 暗所			変化なし。

測定項目：性状、確認試験、純度試験、水分、定量法、溶状、熱分解

### 3. 有効成分の確認試験法、定量法

#### <確認試験法>

日局「バラシクロビル塩酸塩」の確認試験に準ずる。

- 1) 紫外可視吸光度測定法
- 2) 赤外吸収スペクトル測定法
- 3) 塩化物の定性反応

#### <定量法>

日局「バラシクロビル塩酸塩」の定量法に準ずる。(液体クロマトグラフィー)

## IV. 製剤に関する項目

## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形 ······

#### 1) 剤形の区別

割線入りフィルムコーティング錠

#### 2) 製剤の外観及び性状

表 (直径mm)	裏 (重量mg)	側面 (厚さmm)	性状
 17.3×8.1	 約730	 6.5	白色～微黄白色

#### 3) 識別コード

表示部位：錠剤本体(両面)

表示内容：バラシクロビル SW 500

#### 4) 製剤の物性

製剤均一性：日局バラシクロビル塩酸塩錠 製剤均一性の項により質量偏差試験を行うとき、規格に適合する。

溶出性：日局バラシクロビル塩酸塩錠 溶出性の項により試験を行うとき、規格に適合する。  
(pH1.2、30分：75%以上)

#### 5) その他

該当しない

### 2. 製剤の組成 ······

#### 1) 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤

有効成分 [ 1錠中]	日局バラシクロビル塩酸塩 556.21mg (バラシクロビルとして500mg)
添加剤	カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000

#### 2) 電解質等の濃度

該当資料なし

#### 3) 熱量

該当資料なし

### 3. 添付溶解液の組成及び容量 ······

該当しない

4. 力価 .....  
該当しない
5. 混入する可能性のある夾雜物 .....  
該当資料なし
6. 製剤の各種条件下における安定性.....

1) PTP包装品の安定性(加速試験)<sup>7)</sup>

バラシクロビル錠500mg「サワイ」をPTP包装(ポリ塩化ビニリデンフィルム、アルミ箔)した後、ピロー包装(アルミ袋)したものについて、安定性試験を行った。

その結果、規格に適合した。

保存条件	イニシャル	40°C75%RH・遮光 6カ月
性状	白色～微黄白色の割線入りフィルムコーティング錠であった	同左
確認試験	規格に適合	同左
純度試験	規格に適合	同左
質量偏差試験	規格に適合	同左
溶出試験	規格に適合	同左
定量試験*	99.1	99.4

\*: 表示量に対する含有率(%)

2) 無包装下の安定性試験<sup>8)</sup>

バラシクロビル錠500mg「サワイ」の無包装の製剤について、各種条件下で保存し、安定性試験を行った。

その結果、湿度の条件下で硬度低下が観察された。

保存条件	イニシャル	温度 (40°C 3カ月)	湿度(25°C75%RH)	
			1カ月	3カ月
性状	白色の割線入りフィルムコーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
硬度(kg)	29.3	27.4	19.5	18.8
純度試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験*	100.0	100.5	100.1	100.1

保存条件	イニシャル	光 (総照射量 60万lx·hr)	室温 (25°C60%RH 3カ月)
性状	白色の割線入りフィルムコーティング錠	変化なし	変化なし
硬度(kg)	29.3	23.0	24.5
純度試験	問題なし	問題なし	問題なし
定量試験*	100.0	100.0	100.3

日本病院薬剤師会編「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性情報」の基準に準じて試験を行っている。

\*: イニシャルを100としたときの含有率(%)

#### IV. 製剤に関する項目

##### <補足>

バラシクロビル錠500mg「サワイ」の無包装の製剤について、各種条件下で保存し、溶出試験を行った。

その結果、問題なく規格に適合することが確認された。

保存条件	イニシャル	温度 (40°C 3カ月)	湿度 (25°C 75%RH 3カ月)	光 (総照射量 60万lx·hr)	室温 (25°C 60%RH 3カ月)
溶出試験	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし

##### 3) 分割後の安定性試験<sup>9)</sup>

バラシクロビル錠500mg「サワイ」を割線で二分割後、以下の保存条件下で保存し、安定性試験を行った。

その結果、以下の結果が得られた。

保存条件	イニシャル	室温 (25°C 60%RH 4週間)	光 (総照射量60万lx·hr)
性状	表面	白色	変化なし
	分割面	白色	変化なし
定量試験※	100.0	99.5	100.0

※：イニシャルを100としたときの含有率(%)

#### 7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

#### 8. 他剤との配合変化(物理化学的变化)






該当資料なし

#### 9. 溶出性

##### <溶出挙動における同等性及び類似性><sup>10)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」：平成18年11月24日 薬食審査発第1124004号	
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、5.0、6.8、水)、100rpm(pH6.8)
試験回数	12ベッセル	
試験製剤	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	
標準製剤	バルトレックス錠500	
結果及び考察	<50rpm : pH1.2> 標準製剤の平均溶出率が60%(15分)及び85%(30分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。 <50rpm : pH5.0> 両製剤の溶出挙動に差異が認められた。 <50rpm : pH6.8> 標準製剤の平均溶出率が40%(30分)及び85%(120分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。 <50rpm : 水> f2閾値の値が42以上であった。 <100rpm : pH6.8> 両製剤の溶出挙動に差異が認められた。	

結果及び考察	以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していないと判断した。しかしながら血中濃度比較試験において同等であることが確認されたため、両製剤は生物学的に同等であると判断した。
--------	--



( [ ] : 判定基準の適合範囲)

## 10. 容器・包装 .....

### 1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当資料なし

### 2) 包装

#### 22. 包装

PTP : 42錠(6錠×7)

#### IV. 製剤に関する項目

##### 3) 予備容量

該当しない

##### 4) 容器の材質

PTP : [PTPシート]ポリ塩化ビニリデンフィルム、アルミ箔

[ピロー]アルミ袋

11. 別途提供される資材類 .....

該当しない

12. その他 .....

該当資料なし

## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

#### 4. 効能又は効果

- 単純疱疹
- 造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制
- 帯状疱疹
- 水痘
- 性器ヘルペスの再発抑制

### 2. 効能又は効果に関連する注意

#### 5. 効能又は効果に関連する注意

##### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

- 5. 1 本剤の投与により、セックスパートナーへの感染を抑制することが認められている。ただし、本剤投与中もセックスパートナーへの感染リスクがあるため、コンドームの使用等が推奨される。[17. 3参照]
- 5. 2 性器ヘルペスの発症を繰り返す患者(免疫正常患者においては、おおむね年6回以上の頻度で再発する者)に対して投与すること。[17. 1. 8、17. 1. 9参照]

### 3. 用法及び用量

#### 1) 用法及び用量の解説

#### 6. 用法及び用量

##### 〔成人〕

##### 〈単純疱疹〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

##### 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで経口投与する。

##### 〈帯状疱疹〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

##### 〈水痘〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

##### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm<sup>3</sup>以上)にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

##### 〔小児〕

##### 〈単純疱疹〉

通常、体重40kg以上的小児にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

##### 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制〉

通常、体重40kg以上的小児にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで経口投与する。

##### 〈帯状疱疹〉

通常、体重40kg以上的小児にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

## V. 治療に関する項目

### 〈水痘〉

通常、体重40kg以上の小児にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

通常、体重40kg以上の小児にはバラシクロビルとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm<sup>3</sup>以上)にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

## 2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

## 4. 用法及び用量に関連する注意

### 7. 用法及び用量に関連する注意

#### 〈効能共通〉

7.1 本剤の投与は、発病初期に近いほど効果が期待できるので、早期に投与を開始することが望ましい。

7.2 腎障害を有する成人患者におけるクレアチニクリアランスに応じた本剤の投与間隔及び投与量の目安は下表のとおりである。また、血液透析を受けている患者に対しては、患者の腎機能、体重又は臨床症状に応じ、クレアチニクリアランス10mL/min未満の目安よりさらに減量(250mgを24時間毎等)することを考慮すること。また、血液透析日には透析後に投与すること。なお、腎障害を有する小児患者における本剤の投与間隔及び投与量調節の目安は確立していない。[8.2、9.2.1、9.8、13.1、16.6.1、16.6.2参照]

	クレアチニクリアランス(mL/min)			
	≥50	30~49	10~29	<10
単純疱疹 造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制	500mgを 12時間毎	500mgを 12時間毎	500mgを 24時間毎	500mgを 24時間毎
帯状疱疹 水痘	1000mgを 8時間毎	1000mgを 12時間毎	1000mgを 24時間毎	500mgを 24時間毎
性器ヘルペスの再発抑制	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm <sup>3</sup> 以上)には、500mgを12時間毎	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm <sup>3</sup> 以上)には、500mgを12時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm <sup>3</sup> 以上)には、500mgを24時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数100/mm <sup>3</sup> 以上)には、500mgを24時間毎

#### 〈単純疱疹〉

7.3 本剤を5日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。ただし、初発型性器ヘルペスは重症化する場合があるため、本剤を10日間まで使用可能とする。

#### 〈帯状疱疹〉

7.4 目安として、皮疹出現後5日以内に投与を開始することが望ましい。

7.5 本剤を7日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。

**〈水痘〉**

7.6 目安として、皮疹出現後2日以内に投与を開始することが望ましい。

7.7 成人においては本剤を5～7日間、小児においては本剤を5日間使用し、改善の兆しが見られないか、あるいは悪化する場合には、他の治療に切り替えること。

**〈性器ヘルペスの再発抑制〉**

7.8 免疫正常患者において、性器ヘルペスの再発抑制に本剤を使用している際に再発が認められた場合には、1回500mg 1日1回投与(性器ヘルペスの再発抑制に対する用法及び用量)から1回500mg 1日2回投与(単純疱疹の治療に対する用法及び用量)に変更すること。治癒後は必要に応じ1回500mg 1日1回投与(性器ヘルペスの再発抑制に対する用法及び用量)の再開を考慮すること。また、再発抑制に対して本剤を投与しているにもかかわらず頻回に再発を繰り返すような患者に対しては、症状に応じて1回250mg 1日2回又は1回1000mg 1日1回投与に変更することを考慮すること。<sup>[17.1.8、17.1.9参照]</sup>

7.9 本剤を1年間投与後、投与継続の必要性について検討することが推奨される。<sup>[17.1.8、17.1.9参照]</sup>

**5. 臨床成績****1) 臨床データパッケージ**

該当資料なし

**2) 臨床薬理試験**

該当資料なし

**3) 用量反応探索試験****17.1 有効性及び安全性に関する試験****〈単純疱疹〉****17.1.1 国内第Ⅱ相試験**

成人単純疱疹患者を対象としたバラシクロビル錠の用量設定試験(計56施設、152例)の結果は以下のとおりである<sup>11)</sup>。

バラシクロビルの有効率(1回500mg 1日2回5日間投与)は90.0%(36/40例)であった。

バラシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

安全性解析 対象症例数	発現件数	主な種類(件)
131	27	ALT上昇(5)、頭痛(2)、眠気(2)、白血球減少[血液](2)、好酸球增多(2)、尿蛋白(2)

**〈帯状疱疹〉****17.1.4 国内第Ⅱ相試験**

皮疹出現後72時間以内の成人帯状疱疹患者を対象としたバラシクロビル錠の用量設定試験(計56施設、183例)の結果は以下のとおりである<sup>12,13)</sup>。

バラシクロビルの有効率(1回1000mg 1日3回7日間投与)は89.1%(49/55例)であった。

バラシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

安全性解析 対象症例数	発現件数	主な種類(件)
172	54	ALT上昇(9)、AST上昇(7)、腹痛(5)、BUN上昇(4)、白血球增多[血液](3)、食欲不振(2)、頭痛(2)、単球減少(2)、総コレステロール減少(2)

## V. 治療に関する項目

### 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

#### 17.1.8 海外臨床試験

成人免疫正常患者及びHIVに重複感染し免疫不全状態にある成人患者を対象とした用量設定試験の結果は以下のとおりである<sup>14~16)</sup>。[5.2、7.8、7.9参照]

性器ヘルペスの未再発率、プラセボ群又はアシクロビル投与群と比較した再発リスク低下率は以下のとおりであった。

				未再発率	再発リスク低下率 (95%信頼区間)
免疫正常患者	52週間投与	年間6回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者	バラシクロビル 500mg 1日1回投与群 (266例)	40%	71% <sup>注1)</sup> (63~78)
			プラセボ投与群 (134例)	5%	
HIV感染患者	48週間投与	1年以内に性器ヘルペスが再発した患者	バラシクロビル 500mg 1日2回投与群 (355例)	82%	27% <sup>注2)</sup> (-6~50)
			アシクロビル 1回400mg 1日2回投与群 (349例)	78%	

注1) プラセボ投与群との比較

注2) アシクロビル1回400mg 1日2回投与群との比較

なお、年間6回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す免疫正常患者に対して、バラシクロビル1000mg 1日1回投与<sup>注3)</sup>(269例)又はバラシクロビル250mg 1日2回投与(274例)した場合の、52週間投与時の未再発率は、それぞれ48%、50%であり、プラセボ群と比較した再発リスク低下率(95%信頼区間)は、それぞれ78%(71~83)、79%(73~84)であった。

注3) 性器ヘルペスの再発抑制における本剤の承認用量は、通常、1回500mgを1日1回経口投与である。

バラシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

				安全性解析対象症例数	発現症例数(件)	主な種類(発現率)
免疫正常患者	52週間投与	年間6回以上性器ヘルペスの再発を繰り返す患者	バラシクロビル 500mg 1日1回投与群	266	88 (178)	頭痛(11~14%)、恶心(5~8%)、下痢(2~7%)等
			バラシクロビル 1000mg 1日1回投与群 <sup>注3)</sup>	269	96 (173)	
			バラシクロビル 250mg 1日2回投与群 <sup>注3)</sup>	274	87 (173)	
HIV感染患者	48週間投与	1年以内に性器ヘルペスが再発した患者	バラシクロビル 500mg 1日2回投与群	355	94	恶心(7%)、下痢(6%)、頭痛(5%)等

## 4) 検証的試験

## (1) 有効性検証試験

## 〈単純疱疹〉

## 17.1.2 国内第Ⅲ相試験

成人単純疱疹患者を対象としたバラシクロビル錠のアシクロビル対照二重盲検比較試験(計59施設、300例、アシクロビル投与群：1回200mg 1日5回5日間投与)の結果は以下のとおりである<sup>17)</sup>。

バラシクロビルの有効率(1回500mg 1日2回投与)は95.9%(141/147例)であった。

バラシクロビル又はアシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

安全性解析 対象症例数	発現症例数 (件)	主な種類(件)
バラシクロビル投与群	149	眠気(7)、頭痛(6)、白血球增多[尿中](5)、軟便(3)、血小板增多(3)
アシクロビル投与群	148	白血球增多[尿中](4)、不快感[胃](3)、下痢(3)、嘔気(3)、カリウム上昇[血清](3)、頭痛(3)

## 〈造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制〉

## 17.1.3 国内第Ⅲ相試験

成人及び小児造血幹細胞移植患者を対象としたバラシクロビルの非対照非盲検試験(計11施設、40例)の結果(臨床効果)は以下のとおりである<sup>18)</sup>(錠剤及び顆粒剤の成績)。

成人にはバラシクロビルを1回500mg 1日2回、小児には1回25mg/kg 1日2回(1回最高用量は500mg)<sup>注)</sup>、造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日までの計43日間投与することにより、投与期間中の単純疱疹の発症を認めなかった。本試験において、副作用はみられなかった。

注)造血幹細胞移植患者における本剤の承認用量は、通常、体重40kg以上的小児には1回500mgを1日2回経口投与である。

## 〈帯状疱疹〉

## 17.1.5 国内第Ⅲ相試験

皮疹出現後72時間以内の成人帯状疱疹患者を対象としたバラシクロビル錠のアシクロビル対照二重盲検比較試験(計58施設、202例、アシクロビル投与群：1回800mg 1日5回7日間投与)の結果は以下のとおりである<sup>19)</sup>。

バラシクロビルの有効率(1回1000mg 1日3回投与)は87.3%(89/102例)であった。

バラシクロビル又はアシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

安全性解析 対象症例数	発現症例数 (件)	主な種類(件)
バラシクロビル投与群	102	ALT上昇(5)、BUN上昇(3)、血清クレアチニン上昇(3)、倦怠感(2)、腹痛(2)、不快感[胃](2)、下痢(2)、尿糖(2)、AST上昇(2)、急性腎障害(1)
アシクロビル投与群	98	不快感[胃](3)、倦怠感(2)、腹部膨満感(2)、ALT上昇(2)、尿蛋白(2)、血小板增多(2)、BUN上昇(1)

## V. 治療に関する項目

### 17.1.6 海外臨床試験

無作為化二重盲検比較試験において、50歳以上の免疫機能が正常な成人帯状疱疹患者を対象に、バラシクロビル1000mg 1日3回7日間投与(384例)又は14日間投与(381例)、アシクロビル800mg 1日5回7日間投与(376例)した3群間で帯状疱疹に伴う疼痛の消失推移を比較した。その結果、バラシクロビル7日間投与群及び14日間投与群はアシクロビル投与群に比べPHN(帯状疱疹後神経痛、Post Herpetic Neuralgia)を含む帯状疱疹に伴う疼痛消失までの期間を有意に短縮した( $p=0.001$ 及び $p=0.03$ 、Cox比例ハザードモデル)。また、疼痛消失までの日数(中央値)はバラシクロビル7日間投与群で38日、バラシクロビル14日間投与群で44日、アシクロビル7日間投与群で51日であった。なお、バラシクロビル7日間投与群と14日間投与群の間には、有意な差が認められなかった<sup>20)</sup>。


### 〈水痘〉

### 17.1.7 国内臨床試験

バラシクロビルの非対照非盲検試験(計10施設、43例)の結果は以下のとおりである<sup>21, 22)</sup>(顆粒剤の成績)。

小児水痘患者にバラシクロビルを1回25mg/kg 1日3回<sup>注)</sup>、5日間投与することにより、前胸部の皮疹数は、顕著な増加を認めることなく、投与2日目以後は減少を続ける推移を示した。なお、本試験の結果とアシクロビルを1回20mg/kg 1日4回、5日間投与した試験における前胸部の皮疹数の推移とを比較した結果は以下のとおりである。

注)本剤の承認用量は、通常、体重40kg以上的小児には1回1000mgを1日3回経口投与である。



バラシクロビル試験	投与後日数	0	1	2	3	4	5	6
例数		41	41	41	41	41	41	40
平均値		30.7	54.6	57.0	49.4	40.9	35.1	26.4

アシクロビル試験	投与後日数	0	1	2	3	4	5	6
例数		51	22	28	38	27	25	19
平均値		45.5	38.1	48.1	51.5	36.7	25.3	18.2

バラシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

安全性解析 対象症例数	発現症例数 (件)	種類(件)
43	2 (3)	ALT増加(1)、AST増加(1)、便秘(1)

## 〈性器ヘルペスの再発抑制〉

## 17.1.9 海外臨床試験

成人免疫正常患者及びHIVに重複感染し免疫不全状態にある成人患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験の結果は以下のとおりである<sup>23~26)</sup>。[5.2、7.8、7.9参照]

性器ヘルペスの未再発率、プラセボ群と比較した再発リスク低下率は以下のとおりであった。

				未再発率	再発リスク 低下率 (95%信頼区間)
免疫 正常 患者	16週間 投与	年間8回以上 性器ヘルペスの 再発を繰り返す 患者	バラシクロビル 500mg 1日1回投与群 (288例)	69%	85% <sup>注1)</sup> (79~89)
			プラセボ投与群 (94例)	9.5%	
HIV 感染 患者	6ヵ月間 投与	年間4回以上 性器ヘルペスの 再発を繰り返す 患者	バラシクロビル 500mg 1日2回投与群 (194例)	81%	80% <sup>注1)</sup> (70~87)
			プラセボ投与群 (99例)	37%	

注1) プラセボ投与群との比較

バラシクロビルとの関連性が疑われた副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況は以下のとおりである。

				安全性 解析対象 症例数	発現 症例数 (件)	主な種類 (発現率)
免疫 正常 患者	16週間 投与	年間8回以上 性器ヘルペスの 再発を繰り返す 患者	バラシクロビル 500mg 1日1回投与群	288	66 (112)	頭痛(7%)、 嘔気(6%)等
HIV 感染 患者	6ヵ月 間投与	年間4回以上 性器ヘルペスの 再発を繰り返す 患者	バラシクロビル 500mg 1日2回投与群	194	23 (-)	頭痛(5%)、 下痢(3%)

## (2) 安全性試験

該当資料なし

## 5) 患者・病態別試験

該当資料なし

## V. 治療に関する項目

### 6) 治療的使用

#### (1) 使用成績調査(一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

##### 17.2 製造販売後調査等

###### 〈帯状疱疹〉

国内において実施された特定使用成績調査において、成人帯状疱疹患者にバラシクロビルを投与(平均2944mg/日×7.2日)した316例の帯状疱疹に伴う疼痛の消失推移を検討した。その結果、疼痛消失までの日数(中央値)は35日であり、PHN移行率(皮疹発現90日後の疼痛残存率)は24.7%(78/316例)であった<sup>27)</sup>。

#### (2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

### 7) その他

##### 17.3 その他

海外において実施された、性器ヘルペスの年間再発回数が9回以下の成人免疫正常患者を対象としたプラセボ対照無作為化二重盲検比較試験(1484例)の結果は以下のとおりである<sup>28)</sup>。[5.1参考]

8カ月投与時のセックスパートナーへのHSV-2による性器ヘルペス初感染発症率は、バラシクロビル1回500mg 1日1回投与群で0.5%(4/743例)、プラセボ投与群で2.2%(16/741例)であった。

## VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群.....

核酸型ポリメラーゼ阻害作用：

アシクロビル、ファムシクロビル<sup>29)</sup>

注意：関連のある化合物の效能又は効果等は、最新の電子添文を参照すること。

### 2. 薬理作用 .....

#### 1) 作用部位・作用機序

##### 18.1 作用機序

バラシクロビルはアシクロビルのL-バリルエステルであり、経口投与後、主に肝初回通過効果によりアシクロビルに変換されて抗ウイルス作用を発現する。アシクロビルは、単純ヘルペスウイルスあるいは水痘・帯状疱疹ウイルスが感染した細胞内に入ると、ウイルス性チミジンキナーゼにより一リン酸化された後、細胞性キナーゼによりリン酸化され、アシクロビル三リン酸(ACV-TP)となる。ACV-TPは正常基質であるdGTPと競合してウイルスDNAポリメラーゼによりウイルスDNAの3'末端に取り込まれると、ウイルスDNA鎖の伸長を停止させ、ウイルスDNAの複製を阻害する<sup>1~5)</sup>。

アシクロビルリン酸化の第一段階である一リン酸化は感染細胞内に存在するウイルス性チミジンキナーゼによるため、ウイルス非感染細胞に対する障害性は低いものと考えられる。

#### 2) 薬効を裏付ける試験成績

##### 18.2 抗ウイルス作用

###### 18.2.1 単純ヘルペスウイルスに対する作用

バラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルは、単純ヘルペスウイルス1型及び2型の*in vitro*における増殖を抑制し、IC<sub>50</sub>はそれぞれ0.01~1.25 μg/mL及び0.01~3.20 μg/mLであった<sup>30, 31)</sup>。

###### 18.2.2 水痘・帯状疱疹ウイルスに対する作用

バラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルは、水痘・帯状疱疹ウイルスの*in vitro*における増殖を抑制し、IC<sub>50</sub>は0.17~7.76 μg/mLであった<sup>1, 32, 33)</sup>。また、サル水痘ウイルスを気道に接種したサルにバラシクロビル200及び400mg/kg/日を1日3回に分割し連続10日間経口投与したところ、皮疹の発現が抑制され、血中ウイルス価が減少した<sup>34)</sup>。

#### 3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移

#### 1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

#### 2) 臨床試験で確認された血中濃度

##### 16.1 血中濃度

###### 16.1.1 単回投与

6例の健康成人にバラシクロビル500mg又は1000mgを単回経口投与した場合、その活性代謝物であるアシクロビルに主に肝臓において速やかに代謝され、血漿中アシクロビルの薬物動態パラメータは下記のとおりであった<sup>35)</sup>。

バラシクロビル 投与量	例数	単回経口投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ			
		Cmax ( $\mu$ g/mL)	Tmax (hr)	AUC <sub>0-∞</sub> ( $\mu$ g · hr/mL)	t <sub>1/2</sub> (hr)
500mg	6	3.66±0.83	1.50±0.63	12.74±2.77	2.96±0.41
1000mg	6	5.84±1.08	2.17±0.61	22.26±5.73	3.55±0.27

平均値±標準偏差

###### 16.1.2 反復投与

バラシクロビル500mgを1日2回(12時間毎)又は1000mgを1日3回(8時間毎)6日間反復経口投与した場合、数回の投与で血漿中アシクロビル濃度は定常状態に達し、トラフ濃度の平均はそれぞれ0.22~0.29  $\mu$ g/mL及び0.94~1.18  $\mu$ g/mLであり蓄積性は認められなかつた<sup>35)</sup>。

### <生物学的同等性試験><sup>36, 37)</sup>

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」: 平成18年11月24日 薬食審査発第1124004号
採血時点	バラシクロビル: 0、0.25、0.5、0.75、1、1.33、1.67、2、3、4、6 hr アシクロビル: 0、0.25、0.5、0.75、1、1.33、1.67、2、3、4、6、8、12hr
休薬期間	7日間
測定方法	LC/MS法
試験製剤	バラシクロビル錠500mg「サワイ」
標準製剤	バルトレックス錠500

バラシクロビル錠500mg「サワイ」とバルトレックス錠500を健康成人男子にそれぞれ1錠(バラシクロビルとして500mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中バラシクロビル濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。


またバラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルについても、血漿中濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC<sub>t</sub>、C<sub>max</sub>)について、生物学的同等性試験ガイドラインに準じて統計解析を行った結果、判定基準を満たすことが確認された。

各製剤 1錠投与時の薬物動態パラメータ


		Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>t</sub> * (ng·hr/mL)
バラシクロビル	バラシクロビル 錠500mg「サワイ」	84.9±29.4	1.1±0.5	0.6±0.1	135.4±29.0
	バルトレックス 錠500	83.1±26.8	1.3±0.8	0.5±0.1	134.8±22.6
アシクロビル	バラシクロビル 錠500mg「サワイ」	3423.1±1257.8	1.9±0.7	2.6±0.2	11940.3±2869.8
	バルトレックス 錠500	3499.1±1246.3	2.0±0.8	2.7±0.3	12161.9±3067.6

\*バラシクロビル : AUC<sub>0-6hr</sub>、アシクロビル : AUC<sub>0-12hr</sub>  
(Mean±S.D.)

## 【バラシクロビル】



## 【アシクロビル】



## VII. 薬物動態に関する項目

		対数値の平均値の差	対数値の平均値の差の90%信頼区間
バラシクロビル	AUC <sub>0-6hr</sub>	log(1.00)	log(0.95)～log(1.04)
	Cmax	log(1.01)	log(0.89)～log(1.15)
アシクロビル	AUC <sub>0-12hr</sub>	log(0.98)	log(0.93)～log(1.04)
	Cmax	log(0.96)	log(0.89)～log(1.05)

血漿中濃度ならびにAUCt、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

### 3) 中毒域

該当資料なし

### 4) 食事・併用薬の影響

#### 16.2.1 食事の影響

食事によりアシクロビルの最高血漿中濃度到達時間は僅かに遅延したが、AUCに有意な差を認めなかった<sup>38, 39)</sup>(外国人データ)。

VIII. -7. 参照

## 2. 薬物速度論的パラメータ

### 1) 解析方法

該当資料なし

### 2) 吸収速度定数

該当資料なし

### 3) 消失速度定数

バラシクロビル錠500mg「サワイ」を健康成人男子に1錠(バラシクロビルとして500mg)空腹時単回経口投与した場合の消失速度定数<sup>36, 37)</sup>

[バラシクロビル] 1.287±0.266hr<sup>-1</sup>

[アシクロビル] 0.265±0.025hr<sup>-1</sup>

### 4) クリアランス

該当資料なし

### 5) 分布容積

該当資料なし

### 6) その他

該当資料なし

## 3. 母集団(ポピュレーション)解析

### 1) 解析方法

該当資料なし

2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収

16.2 吸収

16.2.2 バイオアベイラビリティ

健康成人にバラシクロビル1000mgを単回経口投与した場合のアシクロビルの生物学的利用率は54.2%であった<sup>40)</sup>(外国人データ)。

VII. -8. 参照

5. 分布

1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

2) 血液-胎盤関門通過性

VIII. -6. -5) 参照

3) 乳汁への移行性

16.3.2 乳汁中濃度

ヒトにバラシクロビル500mg経口投与後、アシクロビルの乳汁中Cmaxは、母体血清中Cmaxの0.5~2.3倍(中央値：1.4)を示し、アシクロビルの乳汁中AUCは、母体血清中AUCの1.4~2.6倍(中央値：2.2)を示した<sup>41)</sup>(外国人データ)。[9.6参照]

VIII. -6. -6) 参照

4) 髄液への移行性

該当資料なし

5) その他の組織への移行性

該当資料なし

6) 血漿蛋白結合率

16.3 分布

16.3.1 血漿蛋白結合率

*In vitro*でのバラシクロビル及びアシクロビル(活性代謝物)の血漿蛋白結合率は、それぞれ13.5~17.9及び22~33%であった<sup>42)</sup>。

6. 代謝

1) 代謝部位及び代謝経路

16.4 代謝

ヒト肝において、バラシクロビルの加水分解活性は高かった<sup>43)</sup>。

VI. -2. -1) 参照

## VII. 薬物動態に関する項目

### 2) 代謝に関する酵素(CYP等)の分子種、寄与率

該当資料なし

### 3) 初回通過効果の有無及びその割合

VI. -2. -1) 参照

### 4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

VI. -2. -1) 参照

## 7. 排泄

### 16.5 排泄

6例の健康成人にバラシクロビル1000mgを単回経口投与した場合、主な排泄経路は尿中であり、24時間以内の尿中に未変化体、アシクロビル及び9-カルボキシメトキシメチルグアニン(既知のアシクロビルの代謝物)がそれぞれ投与量の0.4%、43.1%及び5.0%排泄された<sup>35)</sup>。

## 8. トランスポーターに関する情報

### 16.7 薬物相互作用

#### 16.7.1 *In vitro*

バラシクロビルの活性代謝物であるアシクロビルは、OAT1、OAT2、MATE1及びMATE2-Kの基質であった<sup>44~47)</sup>。[10. 参照]

#### 16.7.2 吸収過程における相互作用(*in situ*)

ラット小腸にバラシクロビル0.01mMを含む緩衝液を灌流した時、バラシクロビルの小腸透過係数はペプチドトランスポーター(PEPT)1の基質として知られるβ-ラクタム系抗生素質(アモキシシリン、アンピシリン、セファドロキシル、セファラジン；各々5mM)の高濃度の共存下で有意に低下したことから、バラシクロビルの吸収過程にはPEPT1が関与していることが示された<sup>48)</sup>。

VIII. -7. 参照

## 9. 透析等による除去率

VII. -10. 及びVIII. -10. 参照

## 10. 特定の背景を有する患者

### 16.6 特定の背景を有する患者

#### 16.6.1 腎機能障害患者

透析患者(クレアチニンクリアランス値 平均0.93mL/min)にバラシクロビル1000mgを単回経口投与した場合の薬物動態パラメータは以下のとおりであった<sup>49)</sup>。また、4時間の透析により血漿中のアシクロビルは約70%が除去された。[7.2、9.2.1、13.2参照]

被験者	例数	単回経口投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ			
		Cmax ( $\mu$ g/mL)	Tmax <sup>注1)</sup> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-∞</sub> ( $\mu$ g · hr/mL)
腎機能障害患者	18	10.60±4.22	2.00 (1.00-4.00)	22.2±5.0	249.43±105.09

平均値±標準偏差、注1)中央値(範囲)

**16.6.2 高齢者**

高齢者(平均72歳、クレアチニンクリアランス値 平均57mL/min)にバラシクロビルを経口投与した場合、健康成人に比べ血漿中アシクロビルのCmax及びAUCはそれぞれ15～20%及び30～50%増加した。この変化は高齢者での加齢に伴う腎機能低下によると考えられた<sup>50)</sup>(外国人データ)。[7.2、9.8参照]

**16.6.3 小児等**

小児水痘患者(1～9歳)にバラシクロビル25mg/kg(顆粒剤50mg/kg)<sup>注)</sup>を1日3回5日間反復経口投与した場合の初回投与時の血漿中アシクロビルの薬物動態パラメータは下記のとおりであった。投与5日目の血漿中アシクロビル濃度に反復投与による蓄積性は認められなかった<sup>21)</sup>。

注)水痘における本剤の承認用量は、通常、体重40kg以上的小児にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与である。

投与量 (mg/kg)	年齢 (歳)	例数	初回投与時のアシクロビルの薬物動態パラメータ			
			Cmax ( $\mu$ g/mL)	Tmax <sup>注1)</sup> (hr)	AUC <sub>0-∞</sub> ( $\mu$ g・hr/mL)	t <sub>1/2</sub> (hr)
25	1～9	11 <sup>注2)</sup>	6.21±2.46	1.03 (1.00-4.08)	16.90±6.99	1.34±0.29

平均値±標準偏差

注1)中央値(最小値-最大値)

注2)AUC<sub>0-∞</sub>及びt<sub>1/2</sub>については、9例

**11. その他……………**

該当資料なし

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由 ······

設定されていない

2. 禁忌内容とその理由 ······

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分あるいはアシクロビルに対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由 ······

V. - 2. 参照

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由 ······

V. - 4. 参照

5. 重要な基本的注意とその理由 ······

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8. 1 各効能又は効果に対し設定された用法及び用量で投与した場合、本剤投与時のアシクロビル曝露は、アシクロビル経口製剤投与時よりも高いことから、副作用の発現に留意すること。

8. 2 意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。[7. 2、9. 2. 1参照]

〈水痘〉

8. 3 治療上の有益性と危険性を勘案して投与すること。本剤の使用経験は少ない。

6. 特定の背景を有する患者に関する注意 ······

1) 合併症・既往歴等のある患者

9. 1 合併症・既往歴等のある患者

9. 1. 1 免疫機能の低下した患者

水痘の治療において、悪性腫瘍、自己免疫性疾患などの免疫機能の低下した患者に対する有効性及び安全性は確立していない。本剤の使用経験がない。

9. 1. 2 脱水症状をおこしやすいと考えられる患者(腎障害のある患者又は腎機能が低下している患者、高齢者、水痘患者等)

適切な水分補給を行うこと。[9. 2. 1、9. 8参照]

## 2) 腎機能障害患者

## 9.2 腎機能障害患者

## 9.2.1 腎障害のある患者、腎機能が低下している患者

投与間隔及び投与量を調節し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。本剤の活性代謝物であるアシクロビルの曝露量が増加した場合には、精神神経症状や腎機能障害が発現する危険性が高い。適切な減量投与が行われなかつたために過量投与の状態となつた腎障害患者において、精神神経症状や腎機能障害が発現した症例が報告されている。[7.2、8.2、9.1.2、11.1.3、11.1.4、13.1、16.6.1参照]

## 3) 肝機能障害患者

## 9.3 肝機能障害患者

## 9.3.1 肝障害のある患者

肝障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。

## 4) 生殖能を有する者

設定されていない

## 5) 妊婦

## 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

活性代謝物のアシクロビルにおいて、動物実験(ラット)の妊娠10日目に、母動物に腎障害のあらわれる大量(200mg/kg/day以上)を皮下投与した実験では、胎児に頭部及び尾の異常が認められたと報告されている<sup>51)</sup>。

## 6) 授乳婦

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤投与後、活性代謝物のアシクロビルがヒト乳汁中へ移行することが報告されている。[16.3.2参照]

## 7) 小児等

## 9.7 小児等

9.7.1 動物実験(ラット)でバラシクロビルを経口投与したときの活性代謝物であるアシクロビルの曝露量は、成熟動物に比べて幼若動物で大きいことが報告されている。

9.7.2 低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

## 8) 高齢者

## 9.8 高齢者

投与間隔及び投与量を調節し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。本剤は、活性代謝物のアシクロビルに変換された後、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため血中アシクロビル濃度が高濃度で持続し、精神神経症状や腎機能障害が発現する危険性が高い。適切な減量投与が行われなかつたために過量投与の状態となつた高齢者において、精神神経症状や腎機能障害が発現した症例が報告されている。[7.2、9.1.2、11.1.3、11.1.4、13.1、16.6.2参照]

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 7. 相互作用

#### 10. 相互作用

活性代謝物のアシクロビルは、OAT1、MATE1及びMATE2-Kの基質である。[16. 7. 1参考]

#### 1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

#### 2) 併用注意とその理由

##### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
プロベネシド	本剤の活性代謝物のアシクロビルの排泄が抑制され、アシクロビルの平均血漿中濃度曲線下面積(AUC)が48%増加するとの報告がある <sup>52)</sup> 。特に腎機能低下の可能性がある患者(高齢者等)には慎重に投与すること。	プロベネシドは尿細管分泌に関わるOAT1及びMATE1を阻害するため、活性代謝物のアシクロビルの腎排泄が抑制されると考えられる。
シメチジン	本剤の活性代謝物のアシクロビルの排泄が抑制され、アシクロビルのAUCが27%増加するとの報告がある <sup>52)</sup> 。特に腎機能低下の可能性がある患者(高齢者等)には慎重に投与すること。	シメチジンは尿細管分泌に関わるOAT1、MATE1及びMATE2-Kを阻害するため、活性代謝物のアシクロビルの腎排泄が抑制されると考えられる。
ミコフェノール酸 モフェチル	本剤の活性代謝物のアシクロビルとの併用により、アシクロビル及びミコフェノール酸 モフェチル代謝物の排泄が抑制され、両方のAUCが増加するとの報告がある <sup>53)</sup> 。特に腎機能低下の可能性がある患者(高齢者等)には慎重に投与すること。	活性代謝物のアシクロビルとミコフェノール酸 モフェチル代謝物が尿細管分泌で競合すると考えられる。
テオフィリン	本剤の活性代謝物のアシクロビルとの併用により、テオフィリンの中毒症状があらわれることがある <sup>54)</sup> 。	機序は不明であるが、本剤の活性代謝物のアシクロビルがテオフィリンの代謝を阻害するためテオフィリンの血中濃度が上昇することが考えられる。

### 8. 副作用

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 1) 重大な副作用と初期症状

#### 11.1 重大な副作用

##### 11.1.1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)

アナフィラキシーショック、アナフィラキシー(呼吸困難、血管性浮腫等)があらわれることがある。

##### 11.1.2 汗血球減少(0.73%)、無顆粒球症(0.24%)、血小板減少(0.36%)、播種性血管内凝固症候群(DIC)(頻度不明)、血小板減少性紫斑病(頻度不明)

##### 11.1.3 急性腎障害(0.12%)、尿細管間質性腎炎(頻度不明)

[9.2.1、9.8、13.1参照]

##### 11.1.4 精神神経症状(1.09%)

意識障害(昏睡)、せん妄、妄想、幻覚、錯乱、痙攣、てんかん発作、麻痺、脳症等があらわれることがある。一般に精神神経症状は本剤の投与中止により回復する。[9.2.1、9.8、13.1参照]

##### 11.1.5 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)

##### 11.1.6 呼吸抑制、無呼吸(いずれも頻度不明)

##### 11.1.7 間質性肺炎(頻度不明)

##### 11.1.8 肝炎、肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

##### 11.1.9 急性膵炎(頻度不明)

### 2) その他の副作用

#### 11.2 その他の副作用

	0.5%以上	0.5%未満	頻度不明
過敏症			発疹、蕁麻疹、瘙痒、光線過敏症
肝臓	肝機能検査値の上昇		
消化器	腹痛、下痢、腹部不快感、嘔気	嘔吐	
精神神経系	頭痛	めまい	意識低下
腎臓・泌尿器	腎障害	排尿困難	尿閉

### 9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

### 10. 過量投与

#### 13. 過量投与

##### 13.1 症状

急性腎障害、精神神経症状(錯乱、幻覚、激越、意識低下、昏睡等)が報告されている。[7.2、9.2.1、9.8、11.1.3、11.1.4参照]

##### 13.2 処置

血液透析により、アシクロビルを血中より除去することができる。[16.6.1参照]

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 11. 適用上の注意 ······

#### 14. 適用上の注意

##### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するように指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

##### 14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 本剤は主薬の苦みを防ぐため、コーティングを施しているので、錠剤をつぶすことなく服用されること。

14.2.2 本剤を飲みにくい場合には多めの水で1錠ずつ、服用させること。

### 12. その他の注意 ······

#### 1) 臨床使用に基づく情報

##### 15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、本剤の高用量(8g/日)を用い、重度の免疫不全患者(特に進行性HIV感染症患者)におけるCMV感染症予防に対する臨床試験が実施されている。この試験において、本剤が長期間にわたり投与された患者で、腎不全、微小血管溶血性貧血及び血小板減少(ときに併発)の発現が認められている。また、これらの症状は本剤の投与を受けていない同じ基礎疾患、合併症等を有する患者においても発現が認められている。

#### 2) 非臨床試験に基づく情報

##### 15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 Ames試験及びラット骨髄細胞染色体異常試験では陰性であったが、マウス骨髄小核試験では、高用量(経口投与、500mg/kg、アシクロビルのヒト血漿中濃度の26~51倍相当)において小核出現頻度の軽度増加を認めた。

15.2.2 マウスリンゴーマ細胞を用いた遺伝子突然変異試験では、代謝活性化系の存在下で $1000 \mu\text{g/mL}$ 以上の濃度において弱い遺伝毒性(変異コロニー頻度の増加)を示した。

## IX. 非臨床試験に関する項目

### 1. 薬理試験.....

#### 1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」参照

#### 2) 安全性薬理試験

該当資料なし

#### 3) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験.....

#### 1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

#### 2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

#### 3) 遺伝毒性試験

VIII. -12. -2) 参照

#### 4) がん原性試験

該当資料なし

#### 5) 生殖発生毒性試験

VIII. -6. -5) 参照

#### 6) 局所刺激性試験

該当資料なし

#### 7) その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

### X. 管理的事項に関する項目

#### 1. 規制区分 .....

規制区分	
製剤	処方箋医薬品 <sup>注)</sup>
有効成分	該当しない

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

#### 2. 有効期間 .....

有効期間：3年

#### 3. 包装状態での貯法 .....

室温保存

#### 4. 取扱い上の注意 .....

該当しない

#### 5. 患者向け資材 .....

患者向医薬品ガイド：あり、くすりのしおり：あり

その他の患者向け資材

XIII. -2. 参照

#### 6. 同一成分・同効薬 .....

同一成分：バルトレックス錠500／顆粒50%

同効薬：核酸型ポリメラーゼ阻害作用

アシクロビル、ファムシクロビル<sup>29)</sup>

#### 7. 国際誕生年月日 .....

該当しない

#### 8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日 .....

製品名	製造販売承認 年月日	承認番号	薬価基準収載 年月日	販売開始 年月日
バラシクロビル錠500mg 「サワイ」	2013年8月15日	22500AMX01547000	2013年12月13日	2013年12月13日

#### 9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 .....

承認年月日：2015年5月20日

効能又は効果内容：「造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制」の効能又は効果を追加した。

用法及び用量内容：効能又は効果追加に伴い、関連の用法及び用量を追加した。

単純疱疹、帯状疱疹、性器ヘルペスの再発抑制の小児に対する用法及び用量を追加した。

## X. 管理的事項に関する項目

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 .....  
該当しない

11. 再審査期間 .....  
該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報 .....  
本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード .....

製品名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT番号	レセプト電算処理 システム用コード
バラシクロビル錠500mg 「サワイ」	6250019F1233	6250019F1233	122959201	622295901

14. 保険給付上の注意 .....  
本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

---

## XI . 文献

---

### 1. 引用文献 .....

- 1) Biron, K. K. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1980 ; 18 : 443-447
- 2) Furman, P. A. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1981 ; 20 : 518-524
- 3) St. Clair, M. H. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1980 ; 18 : 741-745
- 4) Furman, P. A. et al. : J. Virol., 1979 ; 32 : 72-77
- 5) Miller, W. H. et al. : J. Biol. Chem., 1980 ; 255 : 7204-7207
- 6) 医療用医薬品最新品質情報集(ブルーブック) <<https://www.nihs.go.jp/drug/ecqaged/bluebook/list.html>> (2025/4/1 アクセス)
- 7) 沢井製薬(株) 社内資料[加速試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 8) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 9) 沢井製薬(株) 社内資料[分割後の安定性試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 10) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 11) 新村眞人他 : 臨床医薬, 2002 ; 18 : 1131-1154
- 12) 新村眞人他 : 臨床医薬, 1998 ; 14 : 2833-2866
- 13) 国内第Ⅱ相試験(バルトレックス錠 : 2000年7月3日承認、申請資料概要ト.1.4)
- 14) Reitano, M. et al. : J. Infect. Dis., 1998 ; 178 : 603-610
- 15) Conant, M. A. et al. : Int. J. STD. AIDS, 2002 ; 13 : 12-21
- 16) 海外臨床試験①(バルトレックス錠 : 2006年9月13日承認、審査報告書)
- 17) 川島眞他 : 臨床医薬, 2002 ; 18 : 1155-1175
- 18) 陶山和明他 : 臨床医薬, 2014 ; 30 : 583-591
- 19) 新村眞人他 : 臨床医薬, 1998 ; 14 : 2867-2902
- 20) Beutner, K. R. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1995 ; 39 : 1546-1553
- 21) 浅野喜造他 : 臨床医薬, 2007 ; 23 : 183-200
- 22) 国内臨床試験(バルトレックス顆粒 : 2007年4月18日承認、申請資料概要2.7.3.3)
- 23) Patel, R. et al. : Genitourin. Med., 1997 ; 73 : 105-109
- 24) DeJesus, E. et al. : J. Infect. Dis., 2003 ; 188 : 1009-1016
- 25) Warren, T. et al. : Clinical Infectious Diseases, 2004 ; 39 : S258-266
- 26) 海外臨床試験②(バルトレックス錠 : 2006年9月13日承認、審査報告書)
- 27) 村川和重他 : 臨床医薬, 2008 ; 24(4) : 321-335
- 28) Corey, L. et al. : N. Engl. J. Med., 2004 ; 350 : 11-20
- 29) 薬剤分類情報閲覧システム <<https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaIMenu/>> (2025/4/1 アクセス)
- 30) Al-Hasani, A. M. et al. : J. Antimicrob. Chemother., 1986 ; 18(Suppl. B) : 113-119
- 31) McLaren, C. et al. : Am. J. Med., 1982 ; 73(1A) : 376-379
- 32) Machida, H. : Antimicrob. Agents Chemother., 1986 ; 29 : 524-526
- 33) 武藤茂生他 : 小児科臨床, 1983 ; 36 : 2785-2790
- 34) 水痘・帯状疱疹ウイルスに対する作用(バルトレックス錠 : 2000年7月3日承認、申請資料概要ト.1.1.2)
- 35) 東純一他 : 臨床医薬, 1998 ; 14 : 2683-2700
- 36) 竹内譲他 : 診療と新薬, 2013 ; 50(9) : 777-784

- 37) 沢井製薬(株) 社内資料[生物学的同等性試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 38) Obenshain, M. K. et al. : Pharm. Res., 1994 ; 11(Suppl. 10) : S435
- 39) 食事の影響(バルトレックス錠：2000年7月3日承認、申請資料概要へ. 3. 1. 3)
- 40) Soul-Lawton, J. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1995 ; 39 : 2759-2764
- 41) Sheffield, J. S. et al. : Am. J. Obstet. Gynecol., 2002 ; 186 : 100-102
- 42) Perry, C. M. et al. : Drugs, 1996 ; 52 : 754-772
- 43) Burnette, T. C. et al. : J. Biol. Chem., 1995 ; 270 : 15827-15831
- 44) Cheng, Y. et al. : Drug Metab. Dispos., 2012 ; 40 : 617-624
- 45) Takeda, M. et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther., 2002 ; 300 : 918-924
- 46) Nies, A. T. et al. : Expert Opin. Drug Metab. Toxicol., 2012 ; 8 : 1565-1577
- 47) Tanihara, Y. et al. : Biochem. Pharmacol., 2007 ; 74 : 359-371
- 48) Sinko, P. J. et al. : Biopharm. Drug Dispos., 1998 ; 19 : 209-217
- 49) Hara, K. et al. : Drug Metab. Pharmacokinet., 2008 ; 23 : 306-312
- 50) Wang, L. H. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1996 ; 40 : 80-85
- 51) Stahlmann, R. et al. : Infection, 1987 ; 15 : 261-262
- 52) De Bony, F. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 2002 ; 46 : 458-463
- 53) Bullingham, R. E. S. et al. : Clin. Pharmacokinet., 1998 ; 34 : 429-455
- 54) Maeda, Y. et al. : Biol. Pharm. Bull., 1996 ; 19 : 1591-1595
- 55) 沢井製薬(株) 社内資料[粉碎後の安定性試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」
- 56) 沢井製薬(株) 社内資料[崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験] バラシクロビル錠500mg「サワイ」

## 2. その他の参考文献 .....

---

## XII. 参考資料

---

1. 主な外国での発売状況 .....

2. 海外における臨床支援情報 .....

該当資料なし

## XIII. 備考

### 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報.....

本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法等が確立していない内容も含まれております、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

#### 1) 粉碎

##### <粉碎後の安定性試験><sup>55)</sup>

バラシクロビル錠500mg「サワイ」を粉碎後、以下の保存条件下で30日間保存し、安定性試験を行った。

その結果、以下の結果が得られた。

保存条件	イニシャル	透明瓶開放 (室温、30日)	透明瓶密栓 (室温、30日)	褐色瓶密栓 (室温、30日)
性状	白色の粉末	変化なし	変化なし	変化なし
定量試験*	100.0	99.5	100.3	100.3

\*：イニシャルを100としたときの含有率(%)

#### 2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

##### <崩壊・懸濁及びチューブ通過性試験><sup>56)</sup>

###### 試験方法

1. バラシクロビル錠500mg「サワイ」を1錠、シリソジにとり(ピストン部を抜き取り、錠剤を入れてピストン部を戻す)、温湯(約55°C)20mLを採取して放置した。
2. 5分後シリソジを15回転倒混和し、崩壊・懸濁状態を確認した。5分後に崩壊しない場合、更に5分間放置後、同様の操作を行った。
3. シリソジ内の液を8Fr.(外径2.7mm)フィーディングチューブに注入し、通過状態を観察した。

###### 結果

懸濁状態	錠剤は完全には崩壊しなかった
チューブ通過性	—

###### 備考

- 上記の状態から更に10分間(合計20分間)放置したが、錠剤は完全には崩壊しなかった。
- コーティングを破壊して(PTPシートの上から乳棒で2度たたく)10分間放置したが、錠剤は完全には崩壊しなかった。

### 2. その他の関連資料 .....

###### 患者向け資材

- ・帯状疱疹～Q&A～
- ・バラシクロビル錠500mg「サワイ」服用ガイド～バラシクロビル錠500mg「サワイ」を服用する患者さんへ～
- ・自動車運転等は注意してください・お知らせ指導箋

###### 医療関係者向け資材

- ・バラシクロビル塩酸塩の中毒性脳症・高齢者への慎重投与について





