

ドセタキセル 点滴静注液 20mg/1mL「サワイ」・80mg/4mL「サワイ」 ご使用にあたって



**本剤はエタノールを予め含有しています。
アルコールに過敏な患者さんには十分にご注意ください。**

本剤は、ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL・80mg/4mL(サノフィ株式会社)と同一で、タキソテール点滴静注用20mg・80mg(サノフィ株式会社)と以下のとおり異なりますので、ご使用に際してはご注意ください。

	ドセタキセル 点滴静注液「サワイ」		ワンタキソテール [®] 点滴静注		タキソテール [®] 点滴静注用	
規格	20mg/1mL	80mg/4mL	20mg/1mL	80mg/4mL	20mg	80mg
エタノール量	395mg	1580mg	395mg	1580mg	180mg (添付溶解液)	720mg (添付溶解液)
調製方法	プレミックス*不要		プレミックス*不要		①添付溶解液で溶解 ②生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解	
製剤写真						
ドセタキセル濃度	20mg/mL		20mg/mL		10mg/mL (添付溶解液で溶解後のプレミックス液) [ドセタキセルの濃度が1/2倍]	

*プレミックス：バイアルを輸液に混和する前に、エタノール溶液または調製用輸液で溶解する作業です。

〈裏面も必ずご覧ください。〉

ドセタキセル「サワイ」製剤 外観比較表

		ドセタキセル 点滴静注液「サワイ」		ドセタキセル 点滴静注用「サワイ」	
規格		20mg/1mL	80mg/4mL	20mg	80mg
エタノール量		395mg	1580mg	180mg (添付溶解液)	720mg (添付溶解液)
調製方法		プレミックス※不要		①添付溶解液で溶解 ②生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて溶解	
製剤写真	バイアル				
	外箱				
ドセタキセル濃度		20mg/mL		10mg/mL (添付溶解液で溶解後のプレミックス液) [ドセタキセルの濃度が1/2倍]	

※プレミックス：バイアルを輸液に混和する前に、エタノール溶液または調製用輸液で溶解する作業です。

上記2製剤は販売名が類似しているため、ご使用前に必ず、今一度、販売名及び薬剤濃度等をご確認いただき、取り違えに十分ご注意ください。