

**アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」**  
**アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」**  
**アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」**  
**適正使用のお願い**

医師、薬剤師、医療従事者の皆様

2018年 8月

**沢井製薬株式会社**

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2 - 30  
TEL : 06 ( 6 1 0 5 ) 5 8 1 6

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。

特に、小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するため、予防的な対応として患者様・ご家族に対して以下の点をご説明くださいますようお願い申し上げます。

謹白

**〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉**

インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。

**異常行動**

- ① 就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも発現する)
- ② 発熱から 2 日間以内に発現することが多い

**(異常行動の例)**

- 突然立ち上がって部屋から出ようとする
- 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする
- 人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す
- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする
- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

《裏面も必ずご確認ください。》

## 事故を防止するために

発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような具体的な対策を講じるよう、保護者の方にご説明ください。

- 玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する(内鍵、チェーンロック、補助鍵がある場合は、その活用を含む)
- ベランダに面していない部屋で寝かせる
- 窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
- 一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる

(参照) タミフルと異常行動等の関連に係る報告書

(<https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000341848.pdf>)

本剤の使用に際しては、最新の添付文書全文をご確認ください。