

～ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。～

リネゾリド[®]注射液 600mg「サワイ」

適正使用のお願い

～視神経障害の発現について～

2017年6月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 06(6105)5816

オキサゾリジノン系合成抗菌剤であるリネゾリド注射液 600mg「サワイ」(一般名:リネゾリド)の投与にあたっては、添付文書において、治療上必要最小限の期間にとどめること、また、視神経障害があらわれることがあります、さらに視力喪失に進行する可能性があるため28日を超えないことが望ましいこと、の注意喚起を行っています。

本剤の投与に際しては、視神経障害の早期発見、重篤化防止のため、下記事項に留意していただきますようお願い申し上げます。

本剤の投与期間および視神経障害に対する注意

《本剤の投与にあたって、次の点に十分に注意してください》

- ◆投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に本剤の継続投与の必要性を判定し、疾病の治療上必要最小限にとどめること。
- ◆28日を超える投与の安全性および有効性は検討されていないため、28日を超えて投与しないことが望ましいこと。
- ◆28日を超えて投与した場合、視神経障害が発現し、さらに視力喪失に進行する可能性があること。
- ◆本剤の投与中は、患者の視力等の眼の状態について十分に観察・問診を行うことが必要であり、異常が認められた場合には、投与中止、眼科医への相談など適切な処置を行うこと。

《本剤の投与を受ける患者に対して、次の点を十分に説明してください》

- ◆本剤の投与により、視神経障害等の眼の異常があらわれることがあること。
- ◆下記のような症状があらわれた場合には、直ちに主治医に連絡すること。
視力低下・色覚異常・霧視(かすみ目)・視野欠損(見えない部分がある)など