～医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。～

リネゾリド錠600mg「サワイ」適正使用のお願い

～視神経障害の発現について～

2017年12月

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原５丁目２-３０
ＴＥＬ：０６（６１０５）５８１６

オキサゾリジノン系合成抗菌剤であるリネゾリド錠600mg「サワイ」（一般名：リネゾリド）の投与にあたっては、添付文書において、**治療上必要最小限の期間にとどめること**、また、**視神経障害があらわれることがあり、さらに視力喪失に進行する可能性があるため28日を超えないことが望ましいこと**、の注意喚起を行っています。

本剤の投与に際しては、視神経障害の早期発見、重篤化防止のため、下記事項に留意していただきますようお願い申し上げます。

本剤の投与期間および視神経障害に対する注意

≪本剤の投与にあたって、次の点に十分に注意してください≫

◆**投与期間は**、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に本剤の継続投与の必要性を判定し、**疾病の治療上必要最小限にとどめる**こと。

◆28日を超える投与の安全性および有効性は検討されていないため、**28日を超えて投与しないことが望ましい**こと。

◆28日を超えて投与した場合、視神経障害が発現し、さらに視力喪失に進行する可能性があること。

◆本剤の投与中は、患者の**視力等の眼の状態について十分に観察・問診**を行うことが必要であり、**異常が認められた場合には、投与中止、眼科医への相談など適切な処置**を行うこと。

≪本剤の投与を受ける患者に対して、次の点を十分に説明してください≫

◆本剤の投与により、視神経障害等の眼の異常があらわれることがあること。

◆**下記のような症状があらわれた場合には、直ちに主治医に連絡**すること。

視力低下・色覚異常・霧視（かすみ目）・視野欠損（見えない部分がある）など