

医療関係者 各位

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30

**ラモトリギン錠/錠小児用「サワイ」
てんかん患者(小児)への使用に関するお願い**

小児てんかん患者の用法及び用量につきまして、『ラモトリギン錠小児用 2mg/ 5mg「サワイ」』だけでなく、『ラモトリギン錠25mg/100mg「サワイ」』も承認取得しております。小児てんかん患者に処方する場合、患者さんの服用錠数が多くなるため、患者さんの服用の負担にならないように、用量にあわせて『ラモトリギン錠25mg/100mg「サワイ」』の処方をご検討いただくようお願いいたします。

<小児てんかん患者における単剤療法(定型欠神発作に用いる場合)の維持用量処方例>

小児てんかん患者の単剤療法(定型欠神発作に用いる場合)の維持用量として、1日1回100mg投与する場合、錠小児用 5mg「サワイ」を20錠処方するのではなく、錠25mg「サワイ」を4錠処方する等のご配慮をお願いいたします。

	ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」	ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」	ラモトリギン錠 25mg「サワイ」	ラモトリギン錠 100mg「サワイ」
服用錠数	50錠	20錠	4錠	1錠

<電子添文『6.用法及び用量』より一部抜粋>

6.用法及び用量

○てんかん患者に用いる場合

小児(錠小児用2mg、錠小児用5mg、錠25mg、錠100mg)













(1)単剤療法の場合(定型欠神発作に用いる場合)

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日0.3mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与し、次の2週間は1日0.6mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与する、その後は、1～2週間毎に1日量として最大0.6mg/kgずつ漸増する。維持用量は1日1～10mg/kgとし、1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大0.6mg/kgずつ、1日用量は最大200mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

※その他の効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報は電子添文をご参照ください。

※発作型や併用薬に応じて用法及び用量が設定されています。用法及び用量の遵守をお願いいたします。

<参考>

品名	ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」	ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」	ラモトリギン錠 25mg「サワイ」	ラモトリギン錠 100mg「サワイ」
外形	  	  	  	  
直径(mm)	4.8	8.0×4.0	5.2×5.2	8.3×8.3
厚さ(mm)	1.6	2.6	2.0	3.2
重量(mg)	約45	約103	約63	約253

【問い合わせ先】

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
フリーダイヤル 0120-381-999