

アリピプラゾール内用液 1 mg 分包「サワイ」
アリピプラゾール内用液 3 mg 分包「サワイ」
アリピプラゾール内用液 6 mg 分包「サワイ」
アリピプラゾール内用液 12mg 分包「サワイ」

【この薬は？】

販売名	アリピプラゾール 内用液 1 mg 分包 「サワイ」 ARIPIPRAZOLE Oral Solution 1mg [SAWAI]	アリピプラゾール 内用液 3 mg 分包 「サワイ」 ARIPIPRAZOLE Oral Solution 3mg [SAWAI]	アリピプラゾール 内用液 6 mg 分包 「サワイ」 ARIPIPRAZOLE Oral Solution 6mg [SAWAI]	アリピプラゾール 内用液 12mg 分包 「サワイ」 ARIPIPRAZOLE Oral Solution 12mg [SAWAI]
一般名	アリピプラゾール Aripiprazole			
含有量	1 包 (1 mL) 中 1 mg	1 包 (3 mL) 中 3 mg	1 包 (6 mL) 中 6 mg	1 包 (12mL) 中 12mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。

- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

双極性障害における躁症状の改善

うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）

小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性

- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 血糖値が著しく上昇し、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡状態（吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸、意識の消失）などの重篤な状態になり、死亡にいたる可能性があるため、血糖値等を測定される場合があります。
- 低血糖（お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下、脱力感、刺激がないと眠ってしまうなど）があらわれることがあるため、血糖値を測定される場合があります。
- 患者や家族の方は、高血糖（体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える、尿の回数が多い）や低血糖があらわれることがあることを十分に理解できるまで説明を受けてください。これらの症状があらわれたらこの薬を飲むのをやめて、ただちに受診してください。【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】に書かれていることに特に注意してください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・昏睡の状態にある人
 - ・バルビツール酸誘導体や麻酔剤などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
 - ・アドレナリンを使用している人（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）
 - ・過去にアリピプラゾール内用液分包「サワイ」に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

【この薬を使用される全ての方に共通】

- ・心臓や血管の病気の人、低血圧の人またはそれらが疑われる人
- ・てんかんなどのけいれんを起こす病気を有する人、または今までに起こしたことがある人
- ・糖尿病の人、または今までに糖尿病になったことがある人、もしくは血縁に糖尿病の人がいる人、高血糖の人、肥満の人など糖尿病になりやすい人
- ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
- ・死にたいと強く思ったり考えたことがある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【うつ病・うつ状態の場合】

- ・脳に器質的な障害のある人

- ・衝動的な行動を起こしやすい病気を合併している人
- この薬には併用してはいけない薬 [アドレナリン (アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く) (ボスミン)] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- うつ病・うつ状態の人やそのご家族の方は、次の事項に注意してください。
 - ・24歳以下で抗うつ剤を使用した場合、死んでしまいたいという気持ちを強めるという報告があります。24歳以下でこの薬を使う人は医師と十分に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

アリピプラゾール内用液 1mg 分包/ 3mg 分包/ 6mg 分包/12mg 分包「サワイ」を組み合わせる場合があります。

〔統合失調症の場合〕

	開始量	維持量	最高量
一日量	6～12mg (6～12mL)	6～24mg (6～24mL)	30mg (30mL)
飲む回数	1日1回または2回に分けて飲む		

〔双極性障害における躁症状の改善の場合〕

	開始量	維持量	最高量
一日量	24mg (24mL)	12～24mg (12～24mL)	30mg (30mL)
飲む回数	1日1回		

〔うつ病・うつ状態（既存の治療薬で十分な効果が認められない場合に限る）の場合〕

	通常量	最高量
一日量	3mg (3mL)	15mg (15mL)
飲む回数	1日1回	

増量が必要な場合は、一日あたり 3mg (3mL) ずつ増量されます。


〔小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性の場合〕

	開始量	維持量	最高量
一日量	1mg (1mL)	1～15mg (1～15mL)	15mg (15mL)
飲む回数	1日1回		

増量が必要な場合は、一日あたり最大 3mg (3mL) ずつ増量されます。

●どのように飲むか？


〔アリピプラゾール内用液 1 mg 分包「サワイ」の場合〕



① 押部分を押さえながら、
②開ける(▶)の方向に開けてください。
※本体を押さえると液が飛び出る恐れがあります。

ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接お飲みください。

〔アリピプラゾール内用液 3 mg 分包/ 6 mg 分包/12mg 分包「サワイ」の場合〕



① 押部分を押さえながら、
②開ける(▶)の方向に開けてください。
※本体を押さえると液が飛び出る恐れがあります。

ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接お飲みください。

- ・ ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接飲んでください。
- ・ 開封後はすぐに飲んでください。
- ・ 他の薬と混ぜると濁ることがありますので、他の薬と混ぜて飲む場合には、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・ 包装ごと飲まないようにしてください。

飲みづらい場合は、コップ一杯くらいのジュースなどに混ぜて飲むことも出来ます。その場合すぐに飲んでください。

混ぜてもよいもの (例)	混ぜてはいけないもの (例)
白湯 (さゆ) 湯冷まし ジュース ミネラルウォーター	硬度の高い一部のミネラルウォーター (混ぜて濁ったとき) 煮沸していない水道水 茶葉由来飲料 (紅茶、ウーロン茶、緑茶や玄米茶等) 味噌汁

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時 (過量使用時) の対応

嗜眠 (刺激がないと眠ってしまう)、ぼんやりする、血圧の上昇、脈が速くなる、

嘔吐（おうと）など、また小児において、一過性の意識消失、ぼんやりするなどの症状があらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

〔この薬を使用される全ての方に共通〕

- ・眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・血糖値が上昇し、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡などがあらわれることがありますので、特に高血糖、肥満などの患者さんでは注意してください。高血糖や低血糖があらわれることがあるため、血糖値の検査が行われることがあります。高血糖や低血糖症状があらわれたら、薬を飲むのをやめて、ただちに受診してください。
- ・この薬の服薬中に、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず賭博（ギャンブル）を繰り返す、病的な性欲亢進、過剰で無計画な買い物を繰り返す、病的に食欲が亢進するなど、衝動が抑えられない症状があらわれることがありますので、患者さんや家族の方は十分に説明を受けてください。また、これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- ・体重が変動（増加、減少）する場合があります。体重の変動が見られた場合には、他の病気を合併している可能性もありますので、医師に相談してください。
- ・他の精神病薬を使用していて、この薬を飲み始めた場合などには、月経が再開する、月経量が増える、貧血、子宮内膜症があらわれるおそれがあります。このような場合には、医師に相談してください。
- ・この薬の使用により、ものが飲み込みにくくなる場合があります。むせたり、咳き込んだり、ものが飲み込みにくいことがある場合は医師に相談してください。特に、もともと、ものが飲み込みにくい患者さんや、口腔ケアが不十分な患者さんなどでは、飲食物、たんや唾液、胃液などが誤って気管に入ることによって、肺炎になる場合がありますので注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいないことを医師または薬剤師に伝えてください。

〔統合失調症の場合〕

- ・興奮しやすい、敵意をもつ、誇大性（自己に対する過大評価を内容とする妄想）などの精神症状の悪化が見られたら、医師または薬剤師に相談してください。
- ・今まで飲んでいた薬からこの薬に変えるとき、症状が悪化することがあります。このような場合には、医師または薬剤師に相談してください。

〔うつ病・うつ状態（既存の治療薬で十分な効果が認められない場合に限る）の場合〕

- ・うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。この薬を飲んでいて、特に飲みはじめや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれ

た場合は、医師に相談してください。

- ・不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。この薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともともある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。
- ・ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともともある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 あくせいしょうこうぐん	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、意思に反して体が動く
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
糖尿病性ケトアシドーシス とうりょうびょうせいケトアシドーシス	吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸
糖尿病性昏睡 とうりょうびょうせいこんすい	吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸、意識の消失
低血糖 ていけっとう	お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下

重大な副作用	主な自覚症状
痙攣 けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
無顆粒球症 むかりゆうきゆうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はつけっきゆうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしょう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、意思に反して体が動く、ふらつき、脱力感、冷汗が出る、疲れやすい、けいれん、顔や手足の筋肉がぴくつく、突然の高熱、寒気、発熱、体がだるい、力が入らない
頭部	ぼーっとする、意識の消失、意識の低下、一時的にボーっとする
顔面	血の気が引く
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、吐き気、嘔吐、喉のかゆみ、甘酸っぱいにおいの息、喉の痛み、唇が青紫色になる
胸部	呼吸数が増える、動悸、息苦しい、深く大きい呼吸、胸の痛み、突然の息切れ
腹部	お腹が張る、お腹がすく、食欲不振
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、手足のこわばり、手足のしびれ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、皮膚が青紫～暗紫色になる
筋肉	筋肉の痛み
便	便やおならが出にくい
尿	尿が赤褐色になる
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	形状	性状
アリピプラゾール 内用液 1 mg 分包 「サワイ」		無色澄明の液で、 芳香がある
アリピプラゾール 内用液 3 mg 分包 「サワイ」		
アリピプラゾール 内用液 6 mg 分包 「サワイ」		
アリピプラゾール 内用液 12mg 分包 「サワイ」		

【この薬に含まれているのは？】

販売名	アリピプラゾール 内用液 1 mg 分包 「サワイ」	アリピプラゾール 内用液 3 mg 分包 「サワイ」	アリピプラゾール 内用液 6 mg 分包 「サワイ」	アリピプラゾール 内用液 12mg 分包 「サワイ」
有効成分	アリピプラゾール			
添加剤	エデト酸ナトリウム、グリセリン、水酸化ナトリウム、スクラロース、ステビア抽出物、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、マクロゴール 4000、DL-リンゴ酸、香料			

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<https://www.sawai.co.jp>)

お客様相談室

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社休業日を除く）