

## バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」

### 【この薬は？】

販売名	バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」 BAZEDOXIFENE Tablets 20mg [SAWAI]
一般名	バゼドキシフェン酢酸塩 Bazedoxifene Acetate
含有量 (1錠中)	22.6mg (バゼドキシフェンとして 20mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、骨粗しょう症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、閉経後に女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が低下したことによってバランスを崩した骨の代謝を正常に近づけます。その結果、骨量の低下を改善し、骨折の危険性を減らします。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 閉経後骨粗鬆症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症などの静脈血栓塞栓症になっている人、または過去になったことがある人
- ・ 手術をした後や長期安静期など、長期間寝たきりまたはそれに近い状態の人
- ・ 抗リン脂質抗体症候群の人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人
- ・ 過去にバゼドキシフェン錠「サワイ」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・ 過去にエストロゲン製剤を飲んで、血液中のトリグリセリド（中性脂肪）が高くなったことがある人
- ・ 腎臓に障害のある人
- ・ 肝臓に障害のある人

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量は、1日1回1錠です。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 静脈血栓塞栓症があらわれることがあります。以下のような症状があらわれた場合には、飲むのをやめ、ただちに医師に相談してください。

足の痛み・むくみ（片方のふくらはぎが赤くはれる、ふくらはぎを押すと痛むなど）、急に息苦しく感じる、息切れ、胸の痛み、急な視力の低下

- ・ 静脈血栓塞栓症を起こすおそれが高まるため、手術をした後や長期安静期など、長期間寝たきりまたはそれに近い状態になる場合には、医師と相談の上、薬を飲むのをやめ、完全に歩行できるようになるまで、使用を再開しないでください。
- ・ カルシウムやビタミンDが不足している人は、医師に相談し、カルシウムやビタミンDを補ってください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに休薬し、医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
静脈血栓塞栓症 <small>じょうみゃくけっせんそくせんしょう</small>	足の痛み・むくみ（片方のふくらはぎが赤くはれる、ふくらはぎを押すと痛むなど）、急に息苦しく感じる、息切れ、胸の痛み、急な視力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	急な視力の低下
胸部	急に息苦しく感じる、息切れ、胸の痛み
手・足	足の痛み・むくみ（片方のふくらはぎが赤くはれる、ふくらはぎを押すと痛むなど）

## 【この薬の形は？】

P T P シート	
形状	楕円形のフィルムコーティング錠 
長径	11.2mm
短径	6.2mm
厚さ	5.0mm
重さ	310mg
色	淡黄色
本体表示	パゼドキシフェン 20 サワイ

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	バゼドキシフェン酢酸塩
添加剤	アスコルビン酸、カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム、タルク、デンプングリコール酸ナトリウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、部分アルファー化デンプン、マクロゴール 6000、ラウリル硫酸ナトリウム

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<https://www.sawai.co.jp>)

お客様相談室

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社休業日を除く）