

小児薬用量早見表

抗ウイルス化学療法剤

処方箋医薬品\*

日本薬局方 シロップ用アシクロビル

アシクロビルDS80%「サワイ」

ACICLOVIR

[小児] 帯状疱疹、水痘：通常、小児には体重1kg当たり1回アシクロビルとして20mg(本剤0.025g/kg)を1日4回用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量は800mg(本剤1g)とする。単純疱疹、造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制<sup>†</sup>、性器ヘルペスの再発抑制：通常、小児には体重1kg当たり1回アシクロビルとして20mg(本剤0.025g/kg)を1日4回用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量は200mg(本剤0.25g)とする。<sup>†</sup>造血幹細胞移植施行7日前より施行後35日まで用時懸濁して経口投与。なお、年齢、症状により適宜増減する。

<帯状疱疹、水痘>

年齢*	体重* (kg)	アシクロビルとして		ドライシロップとして	
		1回投与量 (mg)	1日投与量 (mg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
6ヵ月	4	80	320	0.10	0.40
	6	120	480	0.15	0.60
	8	160	640	0.20	0.80
1歳	10	200	800	0.25	1.00
2歳	12	240	960	0.30	1.20
3歳	14	280	1,120	0.35	1.40
4歳	16	320	1,280	0.40	1.60
5歳	18	360	1,440	0.45	1.80
6歳	20	400	1,600	0.50	2.00
7歳	22	440	1,760	0.55	2.20
	24	480	1,920	0.60	2.40
8歳	26	520	2,080	0.65	2.60
	28	560	2,240	0.70	2.80
9歳	30	600	2,400	0.75	3.00
	32	640	2,560	0.80	3.20
10歳	34	680	2,720	0.85	3.40
	36	720	2,880	0.90	3.60
11歳	38	760	3,040	0.95	3.80
	40	800	3,200	1.00	4.00

<単純疱疹、造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制>

年齢*	体重* (kg)	アシクロビルとして		ドライシロップとして	
		1回投与量 (mg)	1日投与量 (mg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
6ヵ月 1歳～	4	80	320	0.10	0.40
	6	120	480	0.15	0.60
	8	160	640	0.20	0.80
	10～	200	800	0.25	1.00

<性器ヘルペスの再発抑制>

体重40kg以上に限り投与すること。1日最高用量：アシクロビルとして1回投与量200mg、1日投与量800mg。ドライシロップとして1回投与量0.25g、1日投与量1.00g。

\* 2010/2011年「国民衛生の動向」

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。  
※注意-医師等の処方箋により使用すること