

マクロライド系抗生物質製剤

処方箋医薬品*

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」

CLARITHROMYCIN

クラリスロマイシン製剤

用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり10~15mg(力価)を2~3回に分けて経口投与する。

レジオネラ肺炎に対しては、1日体重1kgあたり15mg(力価)を2~3回に分けて経口投与する。

MAC症に対しては、1日体重1kgあたり15mg(力価)を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

年齢*	体重* (kg)	10mg(力価)/kg/日	15mg(力価)/kg/日	
		DSとして 1日投与量(g)	DSとして 1日投与量(g)	
6カ月	4	0.40	0.60	
	6	0.60	0.90	
	8	0.80	1.20	
	1歳	10	1.00	1.50
	2歳	12	1.20	1.80
	3歳	14	1.40	2.10
4歳	16	1.60	2.40	
	5歳	18	1.80	2.70
	6歳	20	2.00	3.00
7歳	22	2.20	3.30	
	24	2.40	3.60	
8歳	26	2.60	3.90	
	28	2.80		
9歳	30	3.00		
	32	3.20		
10歳	34	3.40		
	36	3.60		
11歳	38	3.80		
	40	4.00		

* 2010/2011年「国民衛生の動向」

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。
 ※注意-医師等の処方箋により使用すること