

経口用セフェム系抗生物質製剤

処方箋医薬品※

日本薬局方 シロップ用セフポドキシム プロキシセチル

セフポドキシムプロキシセチルDS小児用5%「サワイ」

CEFPODOXIME PROXETIL

通常、幼小児に対しては、セフポドキシム プロキシセチルとして1回3mg(力価)/kgを1日2～3回、用時懸濁して経口投与する。

なお、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には、1回4.5mg(力価)/kgを1日3回経口投与する。

年齢*	体重* (kg)	セフポドキシム プロキシセチル として1日投与量		DSとして1日投与量	
		2回投与時 (mg(力価))	3回投与時 (mg(力価))	2回投与時 (g)	3回投与時 (g)
6ヵ月	4	24	36	0.48	0.72
	6	36	54	0.72	1.08
1歳	8	48	72	0.96	1.44
	10	60	90	1.20	1.80
2歳	12	72	108	1.44	2.16
	14	84	126	1.68	2.52
3歳	16	96	144	1.92	2.88
	18	108	162	2.16	3.24
4歳	20	120	180	2.40	3.60
	22	132	198	2.64	3.96
5歳	24	144		2.88	
	26	156		3.12	
6歳	28	168		3.36	
	30	180		3.60	
7歳	32	192		3.84	

* 2010/2011 年「国民衛生の動向」

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。
※注意-医師等の処方箋により使用すること