

消化管運動改善剤

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」

DOMPERIDONE

ドンペリドンドライシロップ

通常、ドンペリドンとして1日1.0~2.0mg/kg(本剤0.1~0.2g/kg)を用時水で懸濁し、1日3回食前に分けて経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。ただし、1日投与量はドンペリドンとして30mgを超えないこと。また、6才以上の場合はドンペリドンとして1日最高用量は1.0mg/kg(本剤0.1g/kg)を限度とすること。

年齢*	体重* (kg)	1.0 mg/kg/日	1.5 mg/kg/日	2.0 mg/kg/日
		DSとして 1日投与量(g)	DSとして 1日投与量(g)	DSとして 1日投与量(g)
6カ月	3	0.30	0.45	0.60
	4	0.40	0.60	0.80
	5	0.50	0.75	1.00
	6	0.60	0.90	1.20
	7	0.70	1.05	1.40
	8	0.80	1.20	1.60
1歳	9	0.90	1.35	1.80
	10	1.00	1.50	2.00
2歳	11	1.10	1.65	2.20
	12	1.20	1.80	2.40
3歳	13	1.30	1.95	2.60
	14	1.40	2.10	2.80
4歳	15	1.50	2.25	3.00
	16	1.60	2.40	
	17	1.70	2.55	
5歳	18	1.80	2.70	
	19	1.90	2.85	
6歳	20	2.00	3.00	
	21	2.10		
7歳	22	2.20		
	23	2.30		
	24	2.40		
	25	2.50		
8歳	26	2.60		
	27	2.70		
	28	2.80		
	29	2.90		
	30	3.00		

* 2010/2011 年「国民衛生の動向」

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。