

## 小児薬用量早見表

### 抗インフルエンザウイルス剤

処方箋医薬品\*

# オセルタミビルDS3%「サワイ」

## OSELTAMIVIR

オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ

治療に用いる場合[小児]:通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。

幼小児の場合:2mg/kg(ドライシロップ剤として66.7mg/kg)

新生児、乳児の場合:3mg/kg(ドライシロップ剤として100mg/kg)

#### <新生児・乳児(1歳未満):3mg/kg>

体重(kg)	1日投与量(2分服)		5日間投与量
	オセルタミビルとして(mg)	DSとして(g)	DSとして(g)
2.0	12	0.4	2.0
2.5	15	0.5	2.5
3.0	18	0.6	3.0
3.5	21	0.7	3.5
4.0	24	0.8	4.0
4.5	27	0.9	4.5
5.0	30	1.0	5.0
5.5	33	1.1	5.5
6.0	36	1.2	6.0
6.5	39	1.3	6.5
7.0	42	1.4	7.0
7.5	45	1.5	7.5
8.0	48	1.6	8.0
8.5	51	1.7	8.5
9.0	54	1.8	9.0
9.5	57	1.9	9.5
10.0	60	2.0	10.0
10.5	63	2.1	10.5
11.0	66	2.2	11.0
11.5	69	2.3	11.5
12.0	72	2.4	12.0
12.5	75	2.5	12.5
13.0	78	2.6	13.0

#### <幼小児(1歳以上):2mg/kg>

体重(kg)	1日投与量(2分服)		5日間投与量
	オセルタミビルとして(mg)	DSとして(g)	DSとして(g)
9	36	1.20	6.00
10	40	1.33	6.67
11	44	1.47	7.33
12	48	1.60	8.00
13	52	1.73	8.67
14	56	1.87	9.33
15	60	2.00	10.00
16	64	2.13	10.67
17	68	2.27	11.33
18	72	2.40	12.00
19	76	2.53	12.67
20	80	2.67	13.33
21	84	2.80	14.00
22	88	2.93	14.67
23	92	3.07	15.33
24	96	3.20	16.00
25	100	3.33	16.67
26	104	3.47	17.33
27	108	3.60	18.00
28	112	3.73	18.67
29	116	3.87	19.33
30	120	4.00	20.00
31	124	4.13	20.67
32	128	4.27	21.33
33	132	4.40	22.00
34	136	4.53	22.67
35	140	4.67	23.33
36	144	4.80	24.00
37	148	4.93	24.67
37.5	150	5.00	25.00

## 沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。  
※注意-医師等の処方箋により使用すること