

## 小児薬用量早見表

抗てんかん剤

処方箋医薬品\*

# レベチラセタムDS50%「サワイ」

LEVETIRACETAM DS [SAWAI]

レベチラセタムドライシロップ

### 【用法・用量】

**成人**：通常、成人にはレベチラセタムとして1日1000mg(ドライシロップとして2g)を1日2回に分けて用時溶解して経口投与する。なお、症状により1日3000mg(ドライシロップとして6g)を超えない範囲で適宜増減するが、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg(ドライシロップとして2g)以下ずつ行うこと。

**小児**：通常、4歳以上の小児にはレベチラセタムとして1日20mg/kg(ドライシロップとして40mg/kg)を1日2回に分けて用時溶解して経口投与する。なお、症状により1日60mg/kg(ドライシロップとして120mg/kg)を超えない範囲で適宜増減するが、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg(ドライシロップとして40mg/kg)以下ずつ行うこと。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。

### <小児薬用量早見表>

体重 (kg)	1日用量				体重 (kg)	1日用量			
	レベチラセタム (mg)		ドライシロップ 50%(g)			レベチラセタム (mg)		ドライシロップ 50%(g)	
	通常 投与量 (20mg /kg/日)	最高 投与量 (60mg /kg/日)	通常 投与量 (0.04g /kg/日)	最高 投与量 (0.12g /kg/日)		通常 投与量 (20mg /kg/日)	最高 投与量 (60mg /kg/日)	通常 投与量 (0.04g /kg/日)	最高 投与量 (0.12g /kg/日)
10	200	600	0.40	1.20	31	620	1860	1.24	3.72
11	220	660	0.44	1.32	32	640	1920	1.28	3.84
12	240	720	0.48	1.44	33	660	1980	1.32	3.96
13	260	780	0.52	1.56	34	680	2040	1.36	4.08
14	280	840	0.56	1.68	35	700	2100	1.40	4.20
15	300	900	0.60	1.80	36	720	2160	1.44	4.32
16	320	960	0.64	1.92	37	740	2220	1.48	4.44
17	340	1020	0.68	2.04	38	760	2280	1.52	4.56
18	360	1080	0.72	2.16	39	780	2340	1.56	4.68
19	380	1140	0.76	2.28	40	800	2400	1.60	4.80
20	400	1200	0.80	2.40	41	820	2460	1.64	4.92
21	420	1260	0.84	2.52	42	840	2520	1.68	5.04
22	440	1320	0.88	2.64	43	860	2580	1.72	5.16
23	460	1380	0.92	2.76	44	880	2640	1.76	5.28
24	480	1440	0.96	2.88	45	900	2700	1.80	5.40
25	500	1500	1.00	3.00	46	920	2760	1.84	5.52
26	520	1560	1.04	3.12	47	940	2820	1.88	5.64
27	540	1620	1.08	3.24	48	960	2880	1.92	5.76
28	560	1680	1.12	3.36	49	980	2940	1.96	5.88
29	580	1740	1.16	3.48	50	1000	3000	2.00	6.00
30	600	1800	1.20	3.60					

## 沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。  
 ※注意-医師等の処方箋により使用すること