

投与量早見表

経口用セフェム系抗生物質製剤

処方箋医薬品*

日本薬局方 セフジトレン ピボキシル細粒

セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 CEFDITOREN PIVOXIL Fine Granules for Pediatric [SW]

【効能・効果（抜粋）】

1. 小児

〈適応菌種〉

セフジトレンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、百日咳菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、顎炎、猩紅熱、百日咳

【用法・用量（抜粋）】

通常、小児にはセフジトレン ピボキシルとして1回3mg（力価）/kg〔本剤0.03g/kg〕を1日3回食後に経口投与する。

＜肺炎、中耳炎、副鼻腔炎の場合＞なお、必要に応じて1回6mg（力価）/kg〔本剤0.06g/kg〕まで投与できる。

＜上記以外の疾患の場合＞なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。

ただし、成人での上限用量の1回200mg（力価）〔本剤2g〕1日3回（1日600mg（力価）〔本剤6g〕）を超えないこととする。

体重 (kg)	9mg（力価）/kg/日	体重 (kg)	9mg（力価）/kg/日	体重 (kg)	9mg（力価）/kg/日
	細粒として 1日投与量（g）		細粒として 1日投与量（g）		細粒として 1日投与量（g）
4	0.36	14	1.26	24	2.16
5	0.45	15	1.35	25	2.25
6	0.54	16	1.44	26	2.34
7	0.63	17	1.53	27	2.43
8	0.72	18	1.62	28	2.52
9	0.81	19	1.71	29	2.61
10	0.90	20	1.80	30	2.70
11	0.99	21	1.89	31	2.79
12	1.08	22	1.98	32	2.88
13	1.17	23	2.07	33	2.97

沢井製薬株式会社

●効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、製品の電子添文をご参照ください。
※注意-医師等の処方箋により使用すること