

カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」 に関する Q&A

2026 年 8 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」の 一包化について
A	カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> カルベジロール錠 10mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> カルベジロール錠 20mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg 「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1584.pdf

Q	カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について
A	重篤な腎機能障害（血清クレアチニン値 6mg/dL 以上）のある患者では、血中濃度の上昇傾向が報告されているため、注意が必要です。特に慢性心不全の患者では腎機能が悪化するおそれがあります。 [引用資料] カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」 電子添文 2024 年 4 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 9.2.1 重篤な腎機能障害（血清クレアチニン値 6mg/dL 以上）のある患者 血中濃度の上昇傾向が報告されている。特に慢性心不全の患者では腎機能が悪化するおそれがある。 16. 薬物動態 16.6 特定の背景を有する患者 16.6.1 腎機能障害患者 腎実質性高血圧患者 9 例にカルベジロール 5mg を単回及び連続経口投与したとき、血清クレアチニン値が 6mg/dL 以下の腎機能障害患者では、Cmax の上昇はみられず、連続投与においても健康成人と同様、蓄積性は認められなかったが、血清クレアチニン値が 6mg/dL 以上の腎機能障害患者では、健康成人に比べ Cmax が上昇する傾向が認められた¹⁴⁾。 14) Hakusui, H. et al. : Drugs, 1988 ; 36 (S-6) : 144-147 16.6.2 透析患者 透析患者 6 例にカルベジロール 10mg を透析直前に単回経口投与し、投与 5 時間まで透析を実施したときの血漿中未変化体濃度推移は、健康成人に比して Tmax がやや遅延したが、Cmax には差がなかった¹⁵⁾。 15) 三木茂裕他：日本透析医学会雑誌, 1991 ; 24 (4) : 515-521 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 01 20-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] カルベジロール錠 1.25mg/2.5mg/10mg/20mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1584.pdf