

フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」の一包化について
A	フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ＞ 製品情報＞ 製品情報一覧＞ フルコナゾールカプセル 50mg「サワイ」＞ 添付資料ダウンロード＞ 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ＞ 製品情報＞ 製品情報一覧＞ フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」＞ 添付資料ダウンロード＞ 無包装下安定性 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1054.pdf

Q	フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」の腎機能障害患者への投与について								
A	腎機能障害患者に投与した場合、血中フルコナゾール濃度が持続する可能性があります。 投与前にクレアチニン・クリアランスについて検査を行い、投与量の減量か、投与間隔をあけて使用してください。 参考として、電子添文では、以下のような記載があります。 [引用資料] フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」 電子添文 2023 年 10 月改訂（第 1 版） 《電子添文の内容》 7. 用法及び用量に関連する注意 〈効能共通（カンジダ属に起因する膺炎及び外陰膺炎除く）〉 7.1 腎機能障害患者に対する用量調節の目安 腎機能障害患者に投与する場合は、下表に示すクレアチニン・クリアランス値を参考に用量を調節する¹⁾。 <table border="1"> <tr> <th>クレアチニン・クリアランス (mL/min)</th><th>用量の目安</th></tr> <tr> <td>>50</td><td>通常用量</td></tr> <tr> <td>≤50(透析患者を除く)</td><td>半量</td></tr> <tr> <td>透析患者</td><td>透析終了後に通常用量</td></tr> </table> 1) Berl, T. et al. : J. Am. Soc. Nephrol., 1995 ; 6 (2) : 242-247 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 投与前にクレアチニン・クリアランス試験を行い、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて使用すること。血中フルコナゾール濃度が持続する。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 ● 「電子添文」 フルコナゾールカプセル 50mg/100mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1054.pdf	クレアチニン・クリアランス (mL/min)	用量の目安	>50	通常用量	≤50(透析患者を除く)	半量	透析患者	透析終了後に通常用量
クレアチニン・クリアランス (mL/min)	用量の目安								
>50	通常用量								
≤50(透析患者を除く)	半量								
透析患者	透析終了後に通常用量								